

中国科学院应用真菌学研究所編輯

中国經濟植物病原目录

戴芳瀾 相望年 鄭儒永

科 学 出 版 社

50.7

822


中国科学院应用真菌学研究所編輯

中國經濟植物病原目錄

戴	芳	瀾
相	望	年
邦	儒	永

科 学 出 版 社

1958



中科院植物所图书馆



S0018314

內 容 簡 介

本书收集了我国 2200 余种經濟植物上已发现的病原 2800 余种，包括真菌、細菌、病毒、綫虫、寄生种子植物和非侵染性因素。全书按寄主学名排列，每一寄主項下分列病原学名、病害名称和它們在国内的分布。书后附有病原学名索引，以便查閱。可供植物保护、植物检疫工作者，农林院校和綜合性大学生物系教师、学生参考之用。

中国經濟植物病原目录

戴芳瀾 相望年 郑儒永 編

著

科学出版社出版 (北京朝陽門大街 117 号)

北京市書刊出版业营业許可証出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

著

1958 年 11 月第 一 版

書号：1476

1959 年 2 月第二次印刷

开本：850×1168 1/32

(京) 2,001—2,900

印张：15 3/4 插頁：2

定价：(10) 精裝本 3.30 元
平裝本 2.90 元

例 言

1. 本目录係根据有关我国經濟植物病害的資料汇编而成，目的在提供資料，为进一步調查我国植物病原和植物病原检疫参考之用。

2. 本目录按寄主植物学名排列，并附有中文名称。

3. 病原名称按真菌、細菌、病毒、綫虫、寄生种子植物、非侵染性因素等依次排列；同类的病原按学名排列。

4. 植物一般病害名称依据中国科学院編譯出版委员会名詞室編訂的“植物病理学名詞”，名詞中未有的病害則另行拟名。由于很多不同病原常能引起类似症状的病害，如叶斑病、枯萎病、花叶病等，因此，这里所拟的病名都不够确切，希望讀者多多建議。

5. 細菌命名依据 Bergey: 細菌鑑定手冊，1949 (Bergey's Manual of Determinative Bacteriology)；病毒依据 Smith, K. M.: 植物病毒病害，第2版，1957 (A Textbook of Plant Virus Diseases)；关于真菌的命名，主要依据国际上通用的名称。

6. 病原的分布，以省或自治区为单位，如原报告沒有詳細地名仅有省名而現在省名又有更改时，或沒有註明詳細地点仅有“华南”、“华东”等字样时，則在原分布上加以引号，以示区别。


7. 病原分布后括号内的数字，系指所引用材料的来源。

8. 为便于查閱，书后附有病原学名索引。

9. 目录中所引用的材料，除少数确定有誤已予更正外，其他均根据原报告。

10. 本目录在編輯过程中，承中国科学院植物研究所吳征鎰同志和其他同志以及华南植物研究所的同志們校对寄主学名和中文名称；本所姜广正同志协助整理一部分資料；俞大綫、周家熾同志校对細菌和病毒方面的材料；胡馥媚、张育敏、于积厚、邢俊昌、韓树金、余永年、洪登壁同志协助部分抄写工作，我們在此表示感謝。

11. 我們为能力所限，錯誤遺漏之处一定很多，希望大家指正。来信請寄北京中关村中国科学院应用真菌学研究所。



Abelmoschus esculentus L. (秋葵)

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

Abies chensiensis van Tiegh. (秦岭冷杉)

Fomes pini (Thore) Karst. (紅色腐朽病) 甘肃(180), “西康”(34), 云南(34).

F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) 甘肃(180).

A. delavayi Franch. (大理冷杉, 櫟).

Fomes pini (Thore) Karst. (紅色腐朽病) 甘肃(180).

Lophodermium nervisequum (DC. ex Fr.) Réhm. (針枯病) 四川(150).

A. delavayi Franch. var. **forresti** Cheng (毛枝冷杉, 云南冷杉)

Dasyascypha agassizii (Berk. et Curt.) Sacc. (癌肿病) “西康”(32).

Melampsorella caryophyllacearum Schroet. (锈病) 云南(306).

A. faberi Craib. (冷杉)

Fomes annosus (Fr.) Cke. (赤腐病) “西康”(31).

F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(31).

F. robustus Karst. (沟腐病) “西康”(31).

Polyporus schweinitzii Fr. (紅色腐心病) “西康”(31).

P. sulphureus (Bull.) Fr. (褐色心材腐朽病) “西康”(31).

A. fargesii Franch. (鄂西冷杉)

Fomes pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) 甘肃(180).

A. georgei Ou (西康冷杉)

Fomes annosus (Fr.) Cke. (赤腐病) “西康”(34), 云南(34).

F. pini (Thore) Karst. (紅色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

F. robustus Karst. (沟腐病) “西康”(34), 云南(34).

Polyporus schweinitzii Fr. (紅色腐心病) “西康”(34), 云南(34).

A. recurvata Mast. (岷江冷杉)

Fomes pini (Thore) Karst. (紅色腐朽病) 甘肃(180).

Abies sp. (冷杉属)

Polyporus schweinitzii Fr. (紅色腐心病) “西康”(33), 云南(33).

Abrus mollis Hance (毛相思子)

Ravenelia ornata Syd. (銹病) 广东(274).

A. precatorius L. (相思子)

Ravenelia ornata Syd. (銹病) 台湾(290).

Abutilon asiaticum G. Don

Puccinia abutili Berk. et Br. (銹病) 台湾(280, 290, 359).

A. avicennae Gaertn. (苘麻)

Alternaria abutilonis Speg. (黑斑病) 四川(150), 河南(13).

Cercospora althaeina Sacc. (叶斑病) 河北(260), 华北(258).

C. avicennae Chupp (叶斑病) —(239, 369).

Colletotrichum pekinensis Katsura (炭疽病) —(301).

Macrophoma abutilonis Nakata et Takim. (胴枯病) “华北”(299).

Macrosporium abutilonis Speg. (黑斑病) 黑龙江(60, 260, 294), 吉林(294), 辽宁(294), 河北(260), 华北(299), 山东(374).

Mycosphaerella abutilontidicola Miura (褐斑病) 吉林(294, 313), 河南(13, 374).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. (腐敗病) 四川(150, 229).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 华北(299), 四川(91) 山东(258, 260).

Phyllosticta abutilonis P. Henn. (褐紋病) 黑龙江(260), 华北(299).

Plasmopara skvortzovii Miura (霜霉病) 黑龙江(294, 313), 吉林(260), 宁辽(43a, 294), “东北”(287), “华北”(299), 四川(150), 河南(13), 江苏(231).

Pleosphaerulina abutilontis Miura 吉林(294, 313).

Puccinia heterospora Berk. et Curt. (銹病) 云南(214).

Tubercularia abutilonis Katsura (莖腐病) —(301).

Agrobacterium tumefaciens (E. F. Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) “华北”(299).

花叶病(Mosaic) 黑龙江(294), 吉林(294), “华北”(299).

Abutilon gebauerianum H.-M.

Puccinia abutili Berk. et Br. (锈病) 云南(214).

A. striatus Dicks.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).

A. sp. (苘麻属)

Alternaria abulitonis Speg. (黑斑病) 江苏(106).

Puccinia heterospora Berk. et Curt. (锈病) 广东(32, 36).

Acacia farnesiana Willd. (荆球花, 薊毬花, 鴨皂树)

Ravenelia formosana Syd. (锈病) 台湾(290).

A. richii A. Br. (相思树)

Cercospora acaciae-confusae Saw. (叶斑病) 台湾(354).

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (立枯病) 台湾(350).

Meliola acaciae-confusae Saw. (煤病) 台湾(355).

M. koae Stevens (煤病) 台湾(380).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Poliotelium hyalospora (Saw.) Mains (锈病) 福建(10, 113, 231), 广东(274), 台湾(269, 290, 350), “华南”(274).

Septobasidium acaciae Saw. (膏药病) 台湾(350).

Uromyces hyalospora Saw. (锈病) 台湾(350).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Acalypha australis L. (梗草, 铁苋菜)

Cercospora acalyphae Peck (叶斑病) 江苏(231).

C. profusa H. et P. Syd. (叶斑病) 吉林(313), 辽宁(313), 浙江(231).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

A. australis L. var. *lanceolata* Hay. (披针叶铁苋菜)

Orthochaeta acalyphae Saw. (*Uncinula acalyphae* Tai) (白粉病) 台湾(358, 359).

A. brachystachys Hornem. (短穗铁苋菜)

Orthochaeta acalyphae Saw. (*Uncinula acalyphae* Tai) (白粉病) 四川(213), 云南(213).

Acanthopanax divaricatus Seem.

Mycosphaerella araliae C. Harkn. 河北(317).

A. sessiliflorus Seem. (烏鴉子, 无梗五加)

Phyllosticta acanthopanaxis Syd. (叶斑病) 吉林(313).

Acanthopanax spinosus Miq. (五加)*Aecidium acanthopanax* Diet. (锈病) 江苏(32,36).**A. trifoliatum** (L.) Merr. (白筋花)*Meliola acanthopanax* Yamam. (煤病) 台湾(385).**A. sp.** (铁苋菜属)*Endothia radicalis* (Schw.) de Not. “西康”(32), 河南(32), 安徽(32), 江苏(22,32), 广东(32).**Acer buergerianum** Miq. (三角枫)*Dinemasporium acerinum* Peck 江苏(103).*Macrosporium negundinicum* Ell. et Bartn. (黑斑病) 河南(374).*Melasmia acerina* Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.) (黑痣病) 湖南(306).*M. punctata* Sacc. et Roum. (*Rhytisma punctatum* (Pers.) Fr.) (黑痣病) 安徽(231), 浙江(231,364).*Schizothyrium annuliforme* Syd. et Butl. 安徽(32,189,) 江苏(32,189).*Uncinula nankinensis* Tai (白粉病) 安徽(219), 江苏(203, 219), 浙江(219).*U. sinensis* Tai et Wei (白粉病) 江苏(219).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**A. catalpifolium** Rehd (梓叶槭)*Uncinula aceris* (DC.) Sacc. (白粉病) 四川(150,226).*U. polyfida* Wei (白粉病) 四川(150,226).**A. caudatum** Wall. var. **georgei***Uncinula aceris* (DC.) Sacc. (白粉病) 云南(306).**A. caudatum** Wall. var. **prattii** Rehd. (康藏长尾槭)*Melasmia punctata* Sacc. et Roum. (*Rhytisma punctatum* (Pers.) Fr.) (黑痣病) 四川(150).**A. ginnala** Max. (茶条)*Melasmia punctata* Sacc. et Roum. (*Rhytisma punctatum* (Pers.) Fr.) (黑痣病) 辽宁(313).**A. henryi** Pax. (三叶槭)*Melasmia acerina* Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.) (黑痣病) 陕西(237), 河南(13).**A. mono** Max. var. **platanoides** Miyabe*Phyllosticta platanoidis* Sacc. 吉林(313).*Uncinula aceris* (DC.) Sacc. (白粉病) 辽宁(313).

Acer mono Max. var. **platanoides** Miyabe

U. aceris (DC.) Sacc. var. *tulasnei* (Fuck.) Salm. (白粉病)
辽宁(282, 313).

A. negundo L. (白腊槭, 桤叶槭)

Macrosporium negundinicum Ell. et Bartn. (黑斑病)
河南(374).

Phyllosticta negundinis Sacc. 吉林(313).

A. oblongum Wall. (飞蛾树)

Melasmia acerina Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.)
(黑痣病) 湖南(306).

Meliola aceris Yamam. (煤病) 台湾(381).

A. pseudo-sieboldianum Kom. (紫花槭)

Melasmia punctata Sacc. et Roum (*Rhytisma punctatum*
(Pers.) Fr.) (黑痣病) 辽宁(313).

A. rubescens Hay.

Pucciniastrum hikosanense Hirat. f. (锈病) 台湾(271).

A. saccharium Wangenh. (糖槭)

Septoria saccharina Ell. et Ev. (斑枯病) 江苏(106).

A. sinense Pax. (丫角槭)

Melasmia acerina Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.)
(黑痣病) 湖南(306).

A. tetramerum Max. var. **betulifolium** Rehd. (菱叶红色木)

Melasmia punctata Sacc. et Roum. (*Rhytisma punctatum*
(Pers.) Fr.) (黑痣病) 甘肃(340).

A. trifidum Hook et Arn. var. **formosanum** Hay.

Melasmia aceris-trifidi Saw. (黑痣病) 台湾(359).

A. truncatum Bge. (平基槭, 元宝树)

Asteromella platenoidis (Sacc.) Petr. 陕西(340).

A. sp. (槭属)

Cercospora acerina (Hart.) V. B. (叶斑病) “华北”(258).

Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn.) Schroet. (疫病)
台湾(287).

Melasmia acerina Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.)

(黑痣病) “西康”(57), 河南(13), 江苏(106).

M. punctata Sacc. et Roum. (*Rhytisma punctatum* (Pers.)
Fr.) (黑痣病) “西康”(57), 湖南(306).

Uncinula aceris (DC.) Sacc. (白粉病) 四川(150), 江苏
(106).

Acer sp. (槭属)

U. aceris (DC.) Sacc. var. *tulasnei* (Fuck.) Salm. (白粉病)
“热河”(315), 河南(13).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Phoradendron sp. (槲寄生) 广西(178).

Achras sapota L. (人心果)

Capnodium walteri Sacc. (煤病) 台湾(386).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾
(387).

Achyranthes aspera L. (牛膝)

Albugo bliti (Biv.) Kuntze. f. *achyranthis* P. Henn. (白
锈病) 台湾(351).

Uredo verecunda Syd. (锈病) 云南(214).

A. bidentata Bl. (牛膝)

Albugo achyranthis (P. Henn.) Miyabe (白锈病) 四川
(150), 江苏(231), 浙江(231).

A. bliti (Biv.) Kuntze. f. *achyranthis* P. Henn. (白锈病)
台湾(351).

Cercospora achyranthis H. et P. Syd. (叶斑病) “华北”
(258), 四川(150), 江苏(29, 32).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).

A. japonica Nakai (日本牛膝)

Albugo achyranthis (P. Henn.) Miyabe (白锈病) 台湾
(287, 292).

A. obtusifolia Lamb. (钝叶牛膝)

Albugo achyranthis (P. Henn.) Miyabe (白锈病) 台湾
(287, 292).

Aconitum bulbiferum H.-M. (球莖烏头)

Septoria lycoctoni Speg. (斑枯病) 云南(306).

A. delavayi Fr.

Uromyces aconiti Fuck. (锈病) 吉林(313).

A. delavayi Fr. var. coreana Lev.

Uromyces aconiti Fuck. (锈病) 东北(290).

A. fischeri Reichb.

Puccinia lycoctoni Fuck. (锈病) 河北(317).

A. forrestii Stapf

Septoria lycoctoni Speg. (斑枯病) 云南(306).

A. lycoctonum L. (牛扁)

Uromyces aconiti Fuck. (锈病) 河北(63).

Aconitum vilmorinianum Komar.*Coleosporium aconiti* Thuem. (锈病) 云南(214).**A. volubile** Pall.*Puccinia rubigo-vera* (DC.) Wint. (锈病) 河南(66).**A. yezoense** Nakai*Plasmopara pygmaea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 台湾(287).**A. sp.** (烏头附子属)*Septoria aconiti* Bacc. (斑枯病) 陕西(237).**Acorus calamus** L. (菖蒲)*Uromyces acori* Ramak. et Rang. (锈病) 江苏(205), 台湾(359).**A. calamus** L. var. *angustatus* Bess. (白菖)*Uromyces acori* Ramak. et Rang. (锈病) 台湾(290).**Actinidia callosa** Lindl. (京梨)*Cercospora iteodaphnes* (Thuem.) Sacc. (叶斑病) 貴州(240).**A. chinensis** Planch. (楊桃, 弥猴桃, 毛叶弥猴桃)*Phyllactinia imperialis* Miyabe (= *P. salmonii* Blumer) (白粉病) 湖南(213), 安徽(219), 广西(231).**A. formosana** Hay. (台湾弥猴桃)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(356).
Pucciniastrum actinidiae Hirat. f. (锈病) 台湾(269, 280, 289).**A. kolomichta** Max. (深山木天蓼)*Uncinula necator* (Schw.) Burr. (白粉病) 吉林(313).**A. lanata** Hemsl. (毛楊桃)*Phyllactinia imperialis* Miyabe (= *P. salmonii* Blumer) (白粉病) 广西(208, 213).**A. latifolia** Nakai (闊叶弥猴桃)*Phyllactinia imperialis* Miyabe (= *P. salmonii* Blumer) (白粉病) 台湾(356).**A. sp.** (弥猴桃属)*Phyllactinia imperialis* Miyabe (= *P. salmonii* Blumer) (白粉病) 广西(208, 213).**Actinodaphne mushensis** Hay.*Irene kiraiensis* Yamam. (煤病) 台湾(383).**A. sp.***Meliola actinodaphnes* Hansf. (煤病) 广西(254).

Actinostemma lobatum Max. (合子草)*Cercospora actinostemmae* Saw. (叶斑病) 台湾(359).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 浙江(219).*E. polygoni* DC. (白粉病) “东北”(282).**A. lobatum** Max. var. **racemosum** Max. (合子草)*Pseudoperonospora cubensis* (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287, 356).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).**Adenophora divaricata** Franch. et Sav. var. **manshurica** Kitag.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) “东北”(272).**A. jasionifolia** Franch.*Puccinia adenophorae* Diet. (锈病) “西康”(340).**A. morrisonensis** Hay.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 台湾(289).**A. pereskiaefolia** G. Don.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272).**A. polymorpha** Ledeb.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 陕西(237).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).**A. remotiflora** Miq. (薺萋)*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 安徽(231).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 安徽(219), 江苏(219).*Pseudopeziza radians* (Rob. et Desm.) Sacc. 黑龙江(313).*Puccinia adenophorae* Diet. (锈病) 吉林(249).**A. rupicola** Hemsl.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 陕西(64).**A. scabridula** Nannf.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 河北(64).**A. stricta** Miq. (杏叶沙参)*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 陕西(7).**A. verticillata** Fisch. (沙参)*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 湖南(306), 台湾(278).*Septoria adenophorae* Thuem. (斑枯病) 黑龙江(313), 江苏(47).

Adenophora verticillata Fisch. var. *typica* Regel.*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 台湾(278).**A. sp.** (沙参属)*Aecidium adenophorae* Jacz. (锈病) 江苏(47), 江西(47).*Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. (锈病) 辽宁(313), 江西(245).**Adina rubella** Hance (水楊柳)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**Adinandra chingii** Metcalf. (茶花)*Cephaleuros virescens* Kunzt. (藻斑病) 广东(80).**Adonis amurensis** Regel. et Radd. (侧金盞花)*Plasmopara pygmaea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 台湾(287).**Aeluropus littoralis** Parl. var. *sinensis* Debeaux*Puccinia tangkuensis* Liou et Wang (锈病) 河北(66).*P. zoysiae* Diet. (锈病) “东北”(313).**Aeschynomene indica** L. (合萌, 田皂角)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) “东北”(282).**Agalma lutchuense** Nakai*Diplodia natalensis* Evan. (*Physalospora rhodina* Berk. et Curt.) 台湾(356).**Agave americana** L. (龙舌兰)*Colletotrichum agaves* Cav. (炭疽病) 台湾(350).*Coniothyrium agaves* (Mont.) Sacc. 四川(150), 河南(13).**A. rigida** Mill. var. *sisalana* Pers. (剑麻)*Colletotrichum agaves* Cav. (炭疽病) 台湾(350).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Pleomassaria agaves* Saw. 台湾(350).**Ageratum corryzoides** L. (藿香薷)*Alternaria agerati* Saw. (黑斑病) 台湾(359).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 广东(100).**Agrimonia eupatoria** L. (龙芽草)*Oidium agrimoniae* Saw. (白粉病) 台湾(356).*Pucciniastrum agrimoniae* (Schw.) Tranzsch. (锈病) 黑龙江(272, 313), 吉林(313), 辽宁(313), 陕西(7), 河南(13), 山东(66), 安徽(231), 台湾(289).**A. pilosa** Ledeb. var. *japonica* Nakai (龙芽草)*Pucciniastrum agrimoniae* (Diet.) Tranzsch. (锈病) “东北”(272).

Agrimonia zeylanica Moon (龙茅草)

Pucciniastrum agrimoniae (Diet.) Tranzsch. (锈病) 云南(214), 湖南(214).

A. sp. (龙茅草属)

Pucciniastrum agrimoniae (Diet.) Tranzsch. (锈病) 贵州(231, 245), 安徽(231), 江西(231), 广西(231, 245).

Agropyron chinense Ohwi (硷草)

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 黑龙江(60).

A. ciliare (Trin.) Franch. (纤毛鹅冠草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 江苏(68).

Epichloe typhina (Pers.) Tul. (香柱病) 四川(150), 江苏(68).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 四川(150), 江苏, (68, 219).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 四川(150), 江苏(68).

Puccinia agropyri-ciliaris Tai et Wei (锈病) “东北”(272, 290), 江苏(220).

P. glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 四川(150).

Ustilago aculeata (Ule) Liro (黑粉病) 江苏(32, 104, 220).

A. cristatum (L.) Gaertn. (扁穗鹅观草, 大麦草, 冰草, 麦穗草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 江苏(68).

Epichloe typhina (Pers.) Tul. (香柱病) 江苏(68).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 江苏(68).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 江苏(68).

A. repens P. Beauv.

Puccinia graminis Pers. (稈锈病) 新疆(67).

P. rangiferina Ito (锈病) 吉林(313).

A. semicostatum Nees (鹅冠草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 甘肃(167), 四川(150), 江苏(68).

Epichloe typhina (Pers.) Tul. (香柱病) 江苏(68).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 四川(150), 江苏(68).

Agropyron semicostatum Nees (鵝冠草)

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 四川(150), 云南(306), 江苏(68).

Puccinia coronata Corda (冠銹病) 河北(171).

P. glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条銹病) “西康”(32), 四川(32, 150), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(8), 江西(32, 36).

P. rangiferina Ito (銹病) 吉林(313).

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (叶銹病) 四川(150).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黃化矮縮病) 台灣(287).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

A. sp. (鵝冠草屬)

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 江苏(219), 浙江(47, 219).

Urocystis agropyri (Preuss.) Schroet. (= *U. tritici* Koern.) (稈黑粉病) 黑龍江(153), 河北(153), 陝西(153), 四川(153), 湖北(153), 河南(153), 山東(153), 江苏(153), 浙江(32, 104, 153).

Ustilago aculeata (Ule) Liro (黑粉病) 江苏(153).

Agrostis flaccida Hack. var. **morrisonensis** Honda

Puccinia agrostidis Plowr. (銹病) 台灣(280, 290, 359).

A. palustris Huds.

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黃化矮縮病) 台灣(287).

A. perennana Tuck. (剪股穎)

Puccinia agrostidis Plowr. (銹病) 台灣(280).

A. sp. (剪股穎屬)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麥角病) 新疆(88).

Puccinia agrostidicola Tai (銹病) 甘肅(214).

P. coronata Corda (冠銹病) 河北(317), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36).

P. glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条銹病) 新疆(88).

P. graminis (Pers.) Fuck. (稈銹病) 新疆(88).

Ailanthus altissima (Mill.) Sw. (樗, 臭椿)

Cercospora glandulosa E. et K. (褐斑病) 河南(13), 江苏(231).

Haplosporella ailanthi E. et E. 河北(20).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(313), 河北(172, 208, 209, 219, 231, 315), 西康(57), 貴州(174), 湖北(219), 湖南(213, 231), 河南(13), 山东(231), 安徽(219), 江苏(201, 219), 江西(231), 福建(208).

Phyllosticta ailanthi Sacc. 河北(316).

Uncinula delavayi Pat. (白粉病) “西康”(57), 江苏(47, 106).

A. sp. (樗屬)

Stereum purpureum Pers. 陝西(237).

Uncinula delavayi Pat. (白粉病) 云南(334).

Akebia quinata Decne. (木通)

Aecidium akebiae P. Henn. (锈病) 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 64).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 西康(57), 江苏(219).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

A. trifoliata (Thunb.) Koidz. (八月柞)

Aecidium akebiae P. Henn. (锈病) 江苏(32, 36, 47), 浙江(32, 36), 江西(47).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 河南(13).

Alangium chinense (Lour.) Rehd. (华瓜木, 八角枫)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(231), 安徽(219), 江苏(219), 浙江(219), 江西(219).

Septoria taiana Syd. (斑枯病) 江苏(364).

A. platanifolium Harms. (八角枫)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 213, 226), 江苏(106).

Septoria acerina Speg. (斑枯病) 安徽(47).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Albizzia fastigiata

Ravenelia minima Cke. (锈病) 江苏(106).

A. julibrissin Durazz (合欢)

Ravenelia japonica Diet. et Syd. (锈病) 四川(150, 214).

Albizzia julibrissin Durazz (合欢)

Sphaerophragmium acaciae (Cke.) Magn. (锈病) 广东 (233).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

A. kalkora Prain (花旦)

Ravenelia japonica Diet. et Syd. (锈病) 湖南 (32, 36, 214), 山东(66), 江苏(32, 36, 218, 364).

A. lebbek (L.) Benth. (合欢)

Colletotrichum lebbek (Syd.) Petr. (炭疽病) 广东 (352).

Phoma lebbek Saw. 台湾(355).

Sphaerophragmium acaciae (Cke.) Magn. (锈病) 福建 (10, 32, 36, 113), 广东(32, 36, 201, 274), 广西(274), 台湾 (290).

A. sp. (合欢属)

Fomes connatus (Weinm.) Gill. (白色心材腐朽) 河北 (20).

Ravenelia japonica Diet. et Syd. (锈病) “东北”(272), 贵州(245), 江西(245), 广东(32, 36).

Aleurites cordata Muell-Arg. (罌子桐)

Cercospora aleuritidis Miyake (*Mycosphaerella aleuritidis* (Miyake) Ou) (角斑病) “西康”(57), 云南(111), 湖南 (191, 315).

A. fordii Hemsl. (油桐)

Cercospora aleuritidis Miyake (*Mycosphaerella aleuritidis* (Miyake) Ou) (角斑病) 四川(150, 191), 云南(112, 212), 湖南(112, 215), 福建(10), 广西(215).

Uncinula miyabei (Salm.) Sacc. et Syd. var. *aleuritis* Wei (白粉病) 四川(150, 226).

丛枝病 (Witch's broom) 山西(319).

Elytranthe ampullacea Don. (木蒴苳寄生) 广西(160).

Viscum angulatum Heyne. (青刚櫟寄生) 广西(160).

V. articulatum Birm. f. (无叶枫寄生) 广西(160).

A. sp. (油桐属)

Melampsora aleuritidis Cummins (锈病) 贵州(245).

Coniothyrium aleuritis Teng 江苏(29, 32).

Allium bakeri Regel. (薤, 野薤)

Peronospora schleideni Unger. (霜霉病) “东北”(287), 内蒙(372), 新疆(372), 台湾(287).

Puccinia allii (DC.) Rudolphi (锈病) 河北(316), 台湾(290).

A. cepa L. (洋葱)

Alternaria porri (Ell.) Cif. (黑斑病) 陕西(16).

Aspergillus niger van Tiegh. 河北(116).

Botrytis allii Munn. (灰霉病) 四川(194).

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. (炭疽病) 河南(13).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Fusarium angustum Sherb. ——(135).

F. avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. lateritium Nees. (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) ——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ——(135).

F. orthoceras App. et Wr. ——(135).

F. oxysporum Schl. f. 7 Wr. ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. 江苏(128), ——(135).

F. vasinfectum Atk. f. 1 Wr. ——(135).

F. vasinfectum Atk. f. 2 Wr. ——(135).

F. vasinfectum Atk. var. *zonatum* (Sherb.) f. 1 (Lk. et Bail.) Wr. ——(135).

Macrosporium commune Rab. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rab.) (黑斑病) 江苏(29, 32, 128), 浙江(8), 福建(10), “华南”(342).

Mycosphaerella olivaceum Weh. (黑斑病) 福建(10, 121).

M. schoenoprasii (Rab.) Schroet. 江苏(201).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 江苏(128).

Peronospora schleideni Ung. (霜霉病) “东北”(287), 安徽(47), 江苏(128), 台湾(287).

Sclerotinia allii Saw. (菌核病) 新疆(88), 台湾(350).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (软腐病) 江苏(128).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 广东(100).

Allium fistulosum L. (葱)

Alternaria porri (Ell.) Cif. (黑斑病) 黑龙江(60,294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372,373), “热河”(294), 山西(373), 四川(75,150), 云南(112,212), 湖南(112), 河南(374), 山东(374), 福建(10), 台湾(356).

Botrytis allii Munn. (基莖腐病) 四川(194), 河南(13).

Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 湖南(112), 河南(374), 山东(374).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Heterosporium allii Ell. et Mart. 四川(91).

Macrosporium commune Rabh. (Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.) (黑斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “东北”(371), 湖南(112), 河南(13), 山东(374), 江苏(106), 台湾(350).

Mycosphaerella schoenoprasii (Aud.) Schroet. (叶枯病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(315), 四川(150), 湖南(112), 河南(13), 江苏(106), 福建(10,121), 台湾(350).

Peronospora destructor (Berk.) Casp. (霜霉病) 四川(150).

P. schleideni Unger. (霜霉病) 吉林(43a,294), 辽宁(43a,294), 东北(287), 内蒙(372,373), “热河”(294), 河北(173), 山西(319), 四川(75), 湖南(112), 河南(13), 江苏(106), 广东(112), 广西(178), 台湾(287,351).

Phytophthora allii Saw. 台湾(287,348,350).

Puccinia allii (DC.) Rudolphi. (锈病) 辽宁(294,313), 新疆(88), 四川(75), 江苏(106), 浙江(47), 台湾(290).

Puccinia porri (Sow.) Wint. (锈病) 吉林(294), 云南(111,112,212), 湖南(112).

Sclerotinia allii Saw. (菌核病) 台湾(350).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Sclerotium cepivorum Berk. (菌核病) 辽宁(294).

A. ledebourianum Schult. f. (丝葱)

Peronospora schleideni Unger. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

A. longistylum Baker

Puccinia allii (DC.) Rudolphi. (锈病) 山东(66).

Allium nipponicum Fr. et Sav. (山韭)*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi. (锈病) 河南(13).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**A. odorum** L. (韭菜)*Colletotrichum circinans* (Berk.) Vogl. (炭疽病) 四川(150).*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi. (锈病) 河北(63), 河南(13), 台湾(290).*Sclerotium cepivorum* Berk. (菌核病) 辽宁(294).*Septoria allii* Moesz. (斑枯病) 河北(261).**A. porrum** L. (大葱, 南欧葱)*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) 河北(116).*Mycosphaerella schoenoprasii* (Aud.) Schroet. (叶尖萎黄病) 河北(116).**A. sativum** L. (大蒜)*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) 湖南(112), 广东(112).*M. porri* Ell. (黑斑病) 福建(121).*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi (锈病) 云南(111).*P. porri* (Sow.) Wint. (锈病) 云南(112, 212), 福建(10).**A. scorodoprasum** L. (蒜)*Heterosporium allii* Ell. et Mart. 四川(150).*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) 四川(33, 194), 广西(33, 37).*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi (锈病) 台湾(280, 290).**A. scorodoprasum** L. var. *viviparum* Regel.*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) 辽宁(294).*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi (锈病) 黑龙江(272, 294), 台湾(278).**A. tuberosum** Roxb. (韭)*Puccinia allii* (DC.) Rudolphi (锈病) 河北(63).**A. sp.** (葱属)*Colletotrichum circinans* (Berk.) Vogl. (炭疽病) “热河”(345).*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) “西康”(57), 浙江(8).

Allium sp. (葱属)

M. porri Ell. (黑斑病) “热河”(345).

Peronospora schleideni Unger. (霜霉病) “西康”(57).

Puccinia allii (DC.) Rudolphi (锈病) 河北(231), 陕西(7, 237).

P. porri (Sow.) Wint. (锈病) 江苏(32, 36, 201, 231).

Alniphyllum pterospermum Matsum.

Meliola alniphylli Yamam. (煤病) 台湾(381).

Alnus cremastogyne Burk. (榿木)

Melampsoridium alni (Thuem.) Diet. (锈病) 四川(150, 214).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 208, 213, 226).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 湖南(160).

A. formosana (Burk.) Mak. (水柯子)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(350).

A. hirsuta Turcz.

Melampsoridium hiratsukanum Ito (锈病) “东北”(268).

A. japonica Sieb. et Zucc. (赤楊)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 山东(208).

Phyllosticta bellunensis Mart. (叶斑病) 辽宁(313).

Septoria alnifolia Ell. et Ev. (斑枯病) 辽宁(313).

Uncinula miyabei (Salm.) Sacc. et Syd. (白粉病) 辽宁(282).

A. maritima Nutt.

Melasmia alni Syd. (黑痣病) 广东(362).

A. nepalensis Don. (蒙自榿木, 冬瓜木)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(213).

A. sp. (榿木属)

Antennaria pannosa Berk. 云南(333).

Melasmia alni Syd. (黑痣病) 广东(362).

Plasmodiophora alni (Woron.) Moll. (根肿病) 云南(306).

Alocasia odora C. Koch. (海芋, 山芋)

Cercospora alocasiae Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Uredo alocasiae Syd. (锈病) 台湾(280, 290).

Alopecurus aequalis Sobol. (看麦娘)

Fusicladium alopecuri Ell. et Ev. (叶斑病) 江苏(29, 32, 68).

Alopecurus aequalis Sobol. (看麦娘)

Helminthosporium oryzae Breda de Haan (胡麻斑病) 台湾(351).

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 黑龙江(313), 吉林(313), 河南(13), 安徽(231), 江苏(32, 36, 68, 231), 江西(32, 36).

A. agrestis L.

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

A. amurensis Komar.

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) “东北”(272).

A. arundinaceus Poir. (大花看麦娘)

Fusicladium alopecuri Ell et Ev. (叶斑病) 江苏(68).

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 江苏(68).

A. fulvus L.

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 台湾(350).

A. geniculatus L.

Fusicladium alopecuri Saw. 台湾(358).

Tilletia alopecuri (Saw.) Ling (腥黑粉病) 台湾(152, 153, 288).

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 台湾(290).

A. japonicus Steud. (日本看麦娘)

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 四川(150).

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 四川(150).

A. pratensis L. (草原看麦娘)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 云南(214).

A. sp. (看麦娘属)

Uromyces alopecuri Seym. (锈病) 广西(246).

Alpinia kelungensis Hay.

Phyllosticta alpiniae-kelungensis Saw. 台湾(358).

A. speciosa K. Schum. (艳山薑)

Dactylium alpiniae Saw. 台湾(354).

Alternanthera nodiflora R. Br. (节花虾钳菜)

Cercospora alternantherae-nodiflorae Saw. 台湾(354).

A. sessilis R. Br. (虾钳菜)

Albugo bliti (Biv.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 四川(150), 台湾(287, 351).

Alternanthera sessilis R. Br. (虾钳菜)*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**Althaea rosea** Cav. (蜀葵, 一丈红)*Cercospora althaeina* Sacc. (叶斑病) “华北”(258), 甘肃(215), “西康”(57), 四川(150), 河南(374), 山东(374), 江苏(29, 32, 106), 广东(370), 台湾(377), “华南”(342).*Myrothecium roridum* (Tode) Fr. 四川(150).*Phyllosticta althaeina* Sacc. 四川(150).**Alysicarpus vaginalis** DC. (鍊莢豆)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 台湾(350).**Amaranthus blitum** L. (野苋)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白粉病) 黑龙江(60)? 河北(374), 广东(141).*Alternaria amaranthi* (Peck) Hook 河北(374), “西康”(57).**A. blitum** L. var. *oleraceus* Hook f. (苋菜)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白锈病) 东北(287), 台湾(287).**A. caudatus** L. (老鎗谷, 千穗谷)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白锈病) 吉林(313).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**A. inamoenus** Wild. f. *viridis* Mak. (苋)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白锈病) 东北(287), 台湾(287).**A. mangostanus** L. (苋菜)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白锈病) 河北(166, 197), 四川(75, 150, 194), 河南(13), 江苏(106), 福建(10), 广西(37, 178).*Colletotrichum erumpens* (Sacc.) Sacc. var. *amaranthi* Teng (炭疽病) 河南(13).*Phoma macrostylospora* Saw. 台湾(351).*Phyllosticta amaranthi* Ell. et Kell. (叶斑病) 河南(13).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**A. paniculatus** L. (繁穗谷)*Albugo bliti* (Biv.) Kuntze (白锈病) 浙江(231).*Myrothecium roridum* (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Amaranthus spinosus L. (刺莧)

Albugo bliti (Biv.) Kuntze (白銹病) 江苏(193,201).

Colletotrichum erumpens Sacc. (炭疽病) 江苏(32), 福建(32).

C. erumpens Sacc. var. *amaranthi* Teng (炭疽病) 江苏(29), 福建(29).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

A. tricolor L. (雁来紅).

Albugo bliti (Biv.) Kuntze (白銹病) 四川(150), 湖南(112).

Cercospora brachiata Ell. et Ev. 广东(215).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150,229).

Phyllosticta amaranthi Ell. et Kell. (灰斑病) 湖南(112).

A. viridis L. (野莧)

Albugo bliti (Biv.) Kuntze (白銹病) 黑龙江(313), 吉林(313), 辽宁(313), 华南(342).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

A. sp. (莧屬)

Albugo bliti (Biv.) Kuntze (白銹病) “西康”(57), 四川(193), 貴州(174), 江苏(128,193).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江西(158).

Amelanchier sp.

Coleopuccinia sinensis Pat. (銹病) 云南(336).

Amorpha fruticosa Trin. (紫穗槐)

Haplosporella amorphae (Ell. et Barth.) Togashi 河北(374).

Amorphophallus gigantiflorus Hay.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

A. konjac K. Koch. (蒟蒻)

Cercospora amorphophalli P. Henn. 云南(215).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Erwinia carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) “西康”(57).

Ampelopsis brevipedunculata Koehne (蛇葡萄)

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (銹病) ——(231).

Ampelopsis humulifolia Bge. (葎草叶蛇葡萄)

Septoria ampelopsidis-heterophyllae Miura (斑枯病)
辽宁(313), 河北(313).

A. japonica Merr. (日本蛇葡萄)

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 安徽
(245).

Andropogon annulatus Forsk. (双花草)

Puccinia cesatii Schroet. (锈病) 四川(150, 214), 云南
(214).

A. citratus DC.

Puccinia purpurea Cke. (锈病) 台湾(290).

A. intermedius R. Br. var. **punctatus** Hack.

Puccinia nakanishikii Diet. (锈病) 台湾(278, 290).

A. micranthus Kunth. (吊丝草)

Placostroma ischaemi Saw. 台湾(360).

Puccinia nakanishikii Diet. (锈病) 台湾(290).

P. pusilia Syd. (锈病) 四川(214), 云南(214), 湖南(214).

Sphacelotheca capillipedii Ling (= *Sorosporium andropogonismicranthi* Ling et Chen) (黑粉病) 福建(114).

S. taiana (Syd.) Ling (= *Ustilago taiana* Syd.) (黑粉病)
江苏(32, 104, 364).

A. sorghum Brot. var. **sudanensis** Piper.

Ascochyta sorghi Sacc. (褐斑病) 江苏(68).

Cercospora sorghi Ell. et Ev. (紫斑病) 江苏(68).

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Eils. (炭疽病) 河北
(261, 374), 江苏(68).

Phyllosticta sorghina Sacc. 河北(374).

Ramulispora sorghi (Ell. et Ev.) L. S. Olive et le Febure
江苏(68).

A. sp. (鬚芒草属)

Epichloe cinerea B. et Br. (香柱病) 貴州(231).

Hendersonia kwangsiensis Petr. 广西(340).

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (锈病) 广西
(245).

Phyllachora andropogonis Karst. et Har. (叶斑病) 广东
(141), “华南”(342).

Puccinia duthiae Ell. et Tracy (锈病) 云南(214), 广东
(247).

Anemone althaica Fisch. (菊形双瓶梅)*Plasmopara pygmaea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 台湾(287).**A. chinensis** Bge. (白头翁)*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet. (锈病) “东北”(313), 江苏(32,36).*T. pulsatillae* (Opiz.) Diet. (锈病) “东北”(313), 江苏(32,36).*Urocystis anemones* (Pers.) Wint. (黑粉病) 辽宁(153), 江苏(32,104,153).**A. dichotoma** L. (草玉梅)*Plasmopara pygmaea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 台湾(287).**A. japonica** S. et J. (秋牡丹)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 四川(150,226).*Puccinia magnusiana* Koern. (锈病) 山西(340), 四川(150).*Urocystis japonica* (P. Henn.) Ling (黑粉病) 四川(149, 150,153).**A. raddeana** Regel. (鹅掌草)*Plasmopara pygmaea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 辽宁(313), 台湾(287).*Urocystis anemones* (Pers.) Wint. (黑粉病) 辽宁(104, 153), 江苏(153).**A. vitifolia** Buch.-Ham. (野棉花)*Aecidium pulsatillae* Tranzsch. (锈病) 台湾(271,290).*Puccinia magnusiana* Koern. (锈病) 河南(13).**A. vitifolia** Buch.-Ham. var. *elegans* Ham.*Puccinia magnusiana* Koern. (锈病) 四川(150).**A. sp.** (银莲花属)*Puccinia magnusiana* Koern. (锈病) 陕西(237).*P. rubigo-vera* (DC.) Wint. (锈病) 广西(246).*Septogloeum anemones* Miyake 河北(317).*Urocystis japonica* (P. Henn.) Ling (黑粉病) “热河”(317), 四川(153).**Angelica dahurica** B. et H.*Puccinia nanbuana* P. Henn. (锈病) 吉林(313).**A. miqueliana** Max. (山芹)*Puccinia angelicicola* P. Henn. (锈病) 黑龙江(313).

Angelica morrisonicola Hay.*Puccinia nokoensis* Saw. (锈病) 台湾(290,359).**A. polymorpha** Max. (当归, 山芎藭)*Puccinia angelicicola* P. Henn. (锈病) 东北(290).**A. sinuata** Wolff*Puccinia nanbuana* P. Henn. (锈病) 山东(66).**A. tshiliensis** Wolff*Puccinia nanbuana* P. Henn. (锈病) 河北(66).**A. sp.** (当归属)*Plasmopara nivea* (Ung.) Schroet. (霜霉病) 浙江(220).*Protomyces macropus* Ung. 辽宁(313).*Puccinia nanbuana* P. Henn. (锈病) 江苏(218).**Anisomeles indica** (L.) Kuntze (馬衣叶)*Cercospora anisomelicola* Saw. (叶斑病) 台湾(359).**Anthogonium gracile** Wall. (紅花小独蒜)*Coleosporium bletiae* Diet. (锈病) 新疆(340).**Antidesma gracile** Hemsl.*Crossopora antidesmae-dioicae* (Syd.) Arth. et Cummins
(锈病) 福建(32,36).**A. sp.***Aschersonia badia* Pat. 广西(231).**Antirrhinum majus** L. (金魚草)*Phyllosticta antirrhini* Syd. (叶斑病) 四川(150).*Septoria antirrhini* Rob. et Desm. 四川(150).*Xanthomonas antirrhini* (Takim.) Dowson (細菌斑点病)
江苏(138).**Aphanathe aspera** (Fh.) Pl. (糙叶树)*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(164,165).**Apium graveolens** L. (芹菜, 和蓝鴨儿菜)*Cercospora apii* Fr. (叶斑病) 黑龙江(60,294), 吉林(294),
辽宁(294), 东北(321), “热河”(294), 河北(116, 321),
陝西(16), 甘肃(215), “西康”(57), 四川(150), 云南(111,
112,212,215), 貴州(196), 湖南(112), 河南(13), 江苏(47,
106,128), 广西(30,32,37), 台湾(351), “华南”(342).*Phoma apiicola* Speg. 江苏(128).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏
(128), 台湾(350).

Apium graveolens L. (芹菜, 和蓝鴨儿菜)

Septoria apii (Brosi et Cav.) Chester (斑枯病) 黑龙江 (294), 四川(150), 河南(13), 江苏(128).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 辽宁(294), 江苏(128), 福建(10).

Pseudomonas apii Jagg. (叶斑病) 河南(13).

Callistephus virus 1 A “西康”(57).

花叶病 (Mosaic) 四川(127), 山东(127).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

Aptum sp. (芹屬)

Cercospora apii Fr. (叶斑病) 黑龙江(294).

Apluda mutica L. (水蔗草)

Sphacelotheca apludae (Syd.) Pavgi et Mundk. (黑粉病) 广东(153).

Uromyces inayati Syd. (锈病) 广东(32, 36).

A. mutica L. var. **aristata** Hack. (芒穎水蔗草)

Sphacelotheca apludae (Syd.) Pavgi et Mundk. (黑粉病) 广东(32, 104, 379).

Apocynum venetum L. (茶叶花)

Melampsora apocyni Tranzsch. (锈病) 江苏(269).

Arachis hypogaea L. (落花生)

Aspergillus niger van Tiegh. 山东(374).

Cercospora arachidicola Hori (*Mycosphaerella arachidicola* Jenk.) (叶斑病) 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345), 河北(51), 云南(212, 215), 貴州(196), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51), 广西(30, 32, 37, 215), 台湾(351).

C. personata (B. et C.) Ell. (*Mycosphaerella berkeleyi* Jenk.) (叶斑病) 吉林(294), 辽宁(294)? 河北(51, 116, 166, 197, 321, 374), 山西(319), 西康(57), 四川(75, 150, 194, 221), 云南(212, 215), 湖北(312), 湖南(29, 32, 112), 河南(13), 山东(51, 321), 安徽(47, 51), 江苏(29, 32, 47, 51, 106, 128), 浙江(49), “华东”(341), 福建(10, 29, 32, 113), 广东(112, 215, 389), 广西(32, 37, 178, 215), 台湾(351), “华南”(342).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (根腐病) 江苏(128), 福建(10), 广东(76), 台湾(350).

Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) f. 3 Snyder — (135).

Arachis hypogaea L. (落花生)

F. vasinfectum Atk. (枯萎病) ——(135).

Helicobasidium mompa Tanaka (紫紋羽病) 辽宁(294).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖腐病) 安徽(19), 福建(19).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(347, 350).

Puccinia arachidis Speg. (銹病) 河北(171).

Sclerotinia arachidis Hanzawa (菌核病) 新疆(88), “西康”(57).

S. miyabeana Hanzawa (莖腐病) 山西(50), 河南(13), 江苏(128).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) 广东(101a), 广西(37).

Arachis virus 1 (簇生病) 西康(57).

丛枝病 (Groundnut rosette) 广东(120).

花叶病 (Mosaic) 山东(127), 福建(10, 113).

Dictylenchus dipsaci (Kuehn.) Filipj. (綫虫病) 福建(10).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

Aralia chinensis L. (楸木)

Aecidium araliae Saw. (銹病) 台湾(290, 359).

Cercospora araliae P. Henn. (叶斑病) 辽宁(313), 台湾(357, 378).

Cladosporium araliae Saw. (黑霉病) 台湾(358).

Meliola araliicola Yamam. (煤病) 台湾(385).

Nyssopsora asiatica Lutj. (銹病) 吉林(369), “东北”(295, 308, 313).

A. cordata Thunb. (土当归)

Cercospora araliae-cordatae Hori (叶斑病) 辽宁(294), “华北”(258).

Phyllosticta araliae Sacc. et Berl. 貴州(294).

A. dasycphylla Miq. (毛叶楸木)

Cercospora araliae P. Henn. (叶斑病) 貴州(240)? 安徽(240), 江西(240), 广西(240).

A. sp. (楸木属)

Cercospora araliae P. Henn. (叶斑病) 貴州(240).

Arctium lappa L. (牛蒡)

Phyllosticta lappae Sacc. (叶斑病) 黑龙江(294).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).

Xanthomonas nigromaculans (Takim.) Dowson (黑斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(321).

A. majus Bernh.

Puccinia bardanae (Wallr.) Corda (锈病) 江西(246).

Ardisia sieboldi Miq.

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 台湾(350).

Areca catechu L. (檳榔)

Guignardia arecae Sacc. 台湾(358).

Phyllosticta catechu Saw. 台湾(358).

Arenaria juncea Bieb.

Mycosphaerella tassiana (de Not.) Johans. 河北(340).

Arisaema ambiguum Engl.

Cercospora arisaemae Tai (叶斑病) 江苏(210).

A. serratum Schott. (斑杖)

Phyllosticta araliae Sacc. et Berl. 江苏(47).

Aristolochia sp. (馬兜鈴属)

Puccinia aristolochiae (DC.) Wint. (锈病) 河北(317).

Artabotrys odoratissimus R. Br. (鶯爪花)

Colletotrichum artabotrydis Saw. (炭疽病) 台湾(358).

Uredo artabotrydis Syd. (锈病) 台湾(280, 290, 367).

Artemisia annua L. (黄花蒿)

Peronospora artemisiae-annuae Ling et M. C. tai (霜霉病) 四川(150, 155).

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) 河北(63), 新疆(67), 山东(66, 374).

A. argyi Lev. et Van. (家艾, 艾)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 四川(150).

A. capillaris Thunb. (茵陈蒿)

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 台湾(271).

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) 河北(63, 66).

P. ferruginosa Syd. (锈病) 台湾(280, 290, 359).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) (165).

Artemisia cina Berg. (山道年, 蚬蒿)*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 新疆(67).**A. desertorum** Spreng.*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 辽宁(313).**A. dracunculus** L.*Phakopsora artemisiae* Hirat. f. (锈病) 云南(214).*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 陕西(7).**A. dubia** Wall.*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 云南(214).**A. eriopoda** Bge. (牡蒿)*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 陕西(7).*P. millefolii* Fuck. (= *P. artemisiicola* Syd.) (锈病) 河北(62).**A. frigida** Willd.*Puccinia artemisiae-keiskeanae* Miura (锈病) 黑龙江(313).**A. japonica** Thunb. (牡蒿)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(172).*Phakopsora artemisiae* Hirat. f. (锈病) 台湾(289).*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 湖南(214).*P. ferruginosa* Syd. (锈病) 四川(150), 台湾(290, 359).*P. millefolii* Fuck. (锈病) 云南(214), 山东(66).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(315).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**A. keiskeana** Miq. (菴藷)*Puccinia artemisiae-keiskeanae* Miura (锈病) 辽宁(313).**A. lactiflora** Wall. (角菜)*Amastigia artemisiae* Saw. 台湾(358).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Phakopsora artemisiae* Hirat. f. (锈病) 台湾(289).*Phyllosticta artemisiae-lactiflorae* Saw. 台湾(358).*Puccinia atrofusca* (Dudl. et Thcomp.) Holw. (锈病) 黑龙江(313).**A. mongolica** Fisch.*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) 云南(214).

Artemisia parviflora Roxb.

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 云南(214).

A. sacrorum Ledeb.

Phakopsora compositarum Miyake (锈病) 河北(64), 陕西(7).

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) “东北”(290), 河北(63), 山东(66).

A. sacrorum Ledeb. subsp. **manshurica** Kitam.

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) “东北”(273).

A. sieversiana Ehrb.

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) 河北(63, 171), 新疆(67).

A. verbenacea (Komar.) Kitag.

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 云南(214).

A. vulgaris L. (艾)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 河北(172), 西康(57).

Nematostoma artemisiae Syd. 辽宁(313).

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 江苏(231), 浙江(231), 广东(274).

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC. (锈病) “热河”(317), 陕西(7), 江苏(47).

P. artemisiae-keiskeana Miura (锈病) 江苏(106).

P. atrofusca (Dudl. et Thomp.) Holw. (锈病) “热河”(317), 河南(13).

P. millefolii Fuck. (= *P. artemisticola* Syd.) (锈病) 陕西(7), 云南(214).

Septoria artemisiae Pass. (斑枯病) 吉林(313).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

A. vulgaris L. var. **indica** Max.

Cercosporidium artemisiae Saw. 台湾(359).

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 台湾(265, 289, 355).

Puccinia ferruginosa Syd. (锈病) “东北”(290), 台湾(280, 290).

A. vulgaris L. var. **parviflora** Max. (野艾蒿)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).

Artemisia vulgaris L. var. **vulgatissima** Bess. (萵蒿)*Phakopsora compositarum* Miyake (锈病) 河北(64).**A. sp.** (蒿属)*Cercospora ferruginea* Fuck. (叶斑病) 四川(150), 江苏(231), 江西(240).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 吉林(313), 江苏(201).*Peronospora sulfurea* Gaum. (霜霉病) 四川(150).*Phakopsora artemisiae* Hirat. f. (锈病) 贵州(245), 安徽(245).*P. compositarum* Miyake (锈病) 河北(316).*Puccinia absinthii* (Hedw. f.) DC. (锈病) “东北”(272), 河北(20, 32, 36), 陕西(237), 贵州(245), 安徽(245), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 广西(245).*P. adjuncta* Mitter (锈病) 安徽(246).*P. ferruginosa* Syd. (锈病) 四川(150).*P. millefolii* Fuck. (= *P. artemisiicola* Syd.) (锈病) 贵州(246), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 广西(246).*Uromyces oblongisporus* Ell. et Ev. (锈病) ——(317).**Arthraxon ciliare** Beauv. (伏地菜)*Bremia graminicola* Naum. (霜霉病) 吉林(287).**A. ciliare** Beauv. var. **cryptanthus** Hack.*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).**A. hispidus** (Thunb.) Mak. (蕪草)*Bremia graminicola* Naum. (霜霉病) 辽宁(313), “热河”(316), 四川(150).*Puccinia arthraxonis* (P. Henn.) Syd. et Butl. (锈病) 四川(150).*P. arthraxonis-ciliaris* Cummins (锈病) 台湾(247).**A. hispidus** (Thunb.) Mak. var. **typicus** Honda (蕪草)*Phyllachora arthraxonis-hispidi* Saw. (黑痣病) 台湾(358).*Puccinia arthraxonis-ciliaris* Cummins (锈病) 云南(214), 台湾(290).**A. lanceolatus** (Roxb.) Hochst. (予叶蕪草)*Puccinia aestivalis* Diet. (锈病) 安徽(246).

Arthraxon sp. (蘆草屬)

Puccinia arthraxonis (P. Henn.) Syd. et Butl. (銹病) 云南(214).

P. arthraxonis-ciliaris Cummins (銹病) 貴州(246), 广西(246).

Artocarpus integra Merr. (菠蘿蜜)

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 广东(76).

Elytranthe ampullaceae Don. (木菠蘿寄生) 广西(160).

Arundina chinensis Blume (竹叶兰)

Coleosporium arundinae Syd. (銹病) 台湾(277, 289, 350).

Arundinaria densiflora Rendle (苦竹)

Balansia take (Miyake) Hara (竹雀巢病) 浙江(8).

Coccostromopsis arundinariae (Hara) Teng (= *Coccodiella arundinariae* Hara) (里黑点病) 浙江(8).

Phyllachora phyllostachydis Hara (黑肿病) 浙江(8).

Stereostromum corticioides (Berk. et Br.) Magn. (竹蓐病) 浙江(8).

A. szechuensis Rendle (川青箬竹)

Papularia sphaerosperma (Pers.) von Hoehn. “西康” (340).

A. sp. (青箬竹属)

Puccinia phyllostachydis Kusano (銹病) 云南(314).

Stereostromum corticioides (Berk. et Br.) Magn. (銹病) “西康”(32), 四川(32, 194), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 广西(32).

Arundinella anomala Steud. (野古草)

Phyllachora arundinellae Saw. (黑痣病) 四川(150).

Puccinia arundinellae Barclay (銹病) 辽宁(313), 吉林(313), 河北(316).

P. arundinellae-anomalae Diet. (銹病) 辽宁(313), “东北”(290), 四川(150), 湖南(32, 36, 214), 山东(66), 安徽(231), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(231, 246), 福建(32, 36), 广西(32).

Tilletia arundinellae Ling (腥黑粉病) 四川(149, 150, 153).

Ustilaginoidea arundinellae P. Henn. (麴病) 四川(149, 150), 江苏(27, 32), 浙江(27, 32, 231).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

Arundinella arundinacea DC.

Puccinia coronata Corda (锈病) 貴州(246).

A. fluviatilis

Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et de Not. 湖南
(306).

A. hirta Koidz. var. ciliata Koidz.

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.
(霜霉病) 台湾(287).

A. nepalensis Trin. (石芒草)

Puccinia arundinellae Barclay (锈病) 云南(214).

A. setosa Trin. (刺芒野古草)

phyllachora arundinellae Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Puccinia arundinellae Barclay (锈病) 云南(214).

P. arundinellae-setosae Tai (锈病) 云南(214).

A. sp. (野古草属)

Puccinia arundinellae Barclay (锈病) 云南(214).

P. arundinellae-anomallae Diet. (锈病) 江苏(231).

P. coronata Corda (锈病) 貴州(246).

Arundo donax L. (蘆竹)

Uredo arundinis-donacis Tai (锈病) 云南(214).

A. formosana Hack. (台蘆竹)

Helminthosporium arundinis Lev. (叶枯病) 台湾(358).

Phyllachora arundinis Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Asarum sp. (細辛属)

Puccinia asaricola Tai et Cheo (锈病) 貴州(218).

P. asarina Kuntze (锈病) 貴州(231).

Asclepias curassavica L. (馬利筋)

Ovulariopsis asclepidis-curassaviae Saw. (白粉病) 台湾
(356).

Phoma asclepiadis Saw. 台湾(360).

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. (天冬草)

Puccinia asparagi-lucidi Diet. (锈病) 台湾(290).

A. officinalis L. (石刁柏)

Cercospora asparagi Sacc. (叶斑病) 辽宁(294), 江苏
(106).

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. 河南(374).

F. culmorum (Smith) Sacc., —(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.)
—(135).

Asparagus officinalis L. (石刁柏)

F. orthoceras App. et Wr. — (135).

F. semitectum Berk. et Rev. var. *majus* Wr. “东北” (294).

Phoma asparagi Sacc. (莖枯病) 黑龙江(294), 河北(321), 河南(374), 山东(321), 安徽(47), 江苏(128), 福建(10, 113), 台湾(350).

Puccinia asparagi DC. (锈病) 江苏(128).

P. asparagi-lucidi Diet. (锈病) 福建(10).

Rhizoctonia crocorum DC. (立枯病) 江苏(128).

A. sp. (天冬属)

Puccinia asparagi-lucidi Diet. (锈病) 河南(13), 江西(231), 广西(246).

Asperula odorata L. (車軸草)

Peronospora calotheca de Bary (霜霉病) “东北”(287).

A. platygalium Max.

Peronospora calotheca de Bary (霜霉病) 黑龙江(313), “东北”(287).

Aster ageratoides Turcz.

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) “东北”(272), 陕西(7).

Puccinia asteris Duby (锈病) 陕西(7).

A. chinensis L.

Septoria piriformis Miura (斑枯病) “西康”(57).

A. harrowianus Diels

Puccinia extensicola Plowr. (锈病) 云南(306).

A. indicus L. (鸡儿腸, 馬兰)

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) 四川(150), 山东(66), 台湾(289, 350, 368).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

Septoria astericola Ell. et Ev. (斑枯病) 四川(150).

A. scaber Thunb. (东风菜)

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) 辽宁(313), “东北”(272), 安徽(231).

Puccinia extensicola Plowr. (锈病) 辽宁(313), 热河(317).

Septoria piriformis Miura (斑枯病) 黑龙江(313).

Aster tataricus L. (紫菀)

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) 辽宁(313).

Septoria tatarica Syd. (*Mycosphaerella tatarica* (Syd.) Miura) (斑枯病) 吉林(313).

A. sp. (紫菀属)

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) “西康”(57), 贵州(245), 安徽(245), 江西(245), 广东(274), 广西(245).

Phakopsora artemisiae (Syd.) Hirat. f. (锈病) 安徽(245), 江西(245).

P. compositarum Miyake (锈病) 河北(316).

Puccinia extensicola Plowr. (锈病) 辽宁(313), 西康(57).

Asteromaea indica L. (鸡儿肠)

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313).

A. sp. (鸡儿肠属)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165)

Astilbe longicarpa Hay. (长果落新妇)

Pucciniostele clarkiana (Barcl.) Diet. (锈病) 台湾(276, 289, 356, 358).

Astragalus dahuricus (Pall.) de Candolle (达乌里紫云英)

Uromyces punctatus Schroet. (锈病) “东北”(275, 290).

A. frigidus (L.) A. Gr.

Placosphaeria onobrychidis Sacc. 云南(306).

A. mahoschanicus H.-M.

Phyllachora lathyri (Lev.) Theiss. et Syd. (黑痣病) “西康”(340).

A. melilotoides Pall. (野木樨状紫云英, 草木樨状黄芪)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209), 四川(150, 226).

A. nokoensis Sasaki

Septoria astragali Desm. (斑枯病) 台湾(360).

Uromyces punctatus Schroet. (锈病) 台湾(271, 290).

A. otosemius Kitagawa

Uromyces punctatus Schroet. (锈病) 东北(290).

A. scaberrimus Bge. (春黄花, 粗糙紫云英)

Uromyces punctatus Schroet. (锈病) 河北(315).

A. sinicus L. (紫云英)

Epicoecum sinense Petr. 四川(340), 湖南(340).

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 四川(150).

Astragalus sinicus L. (紫云英)*Polythrincium trifolii* Kze. 湖南(306).*Sclerotinia ciborioides* (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68), 浙江(8).*S. sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 浙江(54), 台湾(350).*Tuberculina nomuraina* Sacc. 四川(150).*Uromyces punctatus* Schroet. (锈病) 云南(214).**A. sp.** (黄蓍属)*Uromyces punctatus* Schroet. (锈病) 河北(171).**Atractylis japonica** Kitagawa (日本苍朮)*Puccinia aomoriensis* Syd. (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272).**A. lyrata** Sieb. et Zucc.*Puccinia aomoriensis* Syd. (锈病) “东北”(290).**A. ovata** Thunb. (苍朮)*Puccinia aomoriensis* Syd. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313), “东北”(290, 313), 河北(64, 66, 317), 河南(66), 江苏(218), 浙江(218).*P. hieracii* (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 陕西(237).**Atractylodes chinensis** (Bge.) Koitz. (苍朮)*Puccinia aomoriensis* Syd. (锈病) “东北”(218), 河南(13).*P. hieracii* (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 河南(13).**Aucuba chinensis** Benth. (桃叶珊瑚)*Asterina aucubae* P. Henn. (锈病) 台湾(359), —(340).**A. sp.** (桃叶珊瑚属)*Phyllosticta aucubae* Sacc. et Speg. 江苏(47).**Avena elastica** L.*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).**A. fatua** L. (野燕麦, 乌麦, 燕麦草)*Fusarium graminearum* Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).*Helminthosporium avenae* Eidam (*Pyrenophora avenae* (Eidam.) Ito et Kurib) (叶斑病) 江苏(68).*Puccinia coronata* Corda (锈病) 江苏(68).

Avena fatua L. (野燕麦, 烏麦, 燕麦草)

Ustilago avenae (Pers.) Rostr. (黑粉病) 黑龙江(153), 吉林(153), 辽宁(153), 河北(153), 山西(153), 四川(153), 江苏(32, 104, 153, 198, 201), 台湾(153).

U. hordei (Pers.) Lagerh. (黑粉病) 江苏(198).

A. flavescens L.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

A. sativa L. (燕麦)

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 黑龙江(294, 321), 内蒙(321, 373), 云南(156, 212), 贵州(53).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 贵州(53), 江苏(128).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(153).

F. culmorum (Smith) Sacc. ——(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 黑龙江(294), 河北(373), 贵州(53), ——(135).

F. nivale (Fr.) Ces. ——(135).

F. orthoceras App. et Wr. var. *longius* (Sherb.) Wr. ——(135).

F. poae (Pk.) Wr. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. ——(135).

Helminthosporium avenae Eidam (*Pyrenophora avenae* (Eidam) Ito et Kurib) (条纹病) 黑龙江(294), 内蒙(168), 山西(321), 四川(150), 贵州(53, 174), 江苏(128, 220), 台湾(350).

Pleospora trichostoma (Fr.) Ces. et de Not. “东北”(294).

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), “东北”(272, 290), 内蒙(168), 山西(321), 新疆(88), 四川(75, 150), 云南(212), 贵州(53, 174), 湖南(112), 江苏(128), 台湾(290).

P. glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 贵州(53).

P. graminis Pers. (并锈病) 黑龙江(294), 吉林(294), “东北”(272), 内蒙(373), 河北(373), 贵州(53), 江苏(128), 福建(10).

Avena sativa L. (燕麦)

Ustilago avenae (Pers.) Rostr. (散黑穗病) 黑龙江(153, 294), 吉林(153, 294, 313), 辽宁(153), 河北(153, 171), 山西(153, 321), 新疆(88), 四川(149, 150, 153), 河南(13), 江苏(128, 153), “华东”(341), 福建(10), 台湾(152, 153).

U. hordei (Pers.) Lagerh. (坚黑穗病) 黑龙江(153, 294), 吉林(153, 294, 313), 辽宁(153), “东北”(288), 内蒙(153, 168, 373), “热河”(153), 河北(116, 153, 198, 373), 山西(32, 104, 153, 198, 321, 373), 陕西(153), 甘肃(153), 青海(153), 新疆(88), 西康(57, 149, 153), 四川(32, 104, 153, 149, 150, 198), 云南(153, 156, 212), 贵州(53, 153, 174), 湖北(153), 河南(13, 149, 153), 山东(153), 安徽(153), 江苏(32, 104, 128, 153, 198, 201), 浙江(153), 福建(153), 广东(153), 广西(153), 台湾(152, 153, 288).

Pseudomonas coronafaciens (Ell.) Stapp. (细菌条纹病) 内蒙(138).

A. sp. (燕麦属)

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 内蒙(372).

Helminthosporium avenae Eidam (*Pyrenophora avenae* (Eidam) Ito et Kurib) (条纹病) 内蒙(372).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 陕西(237).

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 内蒙(372).

P. graminis Pers. (稈锈病) 内蒙(372).

Ustilago avenae (Pers.) Rostr. (散黑穗病) 河南(13).

U. hordei (Pers.) Lagerh. (坚黑穗病) 内蒙(372), 山西(231), 云南(306).

Averrhoa carambola L. (楊桃, 五斂子)

Cercospora averrhoae Petch (叶斑病) 广东(80).

Axyris amaranthoides L. (軸藜)

Peronospora chenopodii Casp. (霜霉病) 黑龙江(43a).

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. (观音竹)

Myriangium haraeae Tai et Wei 四川(150).

Prosthemiella bambusina Syd. 广东(365).

B. oldhami Munro (綠竹)

Dasturella divina (Syd.) Mundk. et Khesw. 台湾(278).

Dendrographium bambusae Saw. 台湾(358).

Bambusa pachinensis Hay.*Phyllachora sinensis* Sacc. (黑痣病) 台湾(358).**B. shimadai** Hay.*Dasturella divina* (Syd.) Mundk. et Khesw. 台湾(278).**B. spinosa** Roxb.*Phyllachora orbicula* Rehm. (黑痣病) 广东(389).*Puccinia ignava* Arth. (锈病) 广东(32, 36), 广西(32).*P. longicornis* Pat. et Har. (锈病) “西康”(57), 华南(342).**B. stenostachys** Hack. (簕竹)*Dasturella divina* (Syd.) Mundk. et Khesw. 台湾(278).*Phyllachora maculans* (Karst.) Theiss. et Syd. (黑痣病) 广东(340).**B. vulgaris** Wendl. (龙头竹)*Colletotrichum septorioides* Sacc. (炭疽病) “西康”(57), 广东(344).*Coniosporium shiraianum* (Syd.) Bubak 广西(231).**B. sp.** (簕竹属)*Cercosporidium bambusicolum* Saw. 台湾(360).*Chrysomyxa bambusae* Teng 广西(32).*Coccostromopsis arundinariae* (Hara) Teng (= *Coccodiella arundinariae* Hara) 安徽(26, 32), 江苏(26, 32), 浙江(26, 32), 广西(32). 湖南()*Coniosporium bambusae* (Thuem. et Bolle) Sacc. 云南(29, 32), 江苏(29, 32), 湖南(29, 32), 广东(370), 广西(32).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 四川(32), 江苏(32), 广西(32).*Dimerina bambusicola* Teng 江西(28, 32).*Endodothella bambusae* (Rabh.) Theiss. et Syd. 广东(362).*Konradia bambusina* Racib. 福建(260), 广东(26, 32).*Kweilingia bambusae* Teng 广西(30, 32).*Leptosphaerella bambusae* (Miyake et Hara) Sacc. 江苏(28, 32).*Melanconium bambusinum* Speg. 福建(344).*Phragmocarpella japonica* Hara 福建(32, 189).

Bambusa sp. (簕竹属)

- Phyllachora orbicula* Rehm. (黑痣病) 云南(32, 187).
P. shiraiana Syd. (黑痣病) 江苏(106), 广东(32, 187).
P. sinensis Sacc. (黑痣病) 西康(57), 云南(32, 187), 湖南(32, 187), 江苏(32, 187, 201), 浙江(32, 187), 福建(344), 广东(32, 187).
Puccinia kwangsienensis Tai (锈病) 四川(150, 214).
P. longicornis Pat. et Har. (锈病) 福建(344).
Septocytella bambusina Syd. 湖南(30, 32), 浙江(364).
Shiraia bambusicola P. Henn. (赤团子病) 四川(33).
Stereostratum corticioides Magn. (锈病) 浙江(49).

Bauhinia championi Benth. (龙鬚藤)

- Meliola bauhiniicola* Yamam. (煤病) 台湾(385).
Phyllachora bauhiniae Saw. (黑痣病) 台湾(359).
Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).
L. yadoriki Sieb. (樟寄生) 广西(160).

B. sp. (羊蹄甲属)

- Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).
Phyllosticta bauhiniae Cke. 广东(29, 32).

Beckmannia syzygachne Fern. (蔺藎)

- Puccinia coronata* Corda (锈病) 云南(214).

Begonia chinensis A. DC. (华秋海棠)

- Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(209).

B. evansiana Andr. (秋海棠).

- Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河南(13, 213).
Xanthomonas begoniae (Takim.) Dowson (細菌叶斑病) 河南(13), 江苏(68).

B. sinensis A. DC. (秋海棠)

- Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(116).

B. yunnanensis Levl. (云南秋海棠)

- Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 云南(213).

Beilschmiedia erythrophloia Hay. (琼楠)

- Meliola beilschmiediae* Yamam. (煤病) 台湾(383).

Belamcanda chinensis DC. (射干)

- Puccinia belamcandae* (P. Henn.) Diet. (锈病) 河北(63, 166, 197), 貴州(231), 山东(66), 台湾(290).

Benincasa hispida Cogn. (冬瓜)

Ascochyta cucumis Fautr. et Rohm. (*Mycosphaerella citrullina* (Smith) Gross.) (褐斑病) 河南(13).

Cercospora citrullina Cke. (叶斑病) 河北(258, 261).

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 辽宁(294), 热河(294), 河北(116), 陕西(16), 湖南(112), 河南(13).

Hypochnus cucumeris Frank. (白絹病) 河南(13).

Pseudoperonospora cubensis (B. et C.) Rost. (霜霉病) 河南(13), 江苏(128), 福建(10), “华南”(342).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 江苏(128).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) “各地”(138).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) “华南”(342).

花叶病 (Mosaic) ——(16).

Benzoin sp.

Puccinia aeguitatis Cummins (锈病) 广西(244).

P. cara Cummins (锈病) 广西(244).

P. lauricola Cummins (锈病) 贵州(244).

P. seposita Cummins (锈病) 广西(244).

Berberis acuminata Fr. (小檗)

Puccinia graminis Pers. (锈病) 四川(148), 云南(148).

B. amurensis Rupr. (小檗)

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lev. (白粉病) 河北(209, 213).

Puccinia graminis Pers. (锈病) 黑龙江(60, 169), “东北”(272).

P. pygmaea Erikss. (锈病) ——(245).

B. diaphana Max. (黄花刺)

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 四川(150, 226).

B. dielsiana Fedde (第氏小檗)

Puccinia graminis Pers. (锈病) 陕西(148), 四川(148), 河南(148).

B. gagnepainii Schn.

Puccinia graminis Pers. (锈病) “西康”(148), 四川(148).

Berberis gilgiana Fedde (奇氏小蘗)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 陝西(237).**B. henryana** Schn. (亨氏小蘗)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 四川(148, 150), 湖北(148), 安徽(148).**B. julianae** Schn. (蠟豬刺)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 陝西(148), 云南(148), 湖北(148).**B. kawakamii** Hay.*Pucciniosira clemensiae* Arthur et Cummins (锈病) 台湾(289).**B. levis** Franch. (老随子)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 四川(150), “西康”(148), 云南(148).**B. morrisonensis** Hay.*Aecidium nitakense* Hirat. (锈病) 台湾(290).**B. nepalensis** Spreng (十大功劳)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 广东(141).**B. poiretii** Schn. (波氏小蘗)*Microsphaera berberidis* (DC.) Lev. (白粉病) 吉林(313).*M. grossulariae* (Wallr.) Lev. (白粉病) 河北(209, 213).*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 河北(64).**B. pruinosa** Fr. (小蘗)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 云南(112, 148, 212, 214).**B. sargentiana** Schn. (刺黑珠)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 湖北(150).**B. silva-taroucana** Schn.*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 四川(150), “西康”(148), 四川(148).**B. virgetorum** Schn.*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 江西(148), 广东(148).**B. vulgaris** Linn. (刺蘗, 普通小蘗)*Microsphaera berberidis* (DC.) Lev. (白粉病) 新疆(88).*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 新疆(88).**B. wilsonae** Hemsl. (小黃蓮刺)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) 四川(150), “西康”(148), 四川(148), 云南(148).

Berberis sp. (小檗属)

Microsphaera berberidicola Tai (白粉病) 河南(213).

M. berberidis (DC.) Lev. (白粉病) 河北(315).

M. divaricata (Wallr.) Lev. (白粉病) 河南(13).

Puccinia graminis Pers. (锈病) 河北(317), 陕西(237), 河南(13), 浙江(8).

Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. (勾儿茶, 熊柳)

Puccinia coronata Corda (锈病) 陕西(237).

B. sp. (勾儿茶属)

Puccinia coronata Corda (锈病) 云南(214), 贵州(246), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(32, 36).

Beta vulgaris L. (甜菜)

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 吉林(313).

Cercospora beticola Sacc. (褐斑病) 黑龙江(60), 吉林(313), 辽宁(313), “热河”(345), 河北(166, 197, 321), 甘肃(215), “西康”(57), 四川(32, 150, 194, 215), 云南(111, 112, 212, 215), 贵州(174, 196), 湖南(112), 河南(13), 山东(231), 江苏(29, 32, 47, 106, 128, 201), “华东”(341), 福建(10), 广西(178), 台湾(351), “华南”(342).

Colletotrichum omnivorum de Bary (炭疽病) 河南(13).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (根腐病) 台湾(350).

Epicoccum nigrum Link. 四川(91).

Fusarium conglomerans Wr. var. *betae* Stewart (枯萎病) —(135).

F. culmorum (Smith) Sacc. —(135).

F. equiseti (Corda) Sacc. —(135).

F. merismoides Corda —(135).

F. oxysporum Schlecht. var. *aurantiacum* (Link.) Wr. —(135).

F. reticulatum Mont. —(135).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江苏(128).

Phoma betae Frank (蛇眼病) 吉林(313), 内蒙(372), 热河(345), 河北(373), 四川(150), 贵州(174), 河南(13), 江苏(128), 浙江(49).

Phyllosticta betae Oudem. 台湾(358).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Ritz. (猝倒病) 江苏(128).

Beta vulgaris L. (甜菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 台湾(350).

Erwinia carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 河南(13).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

B. vulgaris L. var. rapacea Koch. (君达菜)

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 吉林(294).

Cercospora beticola Sacc. (褐斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 山东(374).

Colletotrichum omnivorum Halst. (炭疽病) 河北(374).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 吉林(294).

Phoma betae Frank. (蛇眼病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294).

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 吉林(294).

Pseudomonas aptata (Brown et Jamieson) Stev. (細菌性斑点病) 吉林(294).

Betula alba L. (白樺)

Gleosporium betulinum Westd. (炭疽病) 河北(317).

B. albo-sinensis Burk. (紅樺, 風樺, 紙皮樺)

Fomes fomentarius (L.) Gill. (白色腐朽) 甘肅(180), “西康”(31, 34), 云南(34).

F. ignarius (L.) Kickx. (白色腐朽) “西康”(31, 34), 云南(34).

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (白色斑駁腐朽) “西康”(31).

B. chinensis Max. (堅樺, 黑樺)

Eyryachora betulina (Fr.) Schroet. “东北”(313).

Septoria chinensis Miura (斑枯病) 辽宁(313).

B. davurica Pall. (棘皮樺)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(282).

B. japonica Sieb. (樺木, 白樺)

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (白色斑駁腐朽) 黑龙江(60).

B. luminifera Winkl. (亮葉樺, 光皮樺, 光葉樺)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 貴州(231).

Betula sp. (樺屬)

Asterosporium hoffmani Fr. 云南(333).

Fomes ignarius (L.) Kickx. (白色腐朽) “西康”(33).

Gleosporium betularum Ell. et Mart. (炭疽病) 河北(317).

Libertella betulina Desm. 新疆(88).

Bischofia trifoliata Hook. (重阳木)

Cercospora bischoffiae Yamam. (叶斑病) 台湾(357, 376).

Pestalozzia bischoffiae Saw. (輪紋病) 台湾(358).

Uncinula bischoffiae Wei (白粉病) 四川(150, 226, 227).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Bixa orellana L. (胭脂树)

Cercospora bixae Allesch. et Noack. (叶斑病) 台湾(358).

Blechnum orientale L. (烏毛蕨)

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Uredo orientalis Racib. (銹病) 台湾(280, 290).

Bletilla formosana Schltr. (台白及)

Coleosporium bletiae Diet. (銹病) 台湾(278, 289).

B. striata (Thunb.) Rehb. f. (白及)

Coleosporium bletiae Hals. (銹病) 貴州(231), 江西(47).

Blumea balsamifera DC. (艾納香)

Aecidium blumeae P. Henn. (銹病) 台湾(277, 290).

Cercospora blumeae-balsamiferae Saw. (叶斑病) 台湾(359).

Boehmeria formosana Hay. (台芋麻)

Pucciniastrum formosanum Saw. (銹病) 台湾(360).

B. frutescens Thunb. var. *concolor* Nakai

Cercospora boehmeriae Peck (叶斑病) 台湾(377).

Cercospora boehmeriae Saw. 台湾(358).

B. nivera Gaud. (芋麻)

Cercospora boehmeriae Peck (叶斑病) 山东(51), “西康”(57).

Colletotrichum boehmeriae Saw. (炭疽病) “西康”(57), 台湾(350).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (根腐病) 台湾(350).

Phytophthora boehmeriae Saw. (疫病) 台湾(287, 292, 353).

Boehmeria nivera Gaud. (芋麻)

P. cactorum (Lebert et Cohn.) Schroët. (疫病) 台湾(287).

Pythium artotrogus (Mont.) de Bary (猝倒病) 台湾(287, 353).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

B. platanifolia Fr. et Saw. (野麻)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

B. zollingeriana Wedd.

Pucciniastrum boehmeriae Syd. (锈病) 台湾(360).

B. sp. (芋麻属)

Puccinia fusispora Syd. (锈病) 貴州(246).

Bombax malabaricum DC. (斑芝树, 攀枝花)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (根腐病) 台湾(350).

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng (白羊草, 鴨嘴孔穎草)

Puccinia cesatii Schroet. (锈病) 云南(247), 江苏(32, 36, 247, 364).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

B. pertusa (L.) A. Camus (孔穎草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).

Puccinia duthiae Ell. et Tracy (锈病) 四川(150).

Ustilago bothriochloae Ling (黑粉病) 四川(149, 153).

Brachybotrys paridiformis Max.

Puccinia brachybotrydis Komar. (锈病) “东北”(272).

Thekopsora brachybotrydis Tranzsch. (锈病) “东北”(313, 375).

Brachypodium formosanum Hay. (台短柄草)

Puccinia baryi (Berk. et Br.) Wint. (锈病) 台湾(280, 290).

P. coronata Corda (锈病) 台湾(290).

P. graminis Pers. (锈病) 台湾(290).

B. japonicum Miq. (日本短柄草)

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 河北(172).

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. (短柄草)

Puccinia baryi (Berk. et Br.) Wint. (锈病) 云南(214), 台湾(280).

P. coronata Corda (冠锈病) 云南(214).

B. sp. (短柄草属)

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36).

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (叶锈病) 河北(317).

Brandisia sp. (来江藤属)

Asterina brandisiae Hansf. (煤病) 广西(254).

Meliola brandisiae Hansf. (煤病) 广西(254).

Brassaiopsis papayoides H.-M.

Colletotrichum trevesiae (Keissl.) Patr. (炭疽病) 云南(306).

Brassica albo-glabra Bail. (芥兰菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 云南(112, 212).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 云南(112), 广东(112).

A. brassicae (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 湖南(112).

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 广东(112), 广西(112).

B. albo-glabra Bail. (芥兰菜)

Personospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 广东(112).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) 广东(112).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 广东(100).

B. campestris L. (油菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze. (白锈病) 吉林(313), 河北(294), “西康”(193), 四川(75, 150, 193, 194), 贵州(174, 196), 江苏(106, 128, 201), 浙江(8, 54), 广西(178), 福建(10, 183).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 江苏(128), 浙江(54), 福建(10).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 福建(10).

Colletotrichum higginsanum Sacc. (炭疽病) 台湾(355).

Brassica campestris L. (油菜)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150, 226), 貴州(174).

Fusarium congenitans Woll. (枯萎病) 广东(141).

Mycosphaerella tulasnei Jacz. (叶斑病) 河北(315).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 四川(150).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “热河”(317), 河北(315), 青海(220), 四川(150, 194, 220), 貴州(174), 安徽(220), 江苏(106, 128), 浙江(8, 49, 54), 福建(10), 广西(178).

Phoma lingam (Tode) Desm. —(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(73, 150), 貴州(174), 江苏(128), 浙江(8, 49, 50, 54), 江西(158), 广东(141), 广西(37, 178), 台湾(350).

Bacillus brassicae Hara 福建(10).

花叶病 (Mosaic) 四川(154), 江苏(154), 浙江(154), 福建(10).

B. campestris L. var. napo-brassica DC. (大头菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze. (白锈病) 云南(212), 福建(10).

Alternaria exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 云南(212).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 云南(212), 福建(10).

B. campestris L. var. oleifera Diels. (油菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 河南(13).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 河南(13).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 河南(13).

B. campestris L. var. purpuraria Bail. (紫菜苔)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(150).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(150).

Colletotrichum higginsianum Sacc. (炭疽病) 四川(150).

Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau 四川(150).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

Brassica campestris L. var. (中国油菜)

花叶病 (Mosaic) 江苏(127), 浙江(127).

B. cernua Thunb. (大油菜, 芥菜, 芥)*Albugo candida* (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(150), 浙江(8), 福建(10).*A. macrospora* (Togashi) Ito (白锈病) 黑龙江(60), “东北”(287), 台湾(287).*Peronospora parasitica* (Pers.) Fr (霜霉病) “东北”(287), 河北(173), 四川(150), 浙江(8), 福建(10), 台湾(287).*Plasmodiophora brassicae* Woron. (根肿病) 江西(159).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 浙江(8), 江西(158).*Erwinia aroideae* (Townsend) Holl. (细菌性软腐病) 福建(10).

花叶病 (Mosaic) 福建(10).

B. cernua Thunb. var. (雪里红)*Plasmodiophora brassicae* Woron. (根肿病) 江西(159).**B. chinensis** L. (小油菜, 黑白菜, 白菜, 菘, 小白菜)*Albugo candida* (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(150), 云南(111, 112), 贵州(196), 湖北(47), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128, 201).*A. macrospora* (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).*Alternaria brassicae* (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(75, 150), 贵州(196), 河南(13), 江苏(128).*A. brassicae* (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 云南(112), 福建(10, 121).*A. exitiosa* (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 云南(112), 湖南(112), 广东(112).*Cercospora albo-maculans* (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 黑龙江(313), 吉林(313), 辽宁(313), 西康(57), 云南(111, 112), 湖南(112), 广东(112).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. (根腐病) 江苏(128).*Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. 四川(91).*Mycosphaerella brassicicola* (Duby) Lindau 四川(150).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Roger (根腐病) 江苏(128).

Brassica chinensis L. (小油菜, 黑白菜, 白菜, 菘, 小白菜)

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “东北”(287), 四川(150), 貴州(196), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128), 福建(10), 广东(112), 台湾(287).

Plasmodiophora brassicae Woron. (根肿病) 江西(159).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 江苏(128), 江西(158).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 湖南(112), 江苏(128), 福建(10), “各地”(138).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 福建(10).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) 湖南(112), 广东(112).

Brassica virus 1 (“孤丁”病) “各地”(185a).

Brassica virus 2 (花叶病) 广东(120a).

Brassica virus 4 四川(75).

Cucumis virus 1 (花叶病) 广东(120a).

B. chinensis L. var. *amplexicaulis* Mak.

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

B. chinensis L. var. *komatsuna* Mats. et Nakai

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

B. chinensis L. var. *oleifera* Mak. (芸苔)

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 福建(121), 台湾(287, 292).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 福建(121).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

Bacillus brassicae Hara (細菌性斑点病) 福建(121).

B. chinensis L. var. *utilis* Twen et Lee (油菜)

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 四川(91).

B. chinensis L. var.

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 貴州(174).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 貴州(174).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 貴州(174).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 貴州(174).

Brassica japonica Sieb.

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

B. juncea L. (芥菜, 大芥)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 山西(319), 四川(75, 150), 云南(111, 112, 212), 贵州(196), 湖南(112), 浙江(231), 福建(113, 183).

A. macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(150), 云南(111, 112), 湖南(112), 广西(112).

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 云南(212).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 四川(150).

Colletotrichum higginsianum Sacc. (炭疽病) 四川(150).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(212), 台湾(350).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 四川(75, 150), 广西(112).

Plasmodiophora brassicae Woron. (根肿病) 台湾(356).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 台湾(350).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (软腐病) 湖南(112), (138).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) 湖南(112), 广东(112).

Brassica virus 2 (花叶病) 广东(120a).

Cucumis virus 1 (花叶病) 广东(120a).

花叶病 (Mosaic) 福建(121).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根线虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 山东(95), 广东(100).

B. juncea L. var **thumida** Tsen et Lee (榨菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(75).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(91).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 四川(57).

Brassica juncea L. var. **thumida** Tsen et Lee (榨菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(91).

B. napiformis Bail. (大头菜, 大豆菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(150).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(150).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 四川(150).

B. napus L. (油菜, 蕃油菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 云南(111, 112), 贵州(196), 湖南(112), “各地”(47).

Alternaria exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 云南(111, 112), 湖南(112).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(112).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 云南(111, 112), 湖南(112), 江苏(220), 浙江(220).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) 云南(111, 112).

B. oleracea L. (捲心菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 四川(150, 194), 江苏(128), 广西(178).

A. macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294), 河北(374), 四川(150, 194), 河南(13), 江苏(128), “华东”(341), “华南”(342).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Cercospora albomaculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 江苏(128).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (根腐病) 江苏(128).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 吉林(294), 河南(13), 江苏(128).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 陕西(16), 四川(33, 150, 194), 江苏(128), 广西(37).

Phoma lingam (Tode) Desm. (黑胫病) 辽宁(294), 四川(150), 河南(13).

Phyllosticta brassicae (Curr.) Westd. (叶斑病) 河南(13).

Brassica oleracea L. (捲心菜)

Pythium deBaryanum Hesse (猝倒病) 吉林(294).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(75, 150, 194), 江苏(128), 江西(158), 台湾(347, 350).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 江苏(128), “华东”(341), 福建(113), “各地”(138).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 陝西(16), 四川(194), 河南(13).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) 西康(57).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 辽宁(294), 陝西(16), 四川(75, 194), 江苏(138).

B. oleracea L. var. acephala DC. (羽叶甘蓝, 芥兰)

Olpidium brassicae Woron. 福建(10).

B. oleracea L. var. botrytis L. (花椰菜, 球花甘蓝)

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 湖南(112).

Olpidium brassicae Woron. 福建(10).

Phoma lingam (Tode) Desm. (黑胫病) 云南(212).

B. oleracea L. var. capitata L. (蓮花白, 捲心菜, 抱心白菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 河北(116).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 河北(321), 山西(321), 四川(91), 云南(111, 112, 212), 广西(178).

A. brassicae (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 云南(111, 112), 湖南(112).

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 河北(116), 广东(112), 广西(112).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 云南(111, 112).

Olpidium brassicae Woron. 福建(10).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 河北(321), 广西(178).

Phyllosticta napi Sacc. (*Mycosphaerella brassicola* (Duby) Lindau) 河北(321).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 湖南(112), 福建(10, 121), 广西(178).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 河北(116, 321), 福建(10).

- Brassica oleracea** L. var. **capitata** L. (蓮花白,捲心菜,抱心白菜)
Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 河北 (321).
- Brassica virus* 1 (“孤丁”病) “各地”(185a).
- B. oleracea** L. var. **cauliflora**
Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣 (350).
- B. oleracea** L. var. **gemmifera** DC. (抱子甘藍,球芽甘藍)
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 湖南(112).
- B. oleracea** L. var. **gongylodes** L. (茼藍,球莖甘藍)
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) “熱河”(294).
Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 陝西(16).
Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (軟腐病) 河北(116).
E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 陝西(16).
Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑點病) “熱河”(294), 陝西(16).
Cucumis virus 1 (花葉病) 陝西(16).
- B. pekinensis** Rupr. (白菜,大白菜)
Albugo candida (Pers.) Kuntze (白銹病) 黑龍江(294), “熱河”(294), 山西(319), 雲南(212), 河南(13), 江蘇(128).
A. macrospora (Togashi) Ito (白銹病) “東北”(287, 292), 台灣(287, 292).
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 四川(91), 雲南(212), 河南(13), 江蘇(128), “華南”(342).
A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 黑龍江(294), 吉林(294), 遼寧(294), 內蒙(372, 373), 熱河(294), 山西(319).
A. raphani Groves et Skolko (黑斑病) 四川(91).
Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 黑龍江(294), 吉林(294), 遼寧(294), 內蒙(321, 373), 熱河(294), 河北(321), 雲南(212), 河南(13), 江蘇(128).
Colletotrichum higginsianum Sacc. (炭疽病) 遼寧(294), 河南(13).
Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (根腐病) 江蘇(128).
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江蘇(128).

Brassica pekinensis Rupr. (白菜, 大白菜)

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 黑龙江(43a, 60, 294), 吉林(43a, 294), 辽宁(43a, 294), “东北”(287), “热河”(294), 河北(173), 山西(319), 四川(91), 河南(13), 江苏(128, 220), 福建(113), 广西(178), 台湾(287).

Plasmodiophora brassicae Woron. (根肿病) 江西(159).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128), 广西(178).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (軟腐病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 江苏(128, 161), 福建(113), “各地”(138).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 河南(13), 江苏(161).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294).

Brassica virus 1 (“孤丁”病) “各地”(185a).

Brassica virus 2 (花叶病) 广东(120a).

Cucumis virus 1 (花叶病) 广东(120a).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

B. pekinensis Rupr. var. *dentata* Max. (山东菜)

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

B. rapa L. (蕪菁, 大头菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 河北(166, 197), 新疆(88), 貴州(196), 河南(13), 福建(113).

A. macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “东北”(287), 河南(13), 福建(113), 台湾(287).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (軟腐病) 河北(321), “各地”(138).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) “西康”(57).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 河北(321), 江苏(138).

Brassica virus 1 (花叶病) 广东(120).

Brassica sp. (芥属)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 陕西(16), 四川(221), 江苏(106, 193).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) “热河”(345), 江苏(106), 浙江(8).

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 新疆(372), “热河”(345), “西康”(57).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病) 内蒙(321, 372), “热河”(345), 河北(321), 山东(51), 江苏(47).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(226).

Macrosporium brassicae Berk. et Sacc. var. *macrospora* Cfr. (黑斑病) 四川(221).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江苏(32).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “热河”(345), 陕西(16), 新疆(88), “西康”(57), 四川(221), 山东(51), 浙江(8), 福建(183) 广西(178).

Phyllosticta brassicae (Curr.) Westd. 河北(317).

Plasmodiophora brassicae Woron. (根肿病) 台湾(287).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) “西康”(57), 浙江(8).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (软腐病) 内蒙(372), “热河”(345), “西康”(57).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (黑点病) “热河”(345).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 陕西(16), 江苏(138).

X. zingiberi (Uyeda) Berg. 浙江(49).

Brassica virus 2 (花叶病) 广东(120a).

Cucumis virus 1 (花叶病) 广东(120a).

(Mosaic) 安徽(127), 江苏(127), 浙江(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根结线虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 山东(95).

Bromus aspera Thunb.

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 云南(214).

B. catharticus (扁穗雀麦)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito (立枯病) 江苏(68).

Bromus inermis Leyss. (光雀麦, 无芒雀麦)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito (立枯病) 江苏(68).*Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病)
新疆(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88).**B. japonicus** Thunb. (雀麦)*Erysiphe graminis* DC. (白粉病) 江苏(219).*Colletotrichum graminicolum* (Ces.) Wils. (炭疽病) 河北
(261).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito (立枯病) 江苏(68).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**B. remotiflorus** (Steud.) Ohwi (疏花雀麦, 狐茅)*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito (立枯病) 江苏(68).**B. unioides** H. B. K.*Ustilago bullata* Berk. (黑粉病) 吉林(153, 313).**B. sp.** (雀麦属)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*Epichloe typhina* (Pers.) Tul. (香柱病) 吉林(294).*Phyllachora bromi* Zohl. (黑痣病) 江苏(47).*Puccinia coronata* Corda (冠锈病) 广西(246).*P. glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 新疆
(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88).*P. rubigo-vera* (DC.) Wint. (叶锈病) 江苏(231).**Broussonetia kaempferi** Sieb. (葡蟠, 构)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219),
广西(219), 台湾(283, 356).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**B. kazinoki** Sieb. (日本楮树)*Aecidium mori* Barcl. (锈病) “热河”(317).**B. papyrifera** L.-Herit (楮, 构树)*Cylindrosporium mori* (Lev.) Berl. 江苏(47).*Nothopatella chinensis* Miyake 河北(315).*Ovulariopsis broussonetiae-papyriferae* Saw. (白粉病) 台
湾(356).*Phakopsora fici-erectae* Ito et Otani (锈病) 江苏(47),
——(231).

Broussonetia papyrifera L.-Herit (楮, 构树)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) “西康”(57),
四川(150, 226), 河南(13), 安徽(219), 江西(219).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 台湾(350).

Uredo broussonetiae Saw. (锈病) 台湾(359).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

B. sp. (构属)

Cercospora broussonetiae Chupp et Linder (叶斑病) 广西(240).

Myxosporella miniata Sacc. 江苏(29, 32).

Phomopsis broussonetiae (Sacc.) Diet 江苏(32).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 湖南(213).

Bryophyllum calycinum Salisb. (落地生根)

Helminthosporium bryophylli Saw. 台湾(350).

Buddleia asiatica Lour. (驳骨丹)

Septoria merrillii Syd. (斑枯病) 台湾(360).

B. officinalis Max. (羊春花, 密蒙花)

Cercospora budleiae Yaman. (叶斑病) 台湾(357, 378).

B. sp. (醉鱼草属)

Irenina buddleiae Hansf. (煤病) 广西(254).

Bulbophyllum sp. (石豆兰属)

Colletotrichum orchidearum Allesch. (炭疽病) 贵州(306).

Bupleurum falcatum L. (柴胡, 北柴胡)

Puccinia bupleuri Rud. (锈病) 河北(218).

P. miyoshiana Diet. (锈病) 河北(66), 陕西(7).

Septoria amphigena Miyake 河北(315), 河南(13).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

B. falcatum L. var. *scorzonerifolium* (Willd.) Regel

Puccinia bupleuri Rud. (锈病) 黑龙江(313), “东北”(290),
云南(369), 台湾(290).

B. longeradiatum Turcz. (长梗柴胡)

Puccinia bupleuri Rud. (锈病) “东北”(272, 290).

Caesalpinia nuga Ait.

Cladosporium caesalpiniae Saw. (黑霉病) 台湾(358).

C. sepiaria Roxb. (云实)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(213).

Cajanus cajan (L.) Millsp. (木豆, 木本黄豆)*Cercospora instabilis* Rangel (叶斑病) 广西(215).*Colletotrichum cajani* Rangel (炭疽病) 云南(306).*Uromyces dolicholi* Arthur (锈病) 广东(32,36), 台湾(271, 280,290).**Calamagrostis arundinacea** DC.*Puccinia coronata* Corda (冠锈病) 安徽(246).*P. pygmaea* Erikss. (锈病) 贵州(246).*P. rangiferina* Ito (锈病) 安徽(246).**C. arundinacea** DC. var. *sciuroides* Hack.*Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum., Shaw et Narss. (霜霉病) 台湾(287).**C. epigejos** (L.) Roth. (拂子茅)*Puccinia epigejos* Ito (锈病) 黑龙江(272), 吉林(313), “东北”(290).*P. pygmaea* Erikss. (锈病) 黑龙江(273), 辽宁(313), “东北”(290).**C. langsdorffii** Trin.*Puccinia rangiferina* Ito (锈病) 辽宁(313).**C. sp.** (拂子茅属)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*C. microcephala* (Wallr.) Tul. (麦角病) 黑龙江(313).*Puccinia coronata* Corda (冠锈病) 陕西(7), 四川(150, 214), 安徽(32,36,246), 江苏(32,36), 浙江(32,36), 广西(246).*P. glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 新疆(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88).*P. hierochloae* Ito (锈病) 辽宁(313).*P. rangiferina* Ito (锈病) 安徽(246).**Calamus margaritae** Hance (省藤, 黄藤)*Montagnellina calami* Saw. 台湾(360).*Pestalozzia calami* Saw. (輪斑病) 台湾(360).**C. sp.** (省藤属)*Ceuthocarpum calamicolum* Teng et Ou 广东(32,189).**Calendula arvensis** L. (金盞花)*Cercospora calendulae* Sacc. 河北(374), 安徽(374).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(209).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 台湾(350).

Callicarpa cana L. (白毛紫珠)

Uromyces callicarpae Fujikuro (锈病) 广东(32,36).

C. formosana Rolfe (杜虹花)

Cercospora callicarpae Cke. (叶斑病) 台湾(358).

Irene formosensis Yamam. (煤病) 台湾(382).

Meliola callicarpicola Yamam. (煤病) 台湾(385).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Uromyces callicarpae Fujikuro (锈病) 台湾(285,290,350,359).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

C. giraldiana Hesse (老鸦糊)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

C. japonia Thunb. (紫珠)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

C. longiloba Merr. (长叶紫珠)

Uromyces callicarpae Fujikuro (锈病) 台湾(290).

C. loureiri Hook et Arn. (劳来氏紫珠)

Meliola callicarpicola Yamam. (煤病) 台湾(385).

C. sp. (紫珠属)

Kuehneola callicarpae Syd. (锈病) 广东(274), 广西(245).

Meliola callicarpicola Yamam. (煤病) 台湾(387).

Uromyces callicarpae Fujikuro (锈病) 广东(274).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Callistephus chinensis Nees (翠菊)

Aecidium callistephi Miyake (锈病) 河北(315), “西康”(57).

Coleosporium asterum (Diet.) Syd. (锈病) 云南(212).

Fusarium conglutinans Wallr. var. *callistephi* Beach. (枯萎病) “东北”(294), ——(135).

F. javanicum Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.) ——(135).

F. javanicum Koord. var. *radicicola* Wr. ——(135).

F. lateritium Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) ——(135).

F. oxysporum Schlecht. f. 6 Wr. ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. ——(135).

Septoria callistephi Gloyer (斑枯病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(374), 四川(150).

Calycanthus praecox L. (蜡梅)

Macrosporium calycanthi Cav. (黑斑病) 江苏(29,32).

Camellia japonica L. (山茶, 茶花)

Leptothyrium camelliae P. Henn. 四川(150).

Pestalozzia guepini Desm. (輪斑病) 四川(150).

Phyllosticta theae Spesch. 四川(150).

C. oleifera Abel (油茶)

Exobasidium gracile (Shirai) Syd. (餅病) 貴州(174,177), 台湾(357).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. sampsoni Hance (油茶寄生) 广西(160).

L. yadoridi Sieb. (樟寄生) 广西(160).

C. sasanqua Thunb. (茶梅)

Gloeosporium theae-sinensis Miyake (炭疽病) 湖南(316).

Pestalozzia puttemansii P. Henn. (輪斑病) 江苏(284).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

C. shinkoensis (Hay.) Mak.

Meliola camellicola Yamam. (煤病) 台湾(383).

C. sp. (山茶屬)

Elytranthe fordii (Hance) Merr. (楓寄生) 广西(160).

Cammelina nudiflora L.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Campanula medium L. (风鈴草)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

Campanumoea javanica Blume (金錢豹)

Cercospora campanumoeae Saw. (叶斑病) 台湾(359).

Camptandra yunnanensis Gagn. (弯蕊花)

Puccinia roscoaeae Barcl. (锈病) 云南(214).

Campylotropis balfouriana (Diels) Schindl.

Uromyces rugulosus Pat. (锈病) 云南(214).

C. hirtella (Franch.) Schindl. (毛菰子梢)

Uromyces urgulosus Pat. (锈病) 云南(214).

Campylotropis macrocarpa (Bge.) Rehd. (菰子梢)

Uromyces lespedezae-macrocarpae Liou et Wang (锈病)
河北(63), 陕西(7).

C. polyantha (Franch.) Schindl. (多花菰子梢)

Aecidium campylotropidis Tai (锈病) 云南(214).

Phyllachora lespedezae (Schw.) Sacc. (黑痣病) “西康”
(340).

Uncinulopsis polychaeta (Berk. et Curt.) Wei (锈病) 云南(213)

Uromyces rugulosus Pat. (锈病) 云南(214).

C. sargentiana

Phyllachora lespedezae (Schw.) Sacc. (黑痣病) “西康”
(340).

Canarium album Raeusch. (橄榄)

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (炭疽病)
四川(150).

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (细菌性根癌病) 广东(141).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

Canavalia ensiformis DC. (刀豆, 直立刀豆, 洋刀豆)

Cercospora canavaliae H. et P. Syd. (叶斑病) 台湾(358).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito (立枯病) 台湾(350).

C. gladiata DC. (刀豆)

Phyllosticta phaseolina Sacc. 云南(112).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 广东(100).

C. sp. (刀豆属)

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.)
Lath.) 云南(111).

Pseudomonas sp. 云南(111).

Canna indica L. (美人蕉)

Macrosporium bulbotrichum Cke. (黑斑病) 四川(150).

Cannabis sativa L. (大麻)

Cercospora cannabina Wakef. (叶斑病) 吉林(294), 辽宁
(294), 内蒙(372, 373), 热河(294, 345), 贵州(340), 山东
(374).

Cannabis cannabinis Hara et Fukui (叶斑病) 山西(319),
“西康”(57), 江苏(29, 32)

Cannabis sativa L. (大麻)

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖腐病) 江苏 (19).

Mycosphaerella cannabis Johans. 吉林(294).

Phyllosticta cannabis (Kirchn.) Speg. (叶斑病) 辽宁(294).

Pseudoperonospora cannabina (Oth.) Curzi. (霜霉病) 辽宁(43a), 内蒙(168).

Septoria cannabis (Lasch.) Sacc. (斑枯病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 317, 345), 贵州(174), 山东(374).

Capillepedium glaucopsis (Steud.) Stapf. (硬秆子草)

Puccinia pusilla Syd. (锈病) 广东(247).

C. parviflorum Stapf. (细柄草, 吊丝草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).

Puccinia pusilla Syd. (锈病) 四川(150), 浙江(247), 广东(247).

Sphacelotheca capillipedii Ling (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 福建(153).

S. taiana (Syd.) Ling (黑粉病) 江苏(149).

红叶病(病毒病害) 河北(139a).

Capparis spinosa L. (槌果藤)

Peronospora capparidis Saw. (霜霉病) 台湾(358).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (薺菜, 薺)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 吉林(313), 四川(150), 河南(13), 山东(374), 浙江(8), 广西(178), 台湾(356).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 黑龙江(43a), 辽宁(43a), 四川(75, 150, 220), 江苏(106, 220), 广东(233), 广西(178).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. (菌核病) 四川(150), 台湾(350).

C. bursa-pastoris (L.) Medik. var. auriculata Mak. (耳叶薺菜)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 河北(173), 台湾(287).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. var. *pinnata* Mak. (羽叶薺菜)
Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 台湾(287).

Capsicum annuum L. (辣椒, 番椒)

Alternaria dauci (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (黑斑病) “热河”(345), 四川(91), 河南(13).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Cercospora capsici Heald et Wolf (叶斑病) 云南(212, 215), 河南(13).

Choanephora manshurica (Saito et Nag.) Tai (花腐病)
四川(150).

Colletotrichum nigrum Ell. et Halst. (炭疽病) 辽宁(294), 河北(321), “西康”(57), 四川(75, 150, 194), 云南(212), 湖南(112), 河南(13), 江苏(29, 32, 106), 福建(121), 广东(29, 32, 199, 201, 370), 广西(30, 32, 37), “华南”(342).

Fusarium annuum Leonian — (135).

F. flavum (Fr.) Wr. — (135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.)
— (135).

F. vasinfectum Atk. var. *zonatum* (Sherb.) f. 2 (Link. et Bail.) Wr. — (135).

Gloeosporium piperatum Ell. et Ev. (炭疽病) “西康”(57), 四川(75), 湖南(112), 河南(13), 广东(199, 201), 广西(112).

Glomerella piperata (Stonem.) Schr. et Spauld. (炭疽病)
“西康”(75), 广东(141).

Leveillula taurica (Lev.) Arn. (白粉病) 四川(150), 云南(111, 112, 212), 台湾(350).

Macrosporium commune Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) (黑斑病) “热河”(342), 山东(14).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Oidiopsis capsici Saw. (白粉病) 台湾(356).

Phoma destructiva Plowr. 辽宁(294), 四川(75, 150).

Phomopsis vexans (Sacc. et Syd.) Harter (*Diaporthe vexans* Gratz.) (褐纹病) “热河”(345).

Phyllosticta capsici (Magn.) Sacc. 云南(112).

Capsicum annuum L. (辣椒, 番椒)*P. physaleos* Sacc. 河南(13).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Septoria lycopersici* Speg. (斑枯病) “热河”(345).*Erwinia aroideae* (Townsend.) Holl. (軟腐病) 辽宁(294), “热河”(294), 陕西(16), “西康”(57), 云南(112), 湖南(112), 广西(112), “各地”(138).*Pseudomonas* sp. 云南(111).*Xanthomonas solanacearum* (Smith) Dowson (青枯病) 湖北(138), 江苏(138), 浙江(138), 江西(138).*X. vesicatoria* (Doidge) Dowson 黑龙江(294), 吉林(138, 294), 辽宁(138, 294), 山西(319), “西康”(57), 云南(112, 212), 湖南(112). 花叶病 (Mosaic). 辽宁(294), 河北(321), 山西(319), 陕西(16), 河南(13), “各地”(127).

丛枝病 (Witches' broom) 河南(13).

C. annuum L. var. **grossum** Bail. (獅头番椒)*Colletotrichum nigrum* Ell. et Halst. (炭疽病) 河北(116).*Pseudomonas* sp. 河北(116).**C. annuum** L. var. **longum** Sendt. (长形辣椒, 下垂辣椒)*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Xanthomonas vesicatoria* (Doidge) Dowson 内蒙(372).**C. annuum** L. var.*Glomerella piperata* (Stonem.) Schr. et Spauld. (炭疽病) 广东(141).

捲叶病 (Leaf'curl) 广东(141).

C. frutescens L. (辣椒, 番椒)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 江苏(128).*Colletotrichum nigrum* Ell. et Halst. (炭疽病) 河北(321), 江苏(128), 福建(10).*Phoma destructiva* Plowr. 江苏(128).*Phytophthora capsici* Leon. (疫病) 江苏(128).*P. parasitica* Dastur. (疫病) 福建(10).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128).*Erwinia aroidea* (Townsend.) Holl. (軟腐病) 江苏(128).

Capsicum frutescens L. (番椒, 辣椒)

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) 江苏(128).

花叶病 (Mosaic) 河北(321), 江苏(128).

丛枝病 (Witches' broom) 福建(10).

C. sp. (番椒属)

Colletotrichum nigrum Ell. et Halst. (炭疽病) “西康”(57).

Caragana frutex Koch. (金雀花, 极东锦鸡儿)

Uromyces laburni (DC.) Oth. (锈病) “东北”(371).

C. frutex Koch. var. latifolia

Melasmia caraganae Jacz. 河北(340).

C. microphylla Lamb. (锦鸡儿, 小叶金雀花)

Microsphaera pseudolonicerae (Salm.) Blumer (白粉病) 四川(150, 226).

Uromyces laburni (DC.) Oth. (锈病) “东北”(371), 河北(63).

C. rosea Turcz. (金雀儿, 红花锦鸡儿)

Uromyces laburni (DC.) Oth. (锈病) “东北”(275), 河北(63).

C. sinica (Buchoz.) Rehd. (锦鸡儿)

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lev. (白粉病) 河北(209, 213).

Uromyces laburni (DC.) Oth. (锈病) “东北”(272, 371), 河北(63, 316), 台湾(290).

C. sp. (锦鸡儿属)

Physalosperina tranzschelii Woron. 甘肃(35).

Uromyces laburni (DC.) Oth. (锈病) 新疆(67).

Cardamine flexuosa With. (碎米荠)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

C. flexuosa With. subsp. debilis (Don.) O. E. Schulz.

Percnospora dentariae Rabh. (霜霉病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

C. hirsuta L. (碎米荠)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Carduus acanthoides L. (飞廉)*Aecidium cardui* Syd. (锈病) 云南(214), 浙江(231).*Puccinia carduorum* Jacky (锈病) 黑龙江(60), 吉林(313), “东北”(272, 290).**Carex baccans** Nees (山稗子)*Farysia orientalis* Ling (黑粉病) 四川(306), 云南(151, 153).*Puccinia constata* Syd. (锈病) 云南(214).*Uredo caricis-baccantis* Saw. (锈病) 台湾(359).**C. cruciata** Wahl. (十字茎)*Farysia butleri* (Syd.) Syd. (黑粉病) “西康”(153), 四川(153), 贵州(153), 福建(153), 广东(153), 广西(153, 393), 台湾(152, 153, 288).*Puccinia caricis* Relent. (锈病) 四川(214).**C. filicina** Nees (蕨叶苔)*Farysia butleri* (Syd.) Syd. (黑粉病) 台湾(288, 358).*F. merrillii* (P. Henn.) Syd. (黑粉病) 广东(27, 32).*F. subolivacea* (P. Henn.) Cif. (黑粉病) 四川(149, 150).*Puccinia caricis* Relent. (锈病) 四川(150).*P. caricis-filicinae* Barcl. (锈病) 广东(32, 36), 台湾(290, 359).**C. lanceolata** Boot. (大披针苔)*Puccinia aomoriensis* Syd. (锈病) 辽宁(313).*P. caricis* Relent. (锈病) 河北(171).**C. laticeps** Franch. (阔头苔)*Cintractia caricis* (Pers.) Magn. (黑粉病) 江苏(32, 104).**C. nemostachys** Steud. (秋笠管)*Farysia subolivacea* (P. Henn.) Cif. (黑粉病) 四川(149, 150, 153).**C. rhynchophora** Franch. (喙苔)*Farysia subolivacea* (P. Henn.) Cif. (黑粉病) 四川(149, 150).**C. simulans** C. B. Clarke*Farysia subolivacea* (P. Henn.) Cif. (黑粉病) 四川(153).**C. stenophylla** Wahl. (细叶苔)*Puccinia atrofusca* (Dudl. et Thomp.) Holw. (锈病) 河北(63).

Carica papaya Linn. (番木瓜, 万寿果, 番瓜树)*Cercospora papayae* Hansf. (叶斑病) 广东(80).*Colletotrichum papayae* (Henn.) Syd. (炭疽病) 广东(79, 80, 141, 233).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Glomerella cingulata* (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 台湾(351).*Ovulariopsis caricae* Saw. (白粉病) 台湾(356).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(350).*Phyllosticta caricaecola* Saw. (叶斑病) 台湾(358).*P. papayicola* Saw. (叶斑病) 台湾(358).*Rhizopus nigricans* Ehrb. (軟腐病) 广东(80).

花叶病 (Mosaic) 广东(82, 141).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).**Carpesium abrotanoides** L. (天名精)*Coleosporium carpesii* Sacc. (锈病) 云南(214), 江苏(47).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).**C. abrotanoides** L. var. **thunbergianum** Mak. (天名精)*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).**C. acutum** Hay.*Coleosporium carpesii* Sacc. (锈病) 台湾(277).**C. cernuum** L. (烟管头草)*Coleosporium carpesii* Sacc. (锈病) 四川(150), 云南(214), 台湾(271).**C. sp.** (金空耳属)*Coleosporium carpesii* Sacc. (锈病) 四川(150), 云南(214), 河南(13), 安徽(245), 江西(245), 广西(245).**Carpinus kawakamii** Hay.*Melampsoridium carpini* (Fuck.) Diet. (锈病) 台湾(280, 289).**C. turczaninowii** Hance (杜氏鵝耳櫪, 鵝耳櫪)*Taphrina carpini* Rostr. (縮叶病) 山西(340).*Uncinula verniciferae* P. Henn. (白粉病) 河北(209).**C. sp.** (千金榆属)*Melampsoridium carpini* (Fuck.) Diet. (锈病) 貴州(245).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 貴州(231).

Carthamus tinctorius L. (紅花)

Puccinia carthami (Hutz.) Corda (銹病) 甘肅(214), 河南(13).

Carum petroselinum Benth.

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台灣(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣(350).

Caryota ochlandra Hance (假桃榔)

Pestalozzia palmorum Cke. (輪斑病) “華南”(342).

Phyllosticta caryotae Shen (葉斑病) 廣東(103).

Cassia minosoides L. (山扁豆, 含羞草決明)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 台灣(350).

C. siamea Lamk. (鐵刀木)

Gloeosporium siameae Saw. (炭疽病) 台灣(358).

Meliola aethiops Sacc. (煤病) 台灣(380).

Phyllosticta siameae Saw. (葉斑病) 台灣(358).

C. surattensis Burm. f. (粉葉決明)

Uredo cassiae-glaucæ Syd. (銹病) 台灣(290).

Cassiope selaginoides Hook f. et Thoms. (岩鬚)

Coleophoma sinensis Petr. 雲南(306).

Castanea cruenta Sieb. et Zucc. (日本栗)

Endothia parasitica (Murr.) P. J. et Anders. (胴枯病) 遼寧(294).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台灣(387).

Pucciniastrum castaneae Diet. (銹病) 台灣(289).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台灣(387).

C. mollissima Bl. (板栗, 栗)

Botryodiplodia theobromae (Pat.) Griff. et Maubl. 河北

Cronartium quercum Miyabe (銹病) “西康”(32), 四川(32), 江蘇(32, 36), 浙江(8, 32, 36).

Endothia parasitica (Murr.) P. J. et Anders. (胴枯病) 河北(361), 陝西(361), 河南(13), 山東(361), 浙江(8, 361).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖枯病) 江蘇(19).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) “西康”(57), 雲南(213), 貴州(213), 河南(13).

Castanea mollissima Bl. (板栗, 栗)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) “西康”(57), 四川(150, 226), 云南(112, 213), 貴州(213), 安徽(219), 浙江(219, 231), 广东(80, 213).

Phyllosticta maculiformis (Pers.) Sacc. (叶斑病) 广东(112).

Pucciniastrum castaneae Diet. (锈病) 四川(150, 214), 云南(214), 湖南(214), 广东(80).

Steganosporium castaneae Lib. 江苏(29, 32).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(8).

Elytranthe bibracteolata (Hance) le Comte var. *sinensis* le Comte (板栗寄生) 广西(160).

E. fordii (Hance) Merr. (枫寄生) 广西(160).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. yadoriki Sieb. (樟寄生) 福建(10), 广西(160).

Viscum japonicum Thunb. (槲寄生) 福建(10).

C. sp. (栗属)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(111).

Pucciniastrum castaneae Diet. (锈病) 貴州(245), 安徽(245).

Pseudomonas sp. 云南(111).

Castanopsis concolor Rehd. et Wils. (槲櫟)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

C. cuspidata Schottk. (米槲)

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

C. delavayi Franch. (錐櫟)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

C. formosana Hay.

Meliola castanopsina Yamam. (煤病) 台湾(284).

C. kawakami Hay.

Meliola shiiae Yamam. (煤病) 台湾(284).

C. sclerophylla Schottk. (苦槲)

Chaetothyrium sinense Teng 浙江(28, 32).

C. stipitata (Hay.) Kan. et Hatu. (柄果椎)

Meliola castanopsina Yamam. (煤病) 台湾(384).

M. fusispora Yamam. (煤病) 台湾(384).

M. shiiae Yamam. (煤病) 台湾(384).

Castanopsis subacuminata Hay.*Meliola subacuminata* Yamam. (煤病) 台湾(384).**C. taiwaniana** Hay. (台椎)*Meliola taiwaniana* Yamam. (煤病) 台湾(384).**C. tibetana** Hance (大叶锥栗, 钩栗)*Irenina castanopsis* Hansf. (煤病) 贵州(254).*Meliola castanopsidis* Yamam. (= *M. castanopsidis* Hansf.?)
(煤病) 贵州(254).*Pseuderiospora castanopsidis* Keissler 湖南(303).**C. uraiana** (Hay.) Kan. et Hatu.*Meliola castanopsina* Yamam. (煤病) 台湾(384).**C. sp.** (栲属)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) “西康”(213).*Meliola castanopsina* Yamam. (煤病) 台湾(387).*M. shiiae* Yamam. (煤病) 台湾(387).*Typhulochaeta japonica* Ito et Hara (白粉病) 四川(150, 226).**Castilloa elastica** Cerv. (美洲胶树)*Cercospora castilloae* Saw. (叶斑病) 台湾(359).**Catalpa bungei** C.A. May. (楸)*Cercospora catalpae* Wint. (叶斑病) 河南(13).**C. ovata** Don (梓)*Cercospora catalpae* Wint. (叶斑病) 河南(13).*Macrosporium catalpae* Ell. et Mart. (黑斑病) 河南(374).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河南(13).**C. speciosa** Warder (黄金树)*Diplodia catalpae* Speg. 山东(374).**C. sp.** (梓属)*Meloidogyne* sp. (根结线虫病) 四川(194).**Cedrela chinensis** Juss. (香椿)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(116),
贵州(174).*Nyssopsora cedrelae* (Hori) Tranzsch. (锈病) 贵州(231),
山东(64), 安徽(65), 广西(231).*Uncinula delavayi* Pat. var. *cedrelae* Tai (白粉病) 河北
'2(11613).

Cedrela microcarpa DC. (小果香椿)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).

C. sinensis Juss. (香椿)

Nyssopsora cedrelae (Hori) Tranzsch. (锈病) 山东(270), 江西(340).

Phakopsora cheoana Cummins (锈病) 贵州(245).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(172, 209), 云南(213), 贵州(231), 安徽(219), 江苏(219), 广西(208).

Uncinula delavayi Pat. (白粉病) 河北(213).

U. delavayi Pat. var. *cedrelae* Tai (白粉病) 河北(213).

U. delavayi Pat. var. *nodulosa* Tai (白粉病) 河北(209).

Celastrus articulatus Thunb. (蔓性落霜红, 南蛇藤)

Uncinula sengokui Salm. (白粉病) “东北”(313), 福建(213).

Celosia argentea L. (青葙, 鸡冠花)

Cercospora celosiae Syd. (叶斑病) 湖北(364).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(229).

C. cristata L. (鸡冠花)

Cercospora celosiae Syd. (叶斑病) 四川(150), 河南(13), 台湾(357, 378).

Fusarium moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) 河南(13).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150).

Celtis biondii Pamp. (沙楠子树, 紫弹树)

Uncinula clintoni Peck (白粉病) 四川(150, 226).

C. bungeana Bl. (黑弹树, 小叶朴)

Coniothyrium celtidicola Miura 辽宁(313).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(209).

Uncinula clintonii Peck (白粉病) 河南(13).

Uncinulopsis polychaeta (Berk. et Curt.) Wei (白粉病) 河南(13), 江苏(106).

C. sinensis Pers. (朴树)

Cercospora celtidis Saw. (叶斑病) 台湾(358).

C. spgazzinii Sacc. (叶斑病) 广东(29, 32).

Celtis sinensis Pers. (朴树)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Pseudoperonospora celtidis (Waite) Wils. (霜霉病) 台湾
(287).

Uncinula clintonii Peck (白粉病) “西康”(57), 云南(112,
213), 江苏(47, 219), 浙江(219), 福建(208), 广西(208), 台
湾(350).

Uncinulopsis polychaeta (Berk. et Curt.) Wei (白粉病)
四川(150), 云南(213), 贵州(231), 江苏(106, 201, 219), 浙
江(219), 江西(231), 福建(208), 广西(208, 213), 台湾(350).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).

Elytranthe fordii (Hance) Merr. (枫寄生) 广西(160).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

C. sp. (朴属)

Uncinulopsis polychaeta (Berk. et Curt.) Wei (白粉病)
山西(340).

Centaurea cyanus L. (矢车菊)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾
(350).

Centella asiatica (L.) Urb. (积雪草)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 安徽(231).

Mycosphaerella centellae Saw. 台湾(360).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾
(350).

Septoria centellae Wint. (斑枯病) 四川(150), 台湾(355).

Cephalanthus occidentalis L. (风霜树)

Cercospora cephalanthi Ell. et Kell. (叶斑病) 台湾(356).

Oidium cephalanthi Saw. (白粉病) 台湾(356).

Ovulariopsis cephalanthi Saw. (白粉病) 台湾(356).

Cephalonoplos segetum Kitamura

Puccinia obtogens (Link.) Tul. (锈病) “东北”(272), 河北
(374).

C. setosum Kitamura

Puccinia obtogens (Link.) Tul. (锈病) 黑龙江(272), “东北”
(272).

Ceratonia siliqua L. (角豆树)

Cercospora ceratoniae Pat. et Trabut (叶斑病) 台湾(357, 378).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Cercis chinensis Bge. (紫荆)

Cercospora chionea Ell. et Ev. (叶斑病) 安徽(47), 江苏(29, 32, 47).

Phoma cercidicola P. Henn. 河南(374).

Chaenomeles exguscoccine Carr.

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) “东北”(290).

C. japonica Pers. (榧子)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 四川(64).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) 江苏(29, 32).

C. lagenaria (Lois.) Koidz. (木瓜)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 河北(231), 四川(150), 云南(212), 湖北(220), 江苏(220), 浙江(8).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 云南(212).

Chamaenerion angustifolium Scop. (狭叶花柏)

Pucciniastrum epilobii Otth. (锈病) 黑龙江(272).

Chamaerops humilis L.

Cercospora bicalcarata (Ces.) Berl. (白斑病) 广西(30, 32).

Coniothyrium chamaeropsis Sacc. et Syd. 河北(20).

Pseudocampylopus fasciculatus (Cke. et Mass.) Frag. et Cif. 江苏(32), 浙江(32), 江西(32), 广西(32).

Chelidonium majus L. (白屈菜)

Peronospora chelidonii Miyabe (霜霉病) 黑龙江(43a).

Septoria chelidonii Mesm. (斑枯病) 河北(316), 河南(13).

Chenopodium album L. (藜, 灰藜菜)

Cercospora dubia (Riess.) Wint. (叶斑病) 吉林(313), 辽宁(313), 四川(150), 山东(374), 江苏(47, 106).

Peronospora chenopodii Casp. (霜霉病) 黑龙江(43a, 313), 吉林(313), 辽宁(43a), “东北”(287), 河北(173, 315, 374), 四川(150), 安徽(220), 江苏(47, 220), 台湾(287, 350).

Phyllosticta chenopodii Sacc. (叶斑病) 吉林(313), 河南(13).

Chenopodium album L. (藜, 灰藜菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川 (150):

C. ficifolium Sm. (小藜)

Peronospora chenopodii-ficifolii Saw. (霜霉病) 台湾 (287, 350):

Phyllosticta chenopodii Sacc. (叶斑病) 黑龙江(60).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350):

C. glaucum L.

Peronospora chenopodii Casp. (霜霉病) 河北(173).

C. hybridum L.

Macrophoma chenopodii Miura 吉林(313).

Chionanthus retusus Lindl. (六道木, 流苏树)

Aecidium fraxini-bungeanae Diet. (锈病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(32, 36).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 云南(213).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).

Chloranthus inconspicuus Sw. (金粟兰, 朱兰)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Chrysanthemum boreale Mak. (北疆菊)

Septoria manshurica Miura (斑枯病) 辽宁(313).

C. cinerariaefolium Bocc. (白花除虫菊, 除虫菊)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. 四川(150).

F. kuehnii (Fuck.) Sacc. —(135).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 吉林(294), 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).

Septoria chrysanthemella Sacc. (斑枯病) 四川(150).

C. coronarium L. (茼蒿)

Cercospora chrysanthemi Heald et Wolf (叶斑病) 黑龙江 (294), 吉林(294), 辽宁(294), 四川(150, 215), 河南(13), 广西(215), 台湾(351).

Colletotrichum chrysanthemi (Hori) Saw. (炭疽病) 黑龙江 (294), 辽宁(294), 台湾(358).

Peronospora chrysanthemii-coronarii (Saw.) Ito et Tokunaga (霜霉病) 台湾(287, 292).

Chrysanthemum coronarium L. (茼蒿)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).

C. coronarium L. var. **spatiosum** Bail. (茼蒿)

Cercospora chrysanthemi Heald et Wolf (叶斑枯) 湖南 (112), 广东(112).

C. indicum L. (野菊, 菊)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 安徽(219).

Phakopsora artemisiae Hirat. f. (锈病) 江苏(220).

P. compositarum Miyake (锈病) 河北(64), 陕西(7).

Phyllosticta chrysanthemi Ell. et Dearn. (叶斑病) 湖南 (316).

Puccinia chrysanthemi Roze (锈病) 四川(150, 340), 安徽 (65).

P. horiana P. Henn. (锈病) 江苏(220).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川 (150).

Septoria chrysanthemella Sacc. (斑枯病) 河北(315), 四川(150), 安徽(47).

C. indicum L. var. **acutum** Uyeki

Puccinia horiana P. Henn. (锈病) “东北”(290).

C. lavandulifolium Mak. (野菊, 香叶菊)

Puccinia chrysanthemi Roze (锈病) 陕西(7).

C. segetum L. (金银菊)

Cercospora chrysanthemi Heald et Wolf (叶斑病) 台湾 (351).

C. sibiricum Fisch.

Phakopsora compositarum Miyake (锈病) 河北(64).

Puccinia chrysanthemi Roze (锈病) 辽宁(313).

C. sinense Sab. (菊花)

Cercospora chrysanthemi Heald et Wolf (叶斑病) 河南 (112).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Phyllosticta chrysanthemi Ell. et Dearn. (叶斑病) 河南 (13).

Puccinia chrysanthemi Roze (锈病) 台湾(290, 359).

Septoria mandshurica Miura (斑枯病) 河南(13).

Chrysanthemum sinense Sab. var. **hortensis** Mak. (菊花)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Septoria chrysanthemella* Sacc. (斑枯病) 台湾(350).*S. chrysanthemi-indici* Bubak et Kabat. (斑枯病) 台湾(350).**C. zawadzkii** Herbach. var. **latilobum** Kiramura*Puccinia chrysanthemi* Roze (锈病) “东北”(272).**C. sp.** (菊属)*Albugo tragopogonis* (DC.) Gray (白锈病) 江苏(106).*Peronospora leptosperma* de Bary (霜霉病) 江苏(106)*Phakopsora artemisiae* Hirat. f. (锈病) 安徽(245).*Puccinia chrysanthemi* Roze (锈病) 贵州(246), 安徽(246), 江苏(106).*P. horiana* P. Henn. (锈病) 江苏(106), 广东(231).*Septoria chrysanthemella* Sacc. (斑枯病) 四川(221), 江苏(106), 广东(199).*Lycopersicum virus* 3 “西康”(57).**Chrysopogon aciculatus** Trin.*Balansia andropogonis* Syd. (香柱病) 台湾(350, 360).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Sorosporium andropogonis-aciculati* Petch (黑粉病) 台湾(152, 153, 288).**Cicer arietinum** L. (鹰嘴豆, 鸡豆)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).**Cichorium endivia** L. (菊苣)*Erwinia carotovora* (Jones) Holl. (软腐病) 河南(13).**C. intybus** L. (欧洲菊苣)*Pseudomonas cichorii* (Sw.) Stapp. 台湾(330).**Cicuta virosa** L. (芹叶钩吻)*Puccinia cicutae* Lasch. (锈病) 黑龙江(273), “东北”(290), 新疆(67).**Cimicifuga dahurica** Max.*Coleosporium cimicifugatum* Thuem. (锈病) “东北”(273).**C. foetida** L. (升麻)*Coleosporium cimicifugatum* Thuem. (锈病) 河北(317), 云南(214).

Cimicifuga simplex Wormesk. (毛山七)

Coleosporium cimicifugatum Thuem. (锈病) 黑龙江 (60,272).

Puccinia triseti Erikss. (锈病) 吉林(313).

C. simplex Wormesk. var. *ramosa* Max.

Puccinia triseti Erikss. (锈病) “东北”(290).

C. sp. (升麻属)

Coleosporium cimicifugatum Thuem. (锈病) 陕西(7).

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (锈病) 江西(47).

Cinchona ledgeriana Moens. (金鸡纳树)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phytophthora cinchonae Saw. (疫病) 台湾(357).

C. succirubra Pav. (規那,紅皮鸡納树)

Phytophthora cinchonae Saw. (疫病) 台湾(357).

Cinnamomum appelianum H.-M.

Capnodium footii Berk. et Desm. (煤病) 湖南(306).

C. camphora Nees et Ebern. (樟树)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(347,350).

Elaeodema cinnamomi Syd. (餅病) “西康”(57), 广东 (177,201,233,362), 台湾(350).

Glomerella cinnamomi Yosh. (炭疽病) 台湾(350).

Hypochnus cinnamomi Saw. 台湾(347,350).

C. camphora Nees et Ebern.

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(347,350).

Sclerotium cinnamomi Saw. (菌核病) 台湾(350,356).

Septobasidium albidum Pat. (膏药病) 台湾(350).

Elytranthe bibracteolata le Comte var. *sinensis* le Comte (板栗寄生) 广西(160).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 广西(160).

Phoradendron sp. (槲寄生) 广西(178).

C. camphora Nees et Ebern. var. *nominale* Hay.

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 台湾(350).

Elaeodema cinnamomi Syd (餅病) 台湾(350).

C. cassia Blume (桂,肉桂)

Elaeodema cinnamomi Syd. (餅病) 广东(178,362).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

Cinnamomum glanduliferum Meisn. (腺樟)

Elaeodema cinnamomi Syd. f. *brunnea* Keissler (餅病)
湖南(177,304).

C. micranthum Hay. (細花樟)

Elaeodema cinnamomi Syd. (餅病) 台湾(357).

C. pedunculatum Nees (天竺桂)

Elaeodema cinnamomi Syd. (餅病) 广东(177,362).

C. pittosporoides H.-M.

Elaeodema floricola Keissler (餅病) 云南(177,304).

C. sp. (樟属)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) 四川(150).

Elaeodema cinnamomi Syd. (餅病) 广东(32), 广西(30,32).

Phyllosticta cirsii Desm. (叶斑病) 四川(150).

Puccinia cinnamomi Tai (锈病) 四川(214).

P. cinnamomicola Cummins (锈病) 广西(244).

P. obtegens (Link.) Tul. (锈病) 四川(150).

Cirsium arvensis Scop. (布嘉克,薊)

Albugo tragopogonis (Pers.) Fr. (白锈病) 吉林(313),
辽宁(313),河南(13).

Puccinia cirsii Lasch. (锈病)——(231).

P. obtegens (Link.) Tul. (锈病) 黑龙江(313),吉林(313),
辽宁(313),“西康”(57),四川(33),貴州(246),河南(13,
66),江苏(32,36,106).

Septoria cirsii Niessl. (斑枯病) 吉林(313),河南(13).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 辽宁(313),西康(57),安徽(219),江苏(219).

C. arvensis Scop. var. *setosum* Ledeb.

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287),
台湾(287).

Puccinia obtegens (Link.) Tul. (锈病) “东北”(272,290),
陝西(7).

C. chinense Champ.

Puccinia cirsii-maritimi Diet. (锈病) 江西(246).

C. japonicum DC. (小薊)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) 河北(171),
四川(150).

Puccinia cirsii Lasch. (锈病) 台湾(350,359,368).

Cirsium japonicum DC. (小薊)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣 (350).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

C. segetum Bge. (刺儿菜, 刺薊)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白銹病) 河北(116, 166, 197), 四川(150).

Phyllosticta cirsii Desm. 四川(150).

Puccinia cirsii Lasch. (銹病) 河北(171).

P. obtegens (Link.) Tul. (銹病) “东北”(290), 河北(62), 四川(150), 江苏(62).

Septoria cirsii Niessl. (斑枯病) 四川(150), 江苏(103).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 四川 (150).

Citrullus vulgaris Schrad. (西瓜)

Cercospora citrullina Cke. (叶斑病) 河北(258, 261, 374), 台灣(354).

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294), 河北(116, 321, 373), 山西(1, 319, 321), 四川(75), 湖南(112), 河南(13, 374), 江苏(128), 浙江(49), 福建(10, 121), 广东(76), 广西(178), 台灣(354).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 江苏(47), 台灣 (350).

Diplodia natalensis Ev. (*Physalospora rhodina* Berk. et Curt.) 台灣(356).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 江苏(128).

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. (枯萎病) 四川(75).

F. bulbigenum Cke. et Mass. var. *niveum* (Smith) Wr.

(枯萎病) 黑龙江(294), 辽宁(294), 内蒙(321), 四川(75, 150), 河南(13, 374), 江苏(128), 福建(10), 台灣(354), —(135).

Mycosphaerella citrullina (Smith) Gross. 黑龙江(294), 辽宁(294).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) “东北”(287), 台灣(287, 356).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 江苏 (128).

Citrullus vulgaris Schrad. (西瓜)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(374), 河南(374).

花叶病 (Mosaic) 河南(13).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

Citrus aurantifolia Sw. (中国檸檬)

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

脂点病 (Greasy spot) 广西(163).

C. aurantium Linn. (酸橙)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 四川(224, 231).

Sphaceloma fewcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (疮痂病) 云南(119), 广东(12).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 四川(138), 貴州(138), 湖北(138), 湖南(138), 江苏(122), 浙江(138), 江西(138), 福建(113, 138), 广东(138, 141).

C. balotina

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

C. chrysocarpa

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

C. deliciosa Tenore (橘, 紅橘)

Alternaria citri Pierce (黑斑病) 四川(33, 194), 江苏(122).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 四川(194), 江苏(122), 广西(163).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 江苏(122), 浙江(123), 福建(10).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. concolor Reink. ——(135).

F. dimerum Penz. ——(135).

F. larvarum Fuck. ——(135).

F. lateritium Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) ——(135).

Citrus deliciosa Tenore (橘, 紅橘)

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.)
——(135).

F. orthoceras App. et Wr. ——(135).

F. oxysporum Schlecht. var. *aurantiacum* (Link.) Wr.
——(135).

F. sambucinum Fuck. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. ——(135).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

Phoma citriaripa McAlp. (黑点病) 江苏(122).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf)
(褐色蒂腐病) 四川(224).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 福建(10), 广西(163), 华南(342).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病)
四川(33).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

黄龙病 (Decline) 福建(110), 广东(110).

癩皮病 (Psorosis, scaly bark) 广西(37).

丛枝病 (Witches' broom) “华南”(342).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

脂点病 (Greasy spot) 福建(10), 广西(163).

簇生病 (Rosette) 华南(342).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. erythroa (Hort.) Tanaka (大紅袍, 朱紅桔)

Tylenchulus semipenetrans Cobb (綫虫病) 广东(98).

C. erythroa (Hort.) Tanaka var. *chu-sha* (朱砂橘)

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 广西(163).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. grandis Osb. (柚)

Alternaria citri Pierce (黑斑病) 四川(150), 广西(163).

Citrus grandis Osb. (柚)

Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 福建(89), 广西(163).

C. walteri Sacc. (煤病) 台湾(386).

Capnophaeum fuliginodes (Rehm.) Yamam. (煤病) 台湾(386).

Chaetothyrium spinigerum (Hoehn.) Yamam. 台湾(355).

Cladosporium sclerotiophilum Saw. (黑霉病) 台湾(355).

Colletotrichum foliicolum Nishida (炭疽病) 四川(150).

C. gloeosporioides Penz. (苦腐病) “西康”(57), 四川(150), 广西(37, 163, 340).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 广东(141).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 广西(163), 台湾(356).

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) “华南”(342, 343), 台湾(355, 380).

Mycosphaerella horii Hara (褐斑病) 广西(163).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Penicillium digitatum Sacc. (绿霉病) 四川(150), 江苏(122), 福建(109, 121), 广西(163).

P. italicum Wehmer (青霉病) 四川(150), 江苏(122), 江西(109), 福建(109, 121), 广西(163).

P. italicum Wehmer var. *album* Wei (青霉病) 四川(231).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(355, 387).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 四川(224, 231), 福建(10).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf) (褐色蒂腐病) 四川(224), 广西(37, 163).

Phyllosticta citri Hori (叶斑病) 广西(163).

Phytophthora parasitica Dastur. (干腐病) 广西(37).

Septobasidium carbonaceum Pat. (膏药病) 广东(242).

S. citricolum Saw. (膏药病) 台湾(356).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (疮痂病) 福建(109, 121, 231), 广东(343), 广西(37, 163, 231), “华南”(342, 343).

Citrus grandis Osb. (柚)

Trichothecium roseum (Pers.) Link. 台湾(358).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病) 广西(163).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 四川(138), 貴州(138), 湖北(138), 湖南(138), 浙江(138), 江西(109, 138), 福建(121, 138), 广东(81, 138, 141), 广西(138, 163), “华南”(342, 343).

黄龙病 (Decline) 广东(110).

癩皮病 (Psorosis, scaly bark) 广西(37).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160), “华南”(342, 343).

L. sp. (种子植物寄生) 广西(163).

Tylenchulus semipenetrans Cobb (綫虫病) 广东(98).

脂点病 (Greast spot) 江西(109), 福建(10, 109), 广西(163).

流胶病 (Gummosis) 福建(10, 89), 广西(163).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. grandis Osb. var. **shatinyu** Hort. (沙田柚)

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

C. grandis Osb. f. **buntan** (文旦)

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (炭疽病) 台湾(350).

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (疮痂病) 台湾(350).

C. hotokan Hay (虎头柑)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 福建(113).

C. junos Tanaka (香橙)

Cercospora penzigii Sacc. (叶斑病) 湖南(112).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (炭疽病) 湖南(112).

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) 广西(112).

Citrus junos Tanaka (香橙)

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 湖南(112).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson. (潰瘍病) 广西(112).

C. kinokuni Tanaka (乳桔)

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 江西(109).

C. lemon (Burm. f.) Tanaka (檸檬)

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 福建(10).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 四川(138),
貴州(138), 湖北(138), 湖南(138), 浙江(138), 江西(109,
138), 福建(10, 109, 138), 广东(138), 广西(138).

黄龙病 (Decline) 福建(109), 广东(110).

脂点病 (Greasy spot) 江西(109), 福建(109).

油斑病 (Oleocellosis) 福建(10).

C. lemon (Burm. f.) Tanaka var. *eureka* (金山檸檬)

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 广西(163).

Diplodia natalensis Evans. (*Phyalospora rhodina* (Berk.
et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 广西(163).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Penicillium italicum Wehmer (青霉病) 广西(163).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf)
(褐色蒂腐病) 广西(163).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 广西(163).

Sphaceloma fawcetti Jenk. var. *scabiosa* Jenk. (*Elsinoe*
australis Bit. et Jenk.) (疮痂病) 广西(163).

Triposporiopsis spruagera (Hoehn.) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Citrus lemon (Burm. f.) Tanaka var. **eureka** (金山檸檬)

Oospora citri-aurantii (Jenk.) Sacc. et Syd. (酸腐病)
广西(163).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

黄龙病 (Decline) 广西(163).

脂点病 (Greasy spot) 广西(163).

C. limonia Osb. (黎檬)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 广东(141).

Septobasidium albidum Pat. (膏药病) 贵州(231,242),
“华南”(342,343).

S. sinense Couch 广东(242), 广西(242).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 四川(150), 云南(212), 福建(89,113,183),
广东(12,119,141), “华南”(342,343).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 四川(138),
贵州(138), 湖北(138), 湖南(138), 浙江(138), 江西(138),
福建(138,183), 广东(12,138), 广西(163,138), “华南”
(342,343).

Tylenchulus semipenetrans Cobb (綫虫病) 广东(98).

C. limonia Osb. var. (檸檬)

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 广东(141).

C. medica L. (枸橼, 香橼)

Atractium flammeum Berk. et Rav. 广西(163).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 广西
(163).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf)
(褐色蒂腐病) 四川(150,231).

Phytophthora citrophthora (Smith et Smith) Leon.
(干腐病) 台湾(287,350).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 江苏(122),
广东(141), 广西(163).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

- Citrus medica** L. var. *sarcodactylis* Sw. (佛手柑, 佛手)
Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 台湾(350).
- C. medioglobosa** (Hort.) Tanaka (鳴門柑)
Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).
- C. microcarpa** Bge. (金橘)
Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 广西(163).
Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).
P. italicum Wehmer (青霉病) 四川(150), 江苏(122).
Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
 (疮痂病) 福建(89).
Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).
 黄龙病 (Decline) 广东(110).
Tylenchulus semipenetrans Cobb (綫虫病) 广东(98).
- C. natsudaïdai** Hay. (夏橙)
Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 台湾(350).
Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).
- C. nobilis** Lour. (柑)
Alternaria citri Pierce (黑斑病) 四川(150), 江苏(122, 128, 231), 浙江(122).
Anthina citri Saw. 台湾(354).
Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 江苏(128), 广西(163).
Colletotrichum foliicolum Nishida (炭疽病) “西康”(57), 四川(150), 云南(212), 江苏(37).
C. gloeosporioides Penz. (苦腐病) “西康”(57), 四川(150), 江苏(122, 128), 福建(10), 广西(163).
Coniothecium citri McAlp. (叶斑病) 江苏(128).
Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 广东(141).
Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 四川(150), 江苏(122), 浙江(123), 福建(183).
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. —(135)
F. concolor Reink. —(135).
F. dimerum Penz. —(135).
F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).
F. orthoceras App. et Wr. —(135).

Citrus nobilis Lour. (柑)

F. oxysporum Schlecht. var. *aurantiacum* (Link.) Wr.
——(135).

F. sambucinum Fuck. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. ——(135)

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) 广东
(370), “华南”(342, 343).

Mycosphaerella horii Hara (褐斑病) 广西(163).

Multipatina citricola Saw. 台湾(354).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 辽宁(313), 四川
(150), 江苏(122, 128).

Penicillium italicum Wehmer (青霉病) 辽宁(313), 四川
(150), 江苏(122, 128), 广东(141).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 四川(150, 224), 江苏
(122, 128), 福建(231), 广东(81, 141, 231).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf)
(褐色蒂腐病) 福建(10).

Phyllosticta beltranii Penz. (白斑病) 广西(163).

Phytophthora parasitica Dastur. (干腐病) 福建(10, 89).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 四川(150), 云南(212), 浙江(231), 福建(121,
183, 231), 广东(141), 广西(163), 华南(342).

Trichoderma viride Tul. (实腐病) 四川(150), 浙江(122).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病)
四川(150), 江苏(122, 128).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) “西康”(57),
四川(138), 貴州(138), 湖北(138), 湖南(138), 浙江(138),
江西(138), 福建(10, 138), 广东(81, 138, 141), 广西(138,
163), “华南”(342, 343).

黄龙病 (Decline) 广东(141), 广西(163).

癩皮病 (Psorosis, scaly bark) 福建(10).

丛枝病 (Witches' broom) 华南(342, 343).

Tylenchulus semipenetrans Cobb 广东(98).

缺 Ca (Follicellosis, mottle leaf) 福建(10), 广东(141).

Citrus nobilis Lour. (柑)

脂点病 (Greasy spot) 广东(81), 广西(163).

流胶病 (Gummosis) 福建(10, 89).

簇生病 (Rosette) 华南(342).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. oleocarpa (Hort.) Tanaka

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. paradiisi

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾
(387).

C. poonensis Tanaka (有柑, 卢柑, 捶柑)

Alternaria citri Pierce (黑斑病) 江苏(122), 福建(89),
广东(81).

Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 广西(163).

Chaetothyrium spinigerum (Hoehn.) Yamam. 台湾(355).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 江苏
(122), 广西(163).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

C. salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk.
et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 江苏(122).

Gloeosporium rotundimaculatum Saw. (炭疽病) 台湾
(358).

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) 台湾
(380).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(355, 387).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122), 福建
(109).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122), 江西(109), 福建
(109).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病)
台湾(355, 387).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 江苏(122), 福建(10,
89, 109).

Citrus poonensis Tanaka (有柑, 卢柑, 挫柑)

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf)
(褐色蒂腐病) 福建(10, 89, 109).

Septobasidium citricolum Saw. (膏药病) 台湾(356).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 福建(10, 89, 109, 113), 广西(163), 台湾(350).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病)
江苏(122).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广东(12,
81), 广西(163).

黄龙病 (Decline) 福建(109), 广东(110), 广西(163).

癩皮病 (Psorosis, scaly bark) 福建(10, 89).

Loranthus sp. (种子植物寄生) 福建(109).

脂点病 (Greasy spot) 江西(109), 福建(109), 广西(163).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. sabon Sieb. (斗柚)

Anthina brunnea Saw. 台湾(354).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 台湾
(350).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

C. salmonicolor Berk. et Br (赤衣病) 台湾(350).

Multipatina citricola Saw. 台湾(354).

Septobasidium acaciae Saw. (膏药病) 台湾(350).

S. bogoriense Pat. (膏药病) 台湾(350).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 台湾(350).

C. sinensis (L.) Osb. (甜橙, 橙)

Alternaria citri Pierce (黑斑病) 四川(150, 194, 224), 福建
(113).

Anthina citri Saw. 台湾(354).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(150, 224), 福建(10).

Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 广西(163).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) “西康”
(57), 四川(150, 194, 224), 湖南(112), 福建(10), 广西(37,
163).

Citrus sinensis (L.) Osb. (甜橙, 橙)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 广东(141).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 四川(150, 224), 福建(113), 台湾(356).

Fusarium concolor Reink. ——(135).

F. larvarum Fuck. ——(135).

F. lateritium Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) ——(135)

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ——(135)

F. sambucinum Fuck. ——(135)

Gloeosporium foliicolum Nishida (炭疽病) “西康”(57).

G. rotundimaculatum Saw. (炭疽病) 台湾(358).

Helminthosporium citri Saw. 台湾(355).

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) “华南”(342, 343), 台湾(355).

Mycosphaerella horii Hara (褐斑病) 广西(163).

Multipatina citricola Saw. 台湾(354).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 四川(91).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 四川(150, 224), 江苏(122), 福建(109, 113).

P. fructigenum Takeuchi 四川(150, 224).

P. italicum Wehmer (青霉病) 四川(150, 224), 湖南(112), 江苏(122), 江西(109), 福建(109, 113), 广东(141), 广西(163).

P. italicum Wehmer var. *album* Wei (青霉病) 四川(150, 224), 广西(163).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 四川(150, 224, 231), 云南(111), 福建(10, 89, 231), 广东(81, 141).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf) (褐色蒂腐病) 四川(109, 224), 江西(109), 福建(10, 109), 广西(37, 163).

Phyllosticta adusta Ell. et Mart. 广东(231).

Citrus sinensis (L.) Osb. (甜橙, 橙)

Phytophthora citrophthora (Smith et Smith) Leon.
(干腐病) 四川(150,224).

P. parasitica Dastur. (干腐病) 四川(150,224), 福建(10),
广西(37).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川
(150,224).

Septobasidium albidum Pat. (膏药病) “华南”(342).

S. sinense Couch (膏药病) 广东(242).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 福建(10,89), 广东(111,141), 广西(163), “华
南”(342,343).

Trichoderma viride Tul. (实腐病) 四川(150,224).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病) 四
川(224).

Pseudomonas sp. 云南(111).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) “西康”
(57), 四川(138), 貴州(138), 湖北(138), 湖南(112,138),
江苏(122), 浙江(138), 江西(138), 福建(109, 113,138,
183), 广东(81,112,138,141), 广西(37,138,163), “华南”
(342,343).

胶肿病 (Convex gum) 福建(10,107,109).

黄龙病 (Decline) 福建(110), 广东(110,141), 广西(163),
“华南”(342,343).

癩皮病 (Psorosis, scaly bark) 广西(37).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Tylenchulus semipenetrans Cobb (綫虫病) 广东(98).

缺 Ca (Folioscellosis, mottle leaf) 四川(194), 广东(141),
“华南”(342,343).

脂点病 (Greasy spot) 江西(109), 福建(10,109), 广东(81),
广西(163).

缺 Mg 江西(109), 福建(109).

油斑病 (Oleocellosis) 福建(10).

簇生病 (Rosette) 华南(342,343).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

C. sinensis (L.) Osb. var. brassiliensis Tanaka (美橘)

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

Citrus sinensis (L.) Osb. var. **kushanchow** Kan.

 胶肿病 (Convex gum) 福建(109).

C. sinensis (L.) Osb. f. **sekkan** Hay. (雪柑)

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 台湾
(350).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 台湾(350).

Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn.) Schroet. (干
腐病) 台湾(287, 292).

黄龙病 (Decline) 广东(110).

C. suavisissima Tanaka (甌柑)

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

C. suhoiensis Tanaka (四会柑)

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 江苏
(122), 广西(163).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏(122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏(122).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广东(122),
广西(163).

脂点病 (Greasy spot) 广西(163).

C. sunki Sakurai (酸橘)

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoë fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 福建(10, 89), 广西(163), 台湾(350).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广东(12),
广西(163).

脂点病 (Greasy spot) 广西(163).

C. tangerina Tanaka (紅橘)

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 福建(10).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoë fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 四川(109), 福建(10, 89, 109, 113).

癭皮病 (Psorosis, scaly bark) 福建(10, 89, 109).

Loranthus sp. (种子植物寄生) 福建(109).

脂点病 (Greasy spot) 福建(10).

C. tankan Hay. (蕉柑, 桶柑)

Colletotrichum salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾
(350).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk.
et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 江西(122).

Citrus tankan Hay. (蕉柑, 桶柑)

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) 台湾 (380).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾 (386, 387).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 江苏 (122).

P. italicum Wehmer (青霉病) 江苏 (122).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾 (387).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 福建 (10, 89), 台湾 (350).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf) (褐色蒂腐病) 福建 (10, 89).

Phytophthora sp. (干腐病) 广东 (12).

Ramularia citrifolia Saw. 台湾 (356).

Septobasidium citricolum Saw. (膏药病) 台湾 (356).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (疮痂病) 广东 (12), 台湾 (350).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾 (387).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 福建 (109, 113), 广东 (12), 广西 (163).

黄龙病 (Decline) 福建 (109, 110), 广东 (110).

脂点病 (Greasy spot) 江西 (109), 福建 (10, 89, 109), 广西 (163).

C. tankan Hay. f. koshotankan Hort.

Gloeosporium rotundimaculatum Saw. (炭疽病) 台湾 (358).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 台湾 (350).

C. tankan Hay. f.

Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn.) Schroet. (干腐病) 台湾 (287, 292).

C. unshiu Marc. (温州蜜橘)

Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 广西 (163).

Chaetothyrium spinigerum (Hoehn.) Yamam. 台湾 (355).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 广西 (163).

Citrus unshiu Marc. (温州密橘)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Helicobasidium albicans Saw. 台湾(354).

Hendersonia citricarpa Saw. 台湾(355).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(355, 387).

Phyllosticta beltranii Penz. (白斑病) 广西(163).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
(疮痂病) 广西(163), 台湾(350).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

脂点病 (Greasy spot) 广西(163).

紋斑, 主要缺 Zn 广西(163).

C. webberi

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广东(141).

C. sp. (柑橘属)

Alternaria citri Pierce (黑斑病) 浙江(8, 49), 福建(89),
广东(81), 台湾(257).

A. tenuis Nees (黑斑病) 四川(231).

Aschersonia placenta Berk. et Br. 广西(231).

Aspergillus niger van Tiegh. 台湾(257).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(231), 福建(89).

Capnodium citri Berk. et Desm. (煤病) 福建(10, 89).

Colletotrichum gloeosporioides Penz. (苦腐病) 四川(75),
河南(13), 福建(113), 广西(30, 32).

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 貴州
(174).

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* (Berk.
et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) “西康”(57), 浙江(123), 江
西(122, 123), 福建(123), 广东(123), 广西(123), 台湾(356).

Helminthosporium citri Saw. 台湾(355).

Macrosporium commune Rabh. (*Pleospora herbarum*
(Pers.) Rabh.) 四川(221).

Meliola butleri Syd. (= *M. citricola* Syd.) (煤病) “西康”
(57), 台湾(355, 387).

Penicillium digitatum Sacc. (綠霉病) 四川(194, 221,
231), 福建(10, 89), 广东(81, 233), 台湾(351).

P. fructigenum Takeuchi 四川(231).

Citrus sp. (柑橘属)

Penicillium italicum Wehmer (青霉病) 四川(194,221,231), 贵州(174), 浙江(8), 福建(10,89), 广东(81), 台湾(257,351).

Phoma citricarpa McAlp. (黑点病) 四川(75,231), 浙江(8,49), 广东(81).

Phomopsis citri Fawcett (*Diaporthe citri* (Fawcett) Wolf) (褐色蒂腐病) 浙江(49), 福建(89), 广西(30,32).

Phytophthora citrophthora (Smith et Smith) Leon. (干腐病) 四川(231)

P. parasitica Dastur. (干腐病) 四川(231).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(231).

Septobasidium acaciae Saw. (膏药病) 台湾(350).

S. albidum Pat. (膏药病) 广东(81).

S. leucostemum Pat. (膏药病) 广西(242).

Sphaceloma fawcetti Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (疮痂病) 四川(75), 浙江(49), 福建(10), 广东(231), 广西(163,178,231).

Trichoderma viride Tul. (实腐病) 四川(231), 广东(81).

Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd. (酸腐病) 四川(231), 福建(10), 广东(81), 台湾(257).

Xanthomonas citri (Hasse) Dowson (溃疡病) 四川(75), 福建(89), 广东(76,81,199), 广西(163,178).

黄龙病 (Decline) 福建(10,89), 广东(12,81), 广西(163).

癞皮病 (Psorosis, scaly bark) 福建(89).

Cuscuta sp. (菟丝子) 广西(178).

Loranthus yaderiki Sieb. (樟寄生) 福建(10).

L. sp. (种子植物寄生) 广西(37).

黄叶病, 缺 N (Chlorosis) 广西(37).

缺 Ca (Foliocellosis, mottle leaf) 广东(81), 广西(37).

脂点病 (Greasy spot) 广东(81), 广西(163).

缺 Mg 福建(10).

油斑病 (Oleocellosis) 四川(109), 福建(109).

纹斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

Cladrastis platycarpa (Max.) Mak. (翅荚香槐)

Loranthus maclurei Merr. (榔榆寄生) 广西(160).

L. parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Clausena lansium (Lour.) Skeels (黃皮)

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) “华南”
(342, 343).

Cleistogenes serotina (L.) Keng (隱子草)

Puccinia australis Koern. (銹病) 河北(20, 32, 36), 安徽
(231), 江苏(32, 36).

P. diplachnicola Diet. (銹病) 四川(150), 湖南(32), 江苏
(32, 36, 218, 364), 浙江(32, 36).

P. molinae Tul. (銹病) 安徽(218).

Clematis angustifolia Jacq. (狹葉鉄綫蓮)

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 山东(66).

C. apiifolia DC. (女萎)

Coleosporium clematidis-apiifoliae Diet. (銹病) 河北
(317).

C. apiifolia DC. var. **obtusidentata** Rehd. et Wils.

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 浙江(66).

C. armandi Franch. (山木通)

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 云南(306).
Stigmatea armandi Pat. 西藏(332).

C. bartlettii Yamam.

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 台湾(289).

C. benthamiana Hemsl.

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 山东(66).

C. brevipaudata DC. (短尾鉄綫蓮, 威靈仙)

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 云南(214), 山东
(66).

C. chinensis Osb. (鉄脚威靈仙)

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 安徽(65, 66).

C. chinensis Osb. f. **vestita** Rehd. et Wils. (毛鉄脚威靈仙)

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 河南(66).

C. chrysocoma Fr. (金髮鉄綫蓮)

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 云南(214).

C. connata Fin. et Gagn.

Puccinia clematidicola Tai (銹病) 云南(214).

C. fargesii Franch.

Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 陝西(7).

C. floribunda Yamam. (多花鉄綫蓮)

Meliola knowltoniae Doidge (煤病) 台湾(380).

Clematis formosana Kuntze (台鉄綫蓮)*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 台灣(289,350).**C. fusca** Turcz. var. **mandshurica** Regel*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 辽宁(313).**C. fusca** Turcz. var. **yezoensis** Miyabe*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) “东北”(289).**C. gouriana** Roxb. (固氏鉄綫蓮)*Aecidium orbiculare* Barcl. (銹病) 台灣(290).*Cercospora clematidis* Saw. (叶斑病) 台灣(360).*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 台灣(289).*Meliola knowltoniae* Doidge (煤病) 台灣(380).*Puccinia exhausta* Diet. (銹病) 台灣(290,359).**C. grata** Wall.*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 台灣(289,368).*Puccinia exhausta* Diet. (銹病) 台灣(290).**C. grata** Wall. var. **grandidentata** Rehd. et Wils. (大齿鉄綫蓮)*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 貴州(245), 湖南(32), 安徽(32,36), 江苏(32,36), 浙江(32,36), 广西(32).**C. henryi** Oliv. var. **coptophylla** Hay.*Aecidium orbiculare* Barcl. (銹病) 台灣(290).*Puccinia clematidis-hayatae* Saw. (銹病) 台灣(290,359).**C. heraclaefolia** DC. (草本女萎,大叶鉄綫蓮)*Puccinia rubigo-vera* (DC.) Wint. (銹病) 河北(66,166), 山西(340).**C. heraclaefolia** DC. var. **davidiana** Fr. (达氏大叶鉄綫蓮)*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 辽宁(313), “东北”(289).**C. hexapetala** Pall. (六瓣鉄綫蓮)*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) “东北”(273).**C. mandshurica** Rupr.*Coleosporium clematidis* Barcl. (銹病) 吉林(313), 辽宁(313), 东北(272).*C. clematidis-apiifoliae* Diet. (銹病) 台灣(289).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 吉林(313).**C. meyeniana** Walp.*Puccinia wattiana* Barcl. (銹病) 台灣(290).

- Clematis montana** (Buch-Ham.) DC. (繡珠藤, 山鉄綫蓮)
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 四川(150), 云南(214), 貴州(245).
C. clematidis-apiifoliae Diet. (銹病) 安徽(65).
Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 四川(91).
- C. morii** Hay.
Aecidium orbiculare Barcl. (銹病) 台灣(290).
- C. orientalis** L. (東方鉄綫蓮)
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 陝西(237).
- C. paniculata** Thunb. (大蓼, 鉄綫蓮, 黃薊子)
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 湖南(32), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36, 106), 浙江(32, 36), 广西(32).
Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 安徽(47).
- C. peterae** H.-M.
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 云南(214).
Puccinia wattiana Barcl. (銹病) 云南(214).
- C. potaninii** Max.
Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 四川(340).
- C. recta** Linn.
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) “东北”(295).
- C. taiwaniana** Hay. (台灣鉄綫蓮)
Puccinia exhausta Diet. (銹病) 台灣(350, 368).
- C. uncinata** Champ.
Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 安徽(66).
- C. sp.** (鉄綫蓮屬)
Aecidium orbiculare Barcl. (銹病) 云南(214).
Coleosporium clematidis Barcl. (銹病) 陝西(7), 四川(214), 云南(214), 貴州(245), 湖南(316), 河南(13), 安徽(245), 江西(245), 广西(245, 274).
C. clematidis-apiifoliae Diet. (銹病) “西康”(57), 安徽(47).
Meliola knowltoniae Doidge (煤病) 台灣(387).
Puccinia clematidicola Tai. (銹病) 陝西(7).
P. rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 云南(306), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 广西(32).
P. wattiana Barcl. (銹病) 云南(214), 广西(246).
Septoria jenissensis Sacc. (叶斑病) 河南(13).
Cuscuta sp. (菟絲子) 河南(13).

Clerodendron cyrtophyllum Turcz. (大青)*Aecidium clerodendri* P. Henn. (锈病) 台湾(290,350).*Cercospora clerodendri* Miyake (褐斑病) 台湾(358).*Coleosporium clerodendri* Diet. (锈病) 台湾(289).*Meliola clerodendri* Yamam. (煤病) 台湾(380).**C. fragrans Vent. (臭牡丹, 臭茉莉)***Aecidium clerodendri* P. Henn. (锈病) 台湾(290,350, 368).*Cercospora bakeri* H. et P. Syd. 台湾(360).*Coleosporium clerodendri* Diet. (锈病) 台湾(289).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Meliola sakahensis* Yamam. (煤病) 台湾(380).*Ramularia clerodendri* Saw. 台湾(360).*Triposporiopsis spingera* (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**C. inerme Gaertn. (苦籃盤, 苦郎树)***Cercospora kashotoensis* Yamam. (叶斑病) 台湾(357, 358).*Puccinia erebia* Syd. (锈病) 广东(32,36,218,274), 台湾(271,276,290,356).**C. paniculatum L.***Aecidium clerodendri* P. Henn. (锈病) 广东(274), 台湾(290,350).*Meliola sakawensis* P. Henn. (煤病) 台湾(380).**C. trichotomum Thunb. (海州常山)***Aecidium clerodendri* P. Henn. (锈病) 台湾(290).*Cercospora clerodendri* Miyake (褐斑病) 河南(13,215).*Coleosporium clerodendri* Diet. (锈病) 贵州(231), 湖北(316), 台湾(289).*Meliola sakawensis* P. Henn. (煤病) 台湾(380).**C. sp. (臭牡丹属)***Cercospora clerodendri* Miyake (褐斑病) 湖南(316).*Coleosporium clerodendri* Diet. (锈病) 福建(32,36).*Meliola sakawensis* P. Henn. (煤病) 台湾(387).**Cleyera japonica Thunb. var. morii Masam.***Physalospora cleyerae* Saw. 台湾(360).**Clinelymus sibiricus (L.) Nevski (老芒麦)***Puccinia elymi* Westd. (锈病) 辽宁(313).

Clitoria ternatea L. (蝴蝶花豆)*Cercospora ternateae* Petch 台湾(358,376).**Cocculus trilobus DC.** (木防己,青藤)*Cercospora cocculi* Syd. (叶斑病) 台湾(360).*C. trilobi* Chupp (叶斑病) 江苏*Microsphaera pseudolonicerae* (Salm.) Blumer 山东(219),
安徽(219),江苏(219),——(283).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**Cocos nucifera L.** (椰子)*Pestalozzia palmorum* Cke. 台湾(350,358).*Rhynchostoma lageniforme* Teng 广东(28,32).**Codiaeum variegatum (L.) Bl.** (变叶木)*Colletotrichum sorauerianum* (Allesch.) Hori (炭疽病)
台湾(350).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).*Phaeosaccardinula javanicum* (Zimm.) Yamam. (煤病)
台湾(387).**Codonopsis pilosula Nannf.** (党参)*Puccinia campanumaeae* Pat. (锈病) “东北”(290).**Coffea arabica L.** (咖啡)*Cercospora coffeicola* Berk. et Cke. (叶斑病) 云南
(212,215),广东(76),台湾(351).*Colletotrichum coffeanum* Noack (炭疽病) 台湾(359).*Hemileia vastatrix* Berk. et Br. (锈病) 云南(212,214),
广东(76,274),台湾(278,290,356).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台
湾(387).**C. liberica Bull.** (大咖啡,利比利亚咖啡)*Hemileia vastatrix* Berk. et Br. (锈病) 台湾(290).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台
湾(387).*Scorias communis* Yamam. (煤病) 台湾(386).*Triposporiopsis spinigera* (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台
湾(387).

Coffea robusta Linden. (咖啡)

Cercospora coffeicola Berk. et Cke. (叶斑病) 台湾 (359).

Hemileia vastatrix Berk. et Br. (锈病) 台湾(290).

Coix agrestis Lour.

Tilletia okudairae (Miyabe) Ling (= *T. taiana* Mundk.) (黑粉病) 云南(149,153).

C. lachryma-jobi L. (薏苡, 川谷)

Epicoccum hyalopes Miyake 四川(150).

Fusarium equiseti (Corda) Sacc. —(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) —(135).

F. heterosporium Nees —(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).

Helminthosporium coicis Nishikado (叶枯病) 辽宁(294).

Phyllachora coicis P. Henn. (黑痣病) 广东(389).

Ustilago coicis Bref. (黑粉病) 吉林 (153, 294), 河北 (153, 166, 197), “西康” (57), 四川(149, 150, 153), 云南 (212), 河南(13), 福建(10, 153).

C. lachryma-jobi L. var. *susutama* Honda

Leptosphaeria coicis Saw. 台湾(360).

Phyllachora coicis P. Henn. (黑痣病) 台湾(360).

Coleus sp. (锦紫苏属)

Coleosporium cheoanum Cummins (锈病) 贵州(245).

Colocasia esculenta Schott (芋)

Botryodiplodia theobromae (Pat.) Griff. et Maubl. 江苏 (29, 32).

Cladosporium colocasiae Saw. (污斑病) 辽宁(294) “西康”(57), 四川(150), 云南(111, 112), 湖南(112), 台湾(350).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. —(135).

Phytophthora colocasiae Racib. (疫病) “西康”(57), 云南 (112), 湖南(112), 江苏(128, 201), 福建(10, 113), 广东 (200, 231), 广西(37, 112), 台湾(287, 350), “华南”(342).

Trichothecium roseum (Bull.) Link. 四川(75).

Bacterium colocasiae Takimoto 辽宁(294), “西康”(57).

Colocasia esculenta Schott.*Erwinia aroidea* (Townsend) Holl. (軟腐病) “西康”(57).*Heterodera schachtii* A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 山东(95).**C. sp. (芋属)***Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 四川(32), 江苏(32), 广西(32).**Colquhounia coccinea** Wall. (炮仗花)*Puccinia leucophaea* Syd. et Butl. (锈病) 云南(214).**Columella japonica** (Willd.) Merr. (烏蕨莓)*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(165).**Commelina nudiflora** L. (竹节花)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Kordyana commelinae* Saw. 台湾(354).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phakopsora tecta* Jackson et Holway (锈病) 广东(274), 台湾(289).*Physalospora commelinae* Saw. 台湾(359).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Uromyces commelinae* Cke. (锈病) 浙江(364), 台湾(290, 350, 359).**C. undulata** R. Br. (波緣鴨跖草)*Phakopsora tecta* Jackson et Holway (锈病) 台湾(264, 289).*Uromyces commelinae* Cke. (锈病) 台湾(290).**C. sp. (鴨跖草属)***Phakopsora tecta* Jackson et Holway (锈病) 广西(274).*Uromyces commelinae* Cke. (锈病) 湖南(32, 36), 安徽(246), 江苏(32, 36), 广东(32, 36), 广西(231, 246).**Convallaria majalis** L. (鈴兰, 草玉鈴, 君影草)*Dendrophoma convallariae* Cav. 吉林(313), 辽宁(313).**Corchorus capsularis** L. (黄麻)*Colletotrichum corchorum* Ikata et Tanaka (炭疽病) 河北(300), 山东(300), 台湾(326, 360).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(349, 350).*Hymenula nigra* Saw. (眼点病) 台湾(349).

Corchorus capsularis L. (黄麻)

Macrophoma corchori Saw. (立枯病) 江苏(32,36), 台湾(349,350).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(17,19), 浙江(19).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江苏(17), 台湾(349).

Phyllosticta corchori Saw. (褐斑病) 江苏(17), 台湾(349,350).

P. nigra Saw. (叶斑病) 台湾(349).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(349,350).

Xanthomonas nakatae (Okabe) Dowson (细菌性叶斑病) “西康”(57), 河北(300), 四川(73), 山东(300), 江苏(17,138), 浙江(138), 台湾(328).

Meloidogyne sp. (根綫虫病) 台湾(349).

C. olitorius L. (小麻)

Cercospora corchori Saw. (叶斑病) 台湾(350).

Macrophoma corchori Saw. (立枯病) 台湾(350).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 台湾(350).

Cordyline terminalis Kunth. (朱蕉)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Coreopsis drummondii Torr. et Gray (金鸡菊)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 辽宁(313).

C. tinctoria Nutt. (波斯菊, 蛇目菊)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Coriandrum sativum L. (胡荽, 芫荽)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 河南(13).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 广西(178).

Coriaria intermedia Matsum. (馬桑)

Phyllosticta coriariae Saw. (叶斑病) 台湾(360).

Pucciniastrum coriariae Diet. (锈病) 台湾(282).

Coriaria sinica Max. (馬桑)*Cercospora coriariae* Chupp (叶斑病) 四川(150,215).*Pucciniastrum coriariae* Diet. (锈病) 四川(150,214), 貴州(245).**C. sp.** (馬桑属)*Pucciniastrum coriariae* Diet. (锈病) 广西(245).**Cornus** sp. (四照花属)*Polyporus igniarius* (L.) Kickx. (白色腐朽) 河南(13).*Ramularia angustissima* Sacc. 河北(317).*Septoria cornicola* Desm. (斑枯病) 河南(13).**Corydalis** sp. (紫堇属)*Melampsora magnusiana* Wagner (锈病) 辽宁(313), 河北(317).**Corylopsis platypetala** Rehd. et Wils.*Aecidium hamamelidis* Diet. (锈病) 浙江(64).**C. sinensis** Hemsl. (蜡瓣花)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219), 广西(208).**C. veitchiana** Bean. (高山蜡瓣花)*Aecidium hamamelidis* Diet. (锈病) 安徽(65).**C. sp.** (蜡瓣花属)*Puccinia corylopsidis* Cummins (锈病) 广西(246).**Corylus heterophylla** Fisch. (榛子)*Mamiania fimbriata* (Pers.) Ces. et de Not. (黑斑病) 河南(13).*Microsphaera alni* (Wallo.) Salm. (白粉病) “热河”(215), 四川(226), 河南(13,213), 江西(47).*Microsphaera coryli* Homma (白粉病) 四川(150).*Mycosphaerella corylina* Karst. 河北(317).*Pucciniastrum coryli* Kom. (锈病) 辽宁(313), 河北(272).**C. sp.** (榛属)*Gnomoniella coryli* (Batsch.) Sacc. 陕西(237).*Microsphaera alni* (Wallr.) Salm. (白粉病) “西康”(57).**Cosmos bipinnatus** Cav. (波斯菊)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 云南(212,213), 山东(374).

Costus speciosus (Koen.) Smith (閉鞘薑)*Ancylospora costi* Saw. 台灣(360).*Cercospora costina* H. et P. Syd. 台灣(358).*Piricularia costi* (Saw.) Ito 台灣(350).**Cotinus coggygeria** Scop. (黃欖)*Pileolaria cotini-coggyriae* Tai et Cheo (銹病) 陝西(218), 河南(13).*Uncinula verniciferae* P. Henn. (白粉病) 河北(209), 河南(13, 213).**C. coggygeria** Scop. var. **cinerea** Engler. (黃欖)*Uncinula verniciferae* P. Henn. (白粉病) 河北(172).**Cotoneaster franchetii** Bois*Coleopuccinia kummingensis* Tai (銹病) 云南(216).**C. microphylla** Wall. (鋪地蜈蚣)*Coleopuccinia kummingensis* Tai (銹病) 云南(216).**C. morrisonensis** Hay. (摩里山栒子)*Aecidium cunninghamianum* Barcl. (銹病) 台灣(280, 290).**C. racemiflora** var. **microcarpa** Rehd. et Wils.*Coleopuccinia sinensis* Pat. (銹病) 西康”(340).**C. tenuipes** Rehd. et Wils. (紆柄栒子)*Coleopuccinia sinensis* Pat. (銹病) “西康”(340).**C. sp.** (栒子屬)*Coleopuccinia sinensis* Pat. (銹病) 甘肅(35), 云南(336).**Crataegus cuneata** Sieb. et Zucc. (山楂子, 野山楂)*Gymnosporangium haraeaeum* Syd. (銹病) 河南(231), 江苏(220, 231).*Podosphaera oxyacanthae* (DC.) de Bary (白粉病) “西康”(57), 江苏(219).**C. pinnatifida** Bge. (山楂, 北山楂)*Coryneum crataegicola* Miura (干枯病) 辽宁(294, 313), “西康”(57).*C. microstictum* Berk. et Br. (干枯病) 辽宁(96).*Gymnosporangium haraeaeum* Syd. (銹病) 河北(64, 116, 218), 陝西(7), 四川(150).*Macrophoma kawatsudai* Hara (*Physalospora piricola* Nose) 四川(150).*Penicillium flavi-dorsum* Bge. 江苏(122).

Crataegus pinnatifida Bge. (山楂, 北山楂)

Phyllosticta crataegicola Sacc. (叶斑病) 辽宁(96), 吉林(294), 河北(222).

Podosphaera oxyacanthae (DC.) de Bary (白粉病) 吉林(294), 贵州(174).

C. pinnatifida Bge. var. **major** N. E. Br. (棠球, 山里红)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 河北(64).

C. pinnatifida Bge. var. **typica** Schneid.

Phyllosticta crataegicola Sacc. (叶斑病) 吉林(313).

C. scabrifolius (Fr.) Rehd. (山林果)

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC. (锈病) 云南(214).

G. haraeaeum Syd. (锈病) 云南(212), 河南(13).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(112, 212).

Podosphaera oxyacanthae (DC.) de Bary (白粉病) 云南(213).

C. sp. (山楂属)

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC. (锈病) 陕西(237).

Crossostephium chinense (L.) Mak. (千年艾)

Peronospora crossostephii Saw. (霜霉病) 台湾(357).

Crotalaria juncea L. (菽麻, 太阳麻)

Cercospora crotalariae Sacc. 台湾(359).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350, 359).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Uromyces decoratus Syd. (锈病) 台湾(290, 356).

C. lonchophylla H.-M.

Uromyces decoratus Syd. (锈病) 云南(214).

C. mucronata Desv. (猪屎豆)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

C. verrucosa L. (多疣猪屎豆)

Cercospora cotizensis Muller et Chupr 台湾(360).

Uromyces decoratus Syd. (锈病) 台湾(290, 359).

C. sp. (猪屎豆属)

Cercospora leguminum Chupp et Linder 广西(240).

Cryptocarya chinensis Hemsl. (厚壳桂)*Meliola neolitseae* Yamam. (煤病) 台湾(382).**C. sp.** (厚壳桂属)*Meliola neolitseae* Yamam. (煤病) 台湾(387).**Cryptomeria japonica** Don. (柳杉)*Cercospora cryptomeriae* Shirai 台湾(354).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Phoma cryptomeriae* Kasai 浙江(8).**Cryptotaenia japonica** Hassk. (鴨儿芹)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Phoma cryptomeriae* Kasai 台湾(358).*Puccinia tokyensis* Syd. (锈病) 贵州(231), 安徽(65), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 64).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**C. sp.** (鴨儿芹属)*Puccinia tokyensis* Syd. (锈病) 广西(246).**Cucumis melo** L. (甜瓜)*Colletotrichum lagenarium* (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 辽宁(294), “热河”(294), 河北(116, 316), “西康”(57), 河南(13).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 江苏(47), 台湾(350).*Corynespora melonis* (Cke.) Gussow 西康(57).*Fusarium bulbigenum* Cke. et Mass. var *niveum* (Smith) Wr. —(135).*F. moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).*Fusarium oxysporum* Schlecht. —(135).*F. poae* (Pk.) Wr. —(135).*F. solani* (Mart.) App. et Wr. —(135).*Mycosphaerella citrullina* (Smith) Gross. (叶斑病) 辽宁(294).*Pseudoperonospora cubensis* (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 黑龙江(294), 辽宁(294), 河南(13), 江苏(220), 台湾(356).*Pythium deBaryanum* Hesse (苗立枯病) 台湾(358).

Cucumis melo L. (甜瓜)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(313), 河北(172), “西康”(57), 河南(374).

Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) 河南(13).

(Mosaic) “东北”(294).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

C. melo L. var. conomon Mak. (越瓜, 节瓜)

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 湖南(112), 广西(112).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 云南(112).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 吉林(294), 辽宁(294), “东北”(287), 台湾(287).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(294), 辽宁(294).

农叶病 (Mosaic) 辽宁(294).

C. melo L. var. makuwa Mak. (甜瓜)

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294).

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. var. *niveum* (Smith) Wr. 辽宁(294).

Mycosphaerella citrullina (Smith) Gross. (叶斑病) 辽宁(294).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. 霜霉病 辽宁(294), “东北”(287), 台湾(287).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294).

C. sativus L. (黄瓜, 胡瓜)

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(116, 321), 山西(321), 陕西(16), 江苏(128).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 辽宁(294), 台湾(350).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 黑龙江(60), 内蒙(372), 新疆(88), 江苏(128).

Fusarium bactridioides Wr. —(135).

Cucumis sativus L. (黃瓜, 胡瓜)

F. bulbigenum Cke. et Mass. var. *niveum* (Smith) Wr. 黑龍江(294).

F. culmorum (Smith) Sacc. —(135).

F. orthoceras App. et Wr. —(135).

F. oxysporum Schlecht. var. *aurantiacum* (Link.) Wr. —(135).

F. sambucinum Fuck. f. 6 Wr. —(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. —(135).

Mycosphaerella citrullina (Smith) Gross. (叶斑病) 黑龍江(294, 313), 吉林(294), “西康”(57).

Nectriella cucumeris Hanz. 福建(10).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 吉林(294).

Phyllosticta cucurbitacearum Sacc. 云南(112).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 黑龍江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(43a, 294), “东北”(287), 内蒙(372), “热河”(294), 河北(166, 197, 373), 陕西(16), “西康”(57), 江苏(106, 128, 220), 浙江(49), “华东”(341), 江西(220), 广东(344), 广西(178, 344), 台湾(287, 356), “华南”(342), 河南(13), 山东(220, 321).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 河北(116), 陕西(16), 江苏(124, 128), 福建(10), 台湾(358).

P. de Baryanum Hesse (苗立枯病) 吉林(294).

Septoria cucurbitacearum Sacc. 福建(10, 121).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龍江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(294), 河北(172, 209, 373), 四川(150), 台湾(350).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 江苏(128), 福建(10), “各地”(138).

E. tracheiphila (Smith) Holl. (萎縮病) 四川(194), 河南(13).

Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) 黑龍江(294), 吉林(294), “西康”(57), 河南(13).

Cucumis virus 1 陕西(16), “西康”(57).

Delphinium virus 1 “西康”(57).

花叶病 (Mosaic) 黑龍江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 河北(184), 河南(13), 江苏(127), 浙江(127), 华东(341), 江西(127), 福建(10), 广东(82).

Cucumis sativus L. (黄瓜, 胡瓜)*Heterodera schachtii* A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 山东(95), 广东(100).**C. sp.** (黄瓜属)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 新疆(88).*Pseudoperonospora cubensis* (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 江苏(220).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 广东(100).**Cucurbita maxima Duch.** (荀瓜, 番南瓜, 印度南瓜)*Choanephora cucurbitarum* (Berk. et Rav.) Thaxter (花腐病) 福建(10).*Colletotrichum lagenarium* (Pass.) Ell. et Halst (炭疽病) 湖南(112).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 云南(112), 湖南(112).*Phyllosticta cucurbitacearum* Sacc. 云南(112).*Pseudoperonospora cubensis* (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) “东北”(287), “热河”(317), 广东(344), 台湾(287), “华南”(342).*Pythium aphanidermatum* (Eds.) Fitz. (猝倒病) 陝西(16).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河南(13), 福建(10).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 广东(100).**C. maximum L.***Heterodera schachtii* A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).*Meloidogyne* sp. (根結綫虫病) 山东(95).**C. moschata Duch.** (紅南瓜, 南瓜)*Choanephora cucurbitarum* (Berk. et Rav.) Thaxter (花腐病) 河南(13).*C. manshurica* (Saito et Nag.) Tai (花腐病) 四川(150).*Colletotrichum lagenarium* (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 四川(75).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 黑龙江(60), 内蒙(321, 372), 河北(321), 山西(1, 319), 广西(178).*Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. ——(135).*F. culmorum* (Smith) Sacc. ——(135).

Cucurbita moschata Duch. (紅南瓜, 南瓜)

F. javanicum Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.)
——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.)
——(135).

F. reticulatum Mont. ——(135).

F. tricinatum (Corda) Sacc. ——(135).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 湖北(231), 山东(231), 江苏(128, 231), 江西(231), 台湾(356).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 河北(116).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

Septoria cucurbitacearum Sacc. 内蒙(372), 山西(321).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(273), 山西(273), 四川(75, 150, 231), 河南(13), 江苏(231), 浙江(231).

S. humuli (DC.) Burr. (白粉病) 江苏(128).

Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) 辽宁(294).

Cucumis virus 1 四川(75).

花叶病 (Mosaic) 吉林(294), 山西(321), “华东”(341).

C. moschata Duch. var. **toonas** Mak. (番南瓜, 攪絲瓜)

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

Septoria cucurbitacearum Sacc. 黑龙江(294), 吉林(294), “热河”(294).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294).

Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) 辽宁(294).

花叶病 (Mosaic) 吉林(294).

Cucurbita pepo L. (西葫蘆, 南瓜, 美国南瓜)

Choanephora cucurbitarum (Berk. et Rav.) Thaxter (花腐病) 陝西(16).

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 广西(37).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) “西康”(57), 四川(194), 湖北(220), 江苏(220).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 河北(116).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(374), 四川(208), 云南(213), 河南(374), 江苏(201, 219), 浙江(219), 台灣(350).

Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) “西康”(57).

Cucumis virus 1 陝西(16), 西康(57).

(Mosaic) 江苏(127).

C. sp. (南瓜属)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 新疆(88), 四川(194), 云南(111, 212), 湖北(315).

Macrosporium cucurmerinum Ell. et Ev. 四川(194).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostr. (霜霉病) 湖南(220, 315).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) “西康”(57), 云南(213, 333), 江苏(219).

花叶病 (Mosaic) 江苏(127).

Cudrania cochinchinensis Masamune var. *gerontogea* Masamune

Uredo cudraniae Saw (锈病) 台灣(290).

C. javanensis Thecul. (蓇芝)

Hymenopsis cudraniae Mass. 台灣(350).

C. tricuspidata Bur. (奴柘; 柘)

Cercospora vanierae Chupp et Linder 貴州(240).

Tubercularia vulgaris Tode (*Nectria cinnabarina* (Tode) Fr.) 云南(306).

Uncinula clintonii Peck. (白粉病) 广西(208).

Cudrania tricuspidata Bur. (奴柘, 柘)

U. miyabei (Salm.) Sacc. et Syd. (白粉病) 四川(150, 226), 云南(213).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

C. triloba Hance (奴柘)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

C. sp. (柘属)

Systremma natans (Tode) Theiss. et Syd. 安徽(231).

Uredo sinensis (Syd.) Trott. (锈病) 广东(370).

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hk. (杉, 香杉)

Gyrophana lacrymans (Wulf.) Pat. “西康”(57).

Hypoderma cunninghamiae (Keissler) Teng 云南(31), 湖南(304), 福建(31).

Lophodermium uncinatum Darker 四川(150).

Macrosporium helminthosporioides (Corda) Sacc. et Trav. 江苏(29).

Elytranthe biracteolata (Hance) le Comte (杉木寄生) 广东(160), 广西(160).

C. sp. (杉属)

Lophodermium uncinatum Darker 四川(21, 32), 湖南(21, 32), 江苏(21, 32), 福建(21, 32), 广西(32).

Macrosporium helminthosporioides (Corda) Sacc. et Trav. 江苏(32).

Cupressus duclouxiana Hickel (干柏杉, 圆柏)

Gymnosporangium cunninghamianum Barcl. (锈病) 云南(214).

C. funebris Endl. (柏, 垂柏)

Gymnosporangium tsingchenensis Wei (锈病) 四川(227).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).

Cycas revoluta Thunb. (苏铁, 凤尾松)

Coniothyrium olivaceum Bon. 四川(150).

Pestalozzia cycadis Allesch. 江苏(102).

Cyclobalanopsis ternaticupula (Hay.) Kudo

Irenina cyclobalanopsicola Yamam. (煤病) 台湾(385).

C. ternaticupula (Hay.) Kudo f. *arisanensis* (Hay.) Kudo

Irene arisanensis Yamam. (煤病) 台湾(385).

Cyclobalanopsis sp. (槲屬)

Meliola cyclobalanopsina Yamam. (煤病) 台湾(387).

Cydonia oblonga Mill. (榲桲, 木瓜)

Cercospora cydoniae Ell. et Ev. 山东(258).

Gymnosporangium haraeum Syd. (銹病) “东北”(290),
河南(13), 江苏(231), 浙江(8).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola*
Nose) (輪紋病) 四川(150, 224).

C. sinensis Thouin. (榲桲, 木瓜)

Gymnosporangium haraeum Syd. (銹病) 云南(214).

Cymbidium aloidolium Sw.

Phyllosticta cymbidii Saw. 台湾(358).

C. ensifolium Sw. (建兰)

Erwinia carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 福建(10).

C. virescens Lindl. (山兰, 春兰)

Colletotrichum orchidearum Allesch. f. *cymbidii* Allesch.
(炭疽病) 四川(150).

C. sp. (蘭屬)

Colletotrichum orchidearum Allesch. f. *cymbidii* Allesch.
(炭疽病) 台湾(358).

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (香茅)

Puccinia nakanishikii Diet. (銹病) 安徽(47), 浙江(364),
台湾(247, 290, 359).

C. citratus (DC.) Stapf. subsp. *marginatus* var. *goeringii*
Hack (野香茅)

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 黑龙江(313).

C. distans (Nees) Duthie. (芸香草)

Sorosporium cymbopogonis-distantis Ling (黑粉病) 四川
(153).

C. hematutus Nees (野香茅)

Sorosporium cantonensis Zundel (黑痣病) 广东(390).

C. tortilis (Presl) A. Camus (扭鞘香茅)

Puccinia nakanishikii Diet. (銹病) 广东(247).

Sorosporium anthistiriae (Cobb) Ling (黑粉病) 湖南(306).

S. cantonensis Zundel (黑粉病) 广东(153).

Cynanchum sibiricum R. Br. (雀瓢)

Melampsora cynanchi Thuem. (銹病) 河北(171).

Cynanchum sp. (牛皮消属)*Cercospora bellynckii* (West.) Niessl. 河北(316).*C. miurae* Syd. 安徽(240).**Cynodon dactylon** (L.) Pers. (狗牙根, 伴根草)*Cerebella cynodontis* Syd. 台湾(358).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phyllachora cynodontis* (Sacc.) Niessl. (黑痣病) 四川(150), 浙江(32, 187), 福建(32, 187), 广东(141), 台湾(350), “华南”(342).*Puccinia cynodontis* Lacroix (锈病) 四川(150), 云南(214), 湖南(316), 安徽(32, 36, 47), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(47), 广东(274, 389), 台湾(290).*Uredo cynodontis-dactylis* Tai (锈病) 四川(150), 云南(214).*Ustilago cynodontis* P. Henn. (黑粉病) 四川(149, 150), 贵州(149, 153), 河南(13, 153), 安徽(47, 153, 231), 江苏(32, 104, 106, 153), 浙江(32, 104, 153), 福建(32, 104, 153), 广东(153, 198, 370, 389), 台湾(152, 153, 288, 350).**C. sp.** (狗牙根属)*Phyllachora cynodontis* (Sacc.) Niessl. (黑痣病) 广西(231).**Cyperus malaccensis** Roxb. (茫茛, 鹼草)*Cintractia limitata* Clint. (黑粉病) 台湾(153, 288).*Phytophthora cyperi* (Ideta) Ito (疫病) 台湾(286, 287, 350, 358).**C. rotundus** L. (莎草, 香附子)*Marasmius sacchari* Wakk. 台湾(357).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phytophthora cyperi-rotundati* Saw. (疫病) 台湾(287, 292, 350, 358).*Puccinia philippinensis* Syd. (锈病) 台湾(290, 350, 359).*P. ramagnoliana* Maire et Sacc. (锈病) 云南(214), 江苏(106).**C. sp.** (莎草属)*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers 江苏(231).*Puccinia canaliculata* (Schw.) Lagerh. (锈病) 江苏(32, 36), 福建(32, 36).*P. cyperi* Arthur (锈病) 贵州(246), 安徽(246), 江苏(32, 36, 231), 广西(246).

Cyperus sp. (莎草属)

P. philippinensis Syd. (锈病) 广东(218,389).

P. romagnoliana Maire et Sacc. (锈病) 云南(214).

Uredo cyperi-tagetiformis P. Henn. (锈病) 江苏(231), 台湾(350).

Dactylis glomerata L. (鸭茅,鸡脚草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 江苏(68).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (锈病) 新疆(88).

P. graminis Pers. (锈病) 新疆(88), 江苏(68).

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (锈病) 西藏(332).

D. sp. (鸭茅属)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (锈病) 新疆(88).

P. graminis Pers. (锈病) 新疆(88).

Dactyloctenium aegypticum (L.) Willd. (龙爪茅)

Ustilago sparsa Underw. (黑粉病) 台湾(152,153,288).

Dahlia pinnata Cav. (大丽花,大丽菊)

Fusarium merismoides Corda —(135).

D. variabilis Desf. (大丽花,天竺牡丹)

Cercospora grandissima Rangel (= *C. dahliae* Hara) (叶斑病) 四川(150), 河南(13,215), 台湾(377).

Phoma dahliae Berk. (茎腐病) 河南(13).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 台湾(350).

Erwinia carotovora (Jones) Holl. (萎凋病) 福建(10).

D. sp. (大丽花属)

花叶病(Mosaic) 江苏(127).

Dalbergia hupeana Hance (黄檀)

Catacauma dalbergiicola (P. Henn.) Theiss. et Syd. 江苏(32,187), 浙江(32,187).

Macrophoma dalbergiicola Teng 江苏(32).

Phyllosticta dalbergiicola Syd. 浙江(29,32).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Dalbergia sisso Roxb. (印度黃檀)*Maravalia achroa* (Syd.) Arthur et Cummins 台灣(290).**D. sp.** (黃檀屬)*Maravalia achroa* (Syd.) Arthur et Cummins 貴州(245).**Daphnes genkwa** Sieb. et Zucc. (芫花)*Cercospora genkwae* Syd. 湖北(364).**D. sp.** (瑞香屬)*Uredo daphnicola* Diet. (銹病) 廣東(248).**Daphniphyllum glaucescens** Bl. (小交趾木, 虎皮楠)*Cladosporium daphniphylli* Saw. 台灣(358).*Curvigitus daphniphylli* Saw. 台灣(359).**Datura alba** Nees (白曼陀羅)*Alternaria dauci* (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (黑斑病) 河北(374), — (317).*Cercospora daturicola* (Speg.) Ray. 四川(150, 215).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣(350).**D. metel** L. (毛曼陀羅)*Alternaria crassa* (Jacq.) Rands (黑斑病) 台灣(360).

花葉病 (Mosaic) 江蘇(127).

D. stramonium L. (曼陀羅)*Alternaria dauci* (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (黑斑病) 遼寧(294, 313).**D. sp.** (曼陀羅屬)*Alternaria dauci* (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (黑斑病) 河南(13).**Daucus carota** L. (胡蘿蔔)*Alternaria dauci* (Kuehn.) Groves et Skolko (= *A. carotae* (Ell. et Lang.) Ell.) (黑斑病) 黑龍江(294), 遼寧(294), “熱河”(294), — (373).*Cercospora apii* Fres. var. *carotae* Pass. (葉斑病) 吉林(294), 遼寧(294), “熱河”(294).*C. carotae* (Pass.) Solheim 四川(150, 215), 河南(13).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台灣(350), 江蘇(128).*Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. — (135).*F. culmorum* (Smith) Sacc. — (135).

Daucus carota L. (胡蘿蔔)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川 (150,194), 河南(13), 江苏(128), 台湾(350).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 江苏(128), 福建(10), “各地”(138).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 辽宁(294), “西康”(57), 河南(13).

Xanthomonas nigromaculans (Takim.) Dowson “热河”(345).

D. carota L. var. *sativa* DC. (胡蘿蔔)

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

Decaisnea fargeseii Fr. (胡瓜树, 貓屎瓜, 貓儿屎)

Microsphaera decaisneae Tai (白粉病) 陝西(211).

Delphinium delavayi Fr.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. (锈病) 云南(214).

D. sp. (飞燕草属)

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (锈病) 江苏(231).

Dendrobium crystallinum Reichb.

Colletotrichum cinctum (Berk. et Curt.) Stonem. 江苏(103).

Dendrocalamus latiflorus Munro (麻竹)

Cercospora dendrocalami Saw. 台湾(360).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (台湾)(350).

Dasturela divina (Syd.) Mundk. et Kheswalla 台湾(278).

Lasmenia phyllostachydis Saw. 台湾(360).

Macrophoma dendrocalami Saw. 台湾(360).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

D. sp. (麻竹属)

Puccinia ignava Arthur (锈病) 广东(32,36), 广西(32).

Derris chinensis Benth. (中国魚藤)

Haplophragmium kawakamii Hirat. et Hashioka (锈病) 台湾(357).

Desmodium caudatum (Thunb.) DC. (小槐花, 山馬蝗)

Cuscuta japonica Choisy 菟絲子) 浙江(165).

Desmodium heterocarpum (L.) DC. (假地豆)*Microthyrium nigropapillatum* Saw. 台湾(351).**D. pseudo-triquetrum** DC. (蔓莖葫蘆茶)*Uredo desmodii-pulchellii* Syd. (銹病) 台湾(290).**D. pulchellum** Benth. (牌錢樹)*Uredo desmodii-pulchellii* Syd. (銹病) 台湾(290).**D. racemosum** (Thunb.) DC. (山馬蝗)*Phakopsora meibomiaae* Arthur (銹病) 貴州(245).**D. triflorum** (L.) DC. (三點金草)*Parodiella perisporioides* (Berk. et Curt.) Speg. 广东(389).**D. triquetrum** (L.) DC. (葫蘆茶)*Uredo desmodii-pulchellii* Syd. (銹病) 台湾(290).**D. yunnanense** Franch. (雲南山綠豆)*Uromyces capitatus* Syd. (銹病) 云南(369).**D. sp.** (山馬蝗屬)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 广西(231).*Parodiella perisporioides* (Berk. et Curt.) Speg. 江苏(22, 32), 云南(22, 32).**Deutzia bartletti** Yamam.*Puccinia kusanoi* Diet. (銹病) 台湾(277, 290).**D. discolor** Hemsl. (異色溲疏, 粗葉溲疏)*Uredo deutziae* Barcl. (銹病) 云南(214).**D. pulchra** Vidal. var. **formosana** Nakai*Uredo deutzicola* Hirat. (銹病) 台湾(290).**D. taiwanensis** Schneid. (台溲疏)*Uredo deutzicola* Hirat. (銹病) 台湾(290).**Dianella ensifolia** DC. (山蘭萱, 山萱紅)*Cercospora dianellae* Saw. 台湾(239).*Heterosporium dianellae* Saw. 台湾(360).*Pestalozzia dianellicola* Saw. 台湾(360).*Uredo dianellae* Diet. (銹病) 广东(249), 台湾(290, 350, 368).**D. sp.** (山萱蘭屬)*Uredo dianellae* Diet. (銹病) 广东(32, 36).**Dianthus caryophyllus** L. (麝香石竹)*Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. —(135).*F. culmorum* (Smith) Sacc. —(135).

Dianthus caryophyllus L. (麝香石竹)*F. poae* (Pk.) Wr. ——(135).*Uromyces dianthi* Niessl. (锈病) 四川(150).**D. chinensis** L. (石竹)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Fusarium culmorum* (Smith) Sacc. ——(135).*F. dianthi* Prill. et Del. ——(135).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).*Septoria dianthi* Desm. 黑龙江(313), 四川(150).*S. sinarum* Speg. 江苏(29, 32).*Uromyces dianthi* Niessl. (锈病) 河北(171), 河南(13), 江苏(32, 36), ——(290, 359).**D. longicalyx** Miq. (长萼石竹)*Uromyces dianthi* Niessl. (锈病) 江苏(220).**D. sinensis** L.*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).**D. superbus** L. (瞿麦)*Septoria dianthicola* Sacc. (斑枯病) 陕西(237).*Ustilago violacea* (Pers.) Fuck. (= *U. superba* Liro, fide Ling, 1953) (黑粉病) 黑龙江(153, 313), “东北”(288), 河北(153), “西康”(153).**D. sp.** (石竹属)*Ascochyta dianthi* (A. et S.) Lib. “西康”(57).*Leptostromella hysieriodes* (Fr.) Sacc. 陕西(237).*Phoma caryophylli* Booke 湖北(316).**Diapensia himalaica** var. *acutifolia* (H.-M.) Evans*Phyllosticta diapensiae* Pat. 云南(306).**Dicliptera chinensis** (L.) Nees (狗肝菜)*Puccinia diclipterae* Syd. (锈病) 台湾(290).**Digitaria chinensis** Hornem.*Ustilago rabenhorstiana* Kuehn. (黑粉病) 河北(153), 西康(153), 四川(153), 湖北(153), 安徽(153), 江苏(153).**D. henryi** Rendle*Puccinia levis* (Sacc. et Bizz.) Magn. (锈病) 台湾(271).**D. ischaemum** (Schreb.) Muhl. (止血馬唐)*Ustilago rabenhorstiana* Kuehn. (黑粉病) 河北(153), “西康”(153), 四川(153), 湖北(153), 安徽(153, 393), 江苏(153).

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (馬唐)

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 四川(150).

Piricularia grisea (Cke.) Sacc. (瘟病) 河北(317), 四川(150), 江苏(68, 284).

Puccinia levis (Sacc. et Bizz.) Magn. (锈病) 四川(150, 214), 云南(214).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 四川(150).

Telimena graminis (Hoehn.) Theiss. et Syd. 广东(362).

Tilletia pulcherrima Ell. et Gall. (黑粉病) 辽宁(153), 四川(153).

Ustilago rabenhorstiana Kuehn. (黑粉病) 河北(153), “西康”(153), 四川(150, 153), 湖北(153), 安徽(153), 江苏(153).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

D. sanguinalis (L.) Scop. var. ciliaris (Retz.) Parl.

Ustilago rabenhorstiana Kuehn. (黑粉病) 河北(153, 198, 315), 西康(153), 四川(153), 湖北(153), 安徽(153), 江苏(47, 153, 198).

D. sanguinalis (L.) Scop. var. commutatus Hack

Piricularia grisea (Cke.) Sacc. (瘟病) 吉林(313), 辽宁(313).

D. ternata (Rich.) Stapf

Ustilago rabenhorstiana Kuehn. (黑粉病) 河北(153), “西康”(153), 四川(153), 湖北(153), 安徽(153), 江苏(153).

D. sp. (馬唐属)

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 江苏(231).

Piricularia grisea (Cke.) Sacc. (瘟病) 河南(13).

Puccinia oahuensis Ell. et Ev. (锈病) 广西(246).

Telimena graminis (Hoehn.) Theiss. et Syd. 河南(13).

Ustilago rabenhorstiana Kuehn. (黑粉病) 江苏(32, 104).

Dioscorea alata L. (大薯, 参薯)

Cercospora ubi Rac. (叶斑病) 台湾(358, 377), “华南”(342).

Cylindrosporium dioscoreae Miyabe et Ito “西康”(57).

Gloeosporium pestis Mass. (炭疽病) 台湾(253, 355).

Phyllosticta kawakamii Saw. 台湾(358).

Dioscorea batatas Decne. (家山药, 山药)

Cylindrosporium dioscoreae Miyabe et Ito 河南(168), 山东(168).

Gloeosporium pestis Mass. (炭疽病) 台湾(253, 355).

Phyllosticta dioscoreae Cke. “东北”(371).

D. japonica Thunb. (薯类)

Cercospora dioscoreae Ell. et Mart. (叶斑病) 辽宁(294).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Cylindrosporium dioscoreae Miyabe et Ito 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345).

Phyllosticta dioscoreae Cke. 辽宁(294), 河北(321).

Xanthomonas nigromaculans (Takim.) Dowson “热河”(345).

D. quinqueloba Thunb. (山药)

Cylindrosporium dioscoreae Miyabe et Ito 辽宁(294, 313).

Puccinia dioscoreae Koern. (锈病) 辽宁(313), “东北”(290, 295), 河北(218).

Urocystis dioscoreae Syd. (黑粉病) 河南(153, 198).

Diospyros kaki L. (柿)

Botryodiplodia theobromae (Pat.) Griff. et Maubl. 广东
Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) “西康”(57).

Cercospora kaki Ell. et Ev. (角斑病) 河北(51, 145, 166, 197, 222, 321), 山西(319), “西康”(57), 四川(150), 云南(111, 112, 212), 河南(13), 山东(11, 51, 321), 安徽(51), 江苏(30, 32, 51, 106, 128), 福建(10), 广西(30, 32, 112), 台湾(355).

Fusicladium kaki Hori et Yoshino (黑星病) “西康”(57), 山东(11).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 山东(11).

Macrophoma diospyri Earle 广东

Mycosphaerella nawae Hiura et Ikata (落叶性圆斑病) 河北(145, 321), “西康”(57), 山东(11).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Pestalozzia diospyri Syd. 云南(111, 112, 212), 湖南(112), 河南(13), 江苏(284).

Diospyros kaki L. (柿)

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phoma diospyri Syd. (褐斑病) 云南(112).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(212, 213), 贵州(174), 河南(13), 安徽(219), 福建(231), 广西(208), 台湾(356).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

D. kaki L. var. **domestica** Mab.

Gloeosporium kaki Hori (炭疽病) 台湾(356).

D. kaki L. var. **silvestris** Mak. (油柿)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 福建(208).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 福建(10).

D. lotus L. (君迁子)

Cercospora kaki Ell. et Ev. (角斑病) 河北(116, 145, 321), 云南(112, 215), 湖北(316), 山东(321).

C. macclatchieana Sacc. (= *C. fuligenosa* Ell. et Ev.) (叶斑病) ——(258).

Mycosphaerella nawae Hiura et Ikata (落叶性圆斑病) 河北(145, 321).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(116, 315), 云南(112, 213).

D. sp. (柿属)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

Dolichos lablab L. (藊豆, 菹豆)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Cercospora canescens Ell. et Mart. (褐斑病) 四川(150), 湖南(112), 安徽(231), 江苏(128), 福建(10), 广西(215).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (褐斑病) 河南(13), 台湾(358).

Choanephora manshurica (Saito et Nag.) Tai (花腐病) 四川(150), 江苏(207).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. var. *lablab* Sacc. 江苏(128), 福建(344).

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 河南(13).

Dolichos lablab L. (藕豆, 茼豆)

Elsinoe dolichi Jenk., Bit. et Cheo (疮痂病) 云南(119, 212, 297).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) “东北”(283), 四川(150, 226), 湖北(47), 江苏(47, 128), 浙江(47).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Septoria lablabina Sacc. (叶斑病) 云南(212), 台湾(358).

Synchytrium dolichi (Cke.) Gaum. (= *Woroninella dolichi* (Cke.) Syd.) 广东(141), “华南”(342).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 河南(13).

花叶病 (Mosaic) 河南(13), 江苏(127), 浙江(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

D. sp. (藕豆属)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Physalospora phlyctaenoides (Berk. et Curt.) Sacc. 江苏(22, 32).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Draba nemorosa L. var. *hebecarpa* Ledeb. (亭藤)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) 台湾(287), “东北”(287).

Peronospora drabae Gaum. (霜霉病) 黑龙江(43a), 辽宁(43a).

Dracocephalum prattii (Levl.) H.-M.

Ophiobolus dracocephali-altajensis Murash. 甘肅(340).

D. rupestre Hance (岩香兰)

Ophiobolus dracocephali-altajensis Murash. 山西(340).

Duranta plumieri Jacq.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

C. salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Ebulus formosana Nakai

Cercospora catenosporea Atk. (叶斑病) 台湾(376).

Helminthosporium ebuli Saw. 台湾(360).

Irenina ebuli Yamam. (煤病) 台湾(382).

Ecdysanthera utilis Hay. et Kawakami (花皮胶藤)

Irenopsis hiptages Yamam. (煤病) 台湾(385).

Pestalozzia ecdysantherae Saw. (輪紋病) 台湾(359).

Echinochlea colonum (L.) Link (稗子, 芒稷)

Helminthosporium moniceras Drechsler 四川(150).

Tolyposporium bullatum (Schroet.) Schroet. (长粒黑穗病)
四川(150).

Ustilago sphaerogena Burr. (黑粉病) 四川(149, 150, 153),
貴州(153), 江苏(153), 福建(153), 台湾(153).

E. crus-galli (L.) Beauv. (稗)

Cercospora fusimaculans Atk. (叶斑病) 河北(374).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link (黑霉病) 云南
(111).

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 台湾
(357).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Ephelis oryzae Syd. (*Balansia oryzae* (Syd.) Naras. et Thirum.) (“一拉香”病) 云南(212).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Phyllosticta sorghina Sacc. 云南(111).

Tilletia pulcherrima Ell. et Gall. (腥黑粉病) 辽宁(153),
四川(153).

Tolyposporium bullatum (Schroet.) Schroet. (长粒黑穗病)
四川(149, 150, 153), 福建(153), 台湾(152, 153).

Ustilago crus-galli Tracy et Earle (黑粉病) 黑龙江(153),
吉林(153), 东北(321), 河南(13), 安徽(153, 231), 台湾(152,
153).

U. sphaerogena Burr. (黑粉病) 四川(153), 貴州(153), 江
苏(153), 福建(104, 153), 台湾(152, 153).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

E. crus-galli (L.) Beauv. subsp. *submutica* Honda

Balansia andropogonis Syd. (柱香病) 台湾(360).

Tolyposporium bullatum (Schroet.) Schroet. (长粒黑穗病)
台湾(358).

Ustilago crus-galli Tracy et Earle (黑粉病) 台湾(358).

U. sphaerogena Burr. (黑粉病) 台湾(358).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165),

- Echinochloa crus-galli** (L.) Beauv. subsp. *submutica* Honda
var. *typica* Honda
Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.
(黄化矮缩病) ——(287). 台湾
- E. crus-galli** (L.) Beauv. var. *edulis* Honda
Helminthosporium monoceras Drechsler 黑龙江(294).
Ustilago crus-galli Tracy et Earle (黑粉病) 黑龙江(294),
吉林(294).
- E. crus-galli** (L.) Beauv. var. *mitis* (Pursh.) Peterm.
Tolyposporium bullatum (Schroet.) Schroet. (长粒黑穗病)
四川(153), 福建(153), 台湾(153, 359).
- E. crus-pavonis** (H. B. K.) Schult.
Ustilago sphaerogena Burr. (黑粉病) 四川(153), 贵州
(153), 江苏(153), 福建(153), 台湾(153).
- E. frumentacea** Link (稗)
Ustilago sphaerogena Burr. (= *U. panici-frumentacei* non
Bref., Ling) (黑粉病) 四川(153), 贵州(153), 江苏(149,
153), 福建(153), 台湾(153).
- E. sp.** (稗属)
Ustilago sphaerogena Burr. (黑穗病) 江苏(32, 104), 福建
(32, 104).
- Eclipta alba** (L.) Hassk (鳢肠, 早莲草)
Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川
(150), 台湾(350).
- Ehretia acuminata** R. Br. (松阳, 澳洲白莲花)
Phakopsora ehretiae Hirat. (锈病) 台湾(350, 368).
- E. corylifolia** Wright (泡果树)
Uncinula ehretiae Keissler (白粉病) 云南(221).
- E. dicksoni** Hance (粗糠树)
Uromyces garanbiensis (Hirat. f. et Hashioka) Saw. (锈病)
台湾(359).
- E. dicksoni** Hance var. *japonica* Nakai
Uredo ehretiae Barcl. (锈病) 台湾(290).
- E. dicksoni** Hance var. *typica* Nakai (狄氏厚壳树)
Uredo garanbiensis Hirat. et Hashioka (锈病) 台湾(290,
358).

Ehretia formosana Hemsl. (台厚壳树)*Macrophoma ehretiae* Cke. et Mass. 台湾(355).**E. macrophylla** Wall. (大叶厚壳树)*Uredo ehretiae* Barcl. (锈病) 四川(150), 台湾(350).**E. taiwaniana** Nakai (岭南白莲茶)*Phakopsora ehretiae* Hirat. (锈病) 台湾(266, 279, 289, 358).*Uredo ehretiae* Barcl. (锈病) 台湾(290).**E. thyrsoflora** Nakai (厚壳树, 被序厚壳)*Uredo ehretiae* Barcl. (锈病) 台湾(290).**E. sp.** (厚壳树属)*Phakopsora ehretiae* Hirat. (锈病) 广东(274).*Uncinula ehretiae* Keissler (白粉病) 云南(304).**Eichhornia crassipes** (Mart.) Solms. (凤眼蓝, 洋雨久花)*Monosporium eichhorniae* Saw. 台湾(360).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).**Elaeagnus angustifolia** Linn. (桂香柳, 沙枣)*Aecidium elaeagni* Diet. (锈病) 陕西(214).**E. glabra** Thunb. (光滑胡颓子, 藤胡颓子, 三月黄子)*Aecidium elaeagni* Diet. (锈病) 台湾(290).**E. lanceolata** Warb. subsp. **grandifolia** Serg.*Aecidium quinatum* Syd. (锈病) 贵州(246).*Puccinia elaeagni* Yosh. (锈病) 贵州(246).**E. multiflora** Thunb. (木半夏)*Aecidium elaeagni-umbellatae* Diet. (锈病) 江苏(32, 36).*Phyllosticta argyrea* Speg. 江苏(29, 32, 103), 浙江(29, 32).**E. oldhami** Max.*Aecidium elaeagni* Diet. (锈病) 台湾(280, 290).**E. pungens** Thunb. (胡颓子)*Aecidium elaeagni* Diet. (锈病) “西康”(32), 四川(150, 214), 安徽(65), 江苏(32, 36, 47, 106), 浙江(32, 36, 66), 江西(32, 36, 47), 福建(32, 36).**E. pungens** Thunb. (胡颓子)*Phyllosticta argyrea* Speg. 江苏(29, 32), 浙江(29, 32).*Septoria argyreae* Sacc. (斑枯病) 江苏(47).**E. sp.***Aecidium elaeagni* Diet. (锈病) “西康”(32), 云南(214), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(32, 36), 福建(32, 36).

Elaeagnus sp.

A. elaeagni-umbellatae Diet. (锈病) 台湾(290).

Phyllosticta argyrea Speg. 河南(13).

Puccinia achroa Syd. (锈病) 云南(32,36).

Elaeocarpus decipiens Hemsl.

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

E. dubius

Asterina elaeocarpi Syd. (煤病) 广东(340).

E. hainanensis Oliv. (水石榕)

Asterina elaeocarpi Syd. (煤病) 广东(340).

E. serratus

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. et Hensch. (荃薺)

Dermatosorus eleocharidis Saw. 台湾(152,153).

Entyloma eleocharidis (Saw.) Ling (叶黑粉病) 福建(10),
台湾(152,153).

Puccinia liberta Kern. (锈病) 福建(10, 113, 214), 台湾
(290).

Ustilago eleocharidis Saw. (黑粉病) 台湾(358).

Elephantopus scaber L. (地胆草)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Phakopsora elephantopodis Hirat. f. (锈病) 台湾(265,
276,289,356).

E. sp. (地胆草属)

Coleosporium elephantopodis Thuem. (锈病) 广西(245).

Eleusine coracana (L.) Gaertn. (稈子, 龙爪稈, 川稈)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Marasmius plicatus Wakker 台湾(350).

E. indica (L.) Gaertn. (蟋蟀草)

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 台湾
(357).

Helminthosporium nodulosum Berk. et Curt. (叶枯病) 四川
(150), 台湾(360).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Piricularia grisea (Cke.) Sacc. (瘟病) 河南(13), 江苏(29,
32), 广西(32).

Eleusine indica (L.) Gaertn. (蟋蟀草)*Puccinia cynodontis* Desm. (锈病) 台湾(359).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**Elscholtzia patrinii** (Lepech.) Garcke (香薷)*Coleosporium perillae* Syd. (锈病) 云南(214), 安徽(231).*C. plectranthi* Barcl. (锈病) 陕西(7).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 辽宁(313), 河北(209).**E. rugulosa** Hemsl.*Coleosporium perillae* Syd. (锈病) 云南(214).**E. stauntonii** Benth.*Erysiphe galeopsidis* DC. (白粉病) 河北(209).*E. polygoni* DC. (白粉病) 山西(340).**E. sp.***Erysiphe galeopsidis* DC. (白粉病) 四川(150, 226).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(333).**Elymus dahuricus** Turcz. (披碱草)*Puccinia graminis* Pers. (锈病) “东北”(290).**E. dahuricus** Turcz. var. *cylindricus* Franch. (披碱草)*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) 河北(340).**E. dasystachys** Trin. (毛穗野麦)*Septoria elymicola* Diet. (斑枯病) 甘肃(340).**E. sibiricus** L. (老芒麦)*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) 陕西(340).*Puccinia elymi* Westd. (锈病) “东北”(290).*P. elymi-sibirici* Ito (锈病) 河北, 山西.*P. graminis* Pers. (稈锈病) “东北”(290).*P. rubigo-vera* (DC.) Wint. (叶锈病) 黑龙江(169, 273).**E. tianchanicus** Drobv*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (叶锈病) 新疆(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88).**E. sp.***Puccinia graminis* Pers. (稈锈病) 辽宁(313).**Engelhardtia chrysolepis** Hance (黄杞)*Irene engelhardtiae* Yamam. (煤病) 台湾(383).

Enkianthus chinensis Franch. (中华吊钟花)

Aecidium enkianthi Diet. (锈病) 四川(150).

Entada phaseoloides (L.) Merr. (榼藤子)

Meliola bicornis Wint. var. *robinsonii* (Syd.) Stev. (煤病) 台湾(380).

Mycosphaerella entadae Saw. 台湾(358).

Epilobium angustifolium L. (柳兰)

Pestalozzia kriegeria Bres. (輪紋病) 河北(317).

Ramularia enecans Magn. 河北(317).

R. punctiformis (Schlecht.) Hoehn. 黑龙江(313).

Epimedium pubescens Max. (毛淫羊藿)

Puccinia epimedii (P. Henn. et Shirai) Miyabe et Ito (锈病) 四川(150).

E. sp. (淫羊藿属)

Erysiphe polygoni DC. var. *epimedii* Tai (白粉病) 河南(213).

Puccinia epimedii (P. Henn. et Shirai) Miyabe et Ito (锈病) 陕西(214), 四川(214), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36).

P. graminis Pers. (稈锈病) 陕西(237).

P. graminis tritici Erikss. et Henn. (稈锈病) 河南(13).

Epipremnum mirabile Schott. (麒麟尾)

Puccinia hashikawai Hirat. (锈病) 广东(274), 台湾(290, 357).

Eragrostis atrovirens Trin. (黑綠知风草)

Phyllachora eragrostidis Saw. (黑痣病) 台湾(360).

E. cilianensis (Allesch.) Link (大画眉草)

Ustilago spermophora Berk. et Curt. (黑粉病) 四川(150, 153), 安徽(153), 江苏(32, 104, 153, 198), 福建(153).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

E. ferruginea (Thunb.) Beauv. (知风草)

Phyllachora eragrostidis Saw. (= *P. eragrostidis* Petr.) (黑痣病) 广东(340).

P. graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 四川(150).

Puccinia emaculata Schw. (锈病) 河北(171).

P. eragrostidis-ferrugineae Tai (锈病) 云南(214).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黃化矮縮病) 台湾(287).

Ustilaginoidea penniseti Miyake (麴病) 江苏(231).

Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv (知風草)

Ustilago spermophora Berk. et Curt. (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 安徽(153), 江苏(153), 福建(153).

E. japonica (Thunb.) Trin. (日本知風草)

Ustilago spermophora Berk. et Curt. (黑粉病) 四川(153), 安徽(153), 江苏(153), 福建(114, 153).

E. niwahokeri Honda

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黃化矮縮病) 台灣(287).

E. pilosa Beauv. (画眉草)

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

E. plumosa Link (羽毛知風草)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台灣(350).

E. tenella (L.) Beauv. (乱草)

Ustilago spermophora Berk. et Curt. (黑粉病) 四川(153), 安徽(153), 江苏(153), 福建(153).

E. sp. (画眉草属)

Angiopsora hiratsukae Syd. 台灣(280, 357).

Puccinia morigera Cummins (銹病) 貴州(246).

Eranthemum nervosum (Vahl.) R. Br.

Puccinia polystegia Syd. (銹病) 广东(362).

Erianthus fastigiatus A. Henry

Puccinia erianthi Padw. et Khan (銹病) 云南(214).

E. fulvus Nees (蔗茅)

Puccinia erianthi Padw. et Khan (銹病) 江苏(364).

E. pollinoides Rendle

Balansia andropogonis Syd. (香柱病) 台灣(360).

Phyllachora erianthi Saw. (黑痣病) 台灣(360).

Rhopoglyphus formosanus Saw. 台灣(360).

E. rufipilis (Steud.) Griseb. (紅毛蔗茅)

Puccinia erianthi Padw. et Khan (銹病) 云南(247), 湖北(247).

Erigeron annuus Pers. (一年蓬)

Basidiophora entospora Roze et Cornu (霜霉病) 台灣(287).

Eriobotrya japonica Lindl. (枇杷)

Ascochyta eriobotryae Vogl. (褐斑病) 四川(150), 江苏(29, 32, 128).

Eriobotrya japonica Lindl. (枇杷)

Cercospora circumscissa Sacc. (叶斑病) 四川(150).

C. eriobotryae (Enjoji) Saw. (叶斑病) “西康”(57), 四川(150, 215), 云南(111, 112, 212, 215), 湖南(112, 215), 广东(112), 台湾(356).

Clasterosporium eriobotryae Hara (污叶病) “西康”(57), 四川(150), 湖南(112), 浙江(8), 福建(10, 121), 广东(112, 233), 台湾(358).

Coleopuccinia simplex (Diet.) Hara (锈病) “西康”(33), 四川(150), 云南(216), 台湾(269, 278, 357).

Leptosphaeria puttemansii Maubl. 云南(306).

Microdiplodia miyakei Sacc. 湖北(315).

Pestalozzia congensis P. Henn. (轮斑病) 江苏(102, 128), 福建(10).

P. eriobotryae McAlp. (轮斑病) 云南(306), 浙江(8).

P. eriobotryae-japonicae Saw. (轮斑病) 四川(150), 台湾(358).

P. funerea Desm. (轮斑病) 四川(75), 云南(112, 212), 湖南(112), 广东(112).

Phyllosticta eriobotryae Thuem. 湖南(112), 江苏(29, 32, 128), 浙江(8, 49), 福建(10, 121), 广东(79, 112).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (菌核病) 四川(150).

Sphaeropsis Malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 江苏(32).

Stilbum cinnabarina Mont. 四川(150).

Pseudomonas eriobotryae (Takim.) Dowson (芽枯病) “西康”(57).

E. sp. (枇杷属)

Coleopuccinia simplex (Diet.) Hara (锈病) 贵州(218), 广西(218).

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth. (野黍)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Uromyces eriochloae Syd. et Butl. (锈病) “东北”(272, 290, 371).

Eriosema chinense Vogel (毛瓣花)

Parodiella perisporioides (Berk. et Curt.) Speg. 广西(340).

Eritrichium pectrinatum DC. (鸡冠无緣草)

Peronospora eritrichii Ito et Tokunaga (霜霉病) 吉林 (43a).

Erysium cheiranthoides L. var. **japonicum** Boiss.

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

Erythrina variegata L. var. **orientalis** Merr. (刺桐)

Stagnospora erythrinae Saw. 台湾(360).

Eucalyptus globulus Lab. (蓝桉, 蓝油木)

Cercospora epicoccoides Cke. et Mass. (叶斑病) 台湾 (377).

E. tereticornis Smith (細叶桉)

Loranthus chinensis DC. (松寄生) 广西(160).

Euchresta horsfieldii Benn. var. **formosana** Hay.

Meliola euchrestae Yamam. (煤病) 台湾(382).

Eucommia ulmoides Oliv. (杜仲)

Macrophomina phaseoli (Mauubl.) Ashby (基腐病) 安徽 (19).

Eugenia jambos Linn. (蒲桃)

Diplodia natalensis Evans (*Physalospora rhodina* Berk. et Curt.) 台湾(356).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

E. japonica Lam.

Cercospora eugeniae (Rangel) Chupp (叶斑病) 台湾(358).

E. malaccensis

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾 (387).

E. uniflora Linn. (毕当茄)

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

E. sp. (丁子香属)

Meliolina octospora (Cke.) Hoehn. (煤病) 台湾(387).

Eulalia quadrinervis (Hack) Kuntze (四脉金茅)

Puccinia pollinae-quadrinervis Diet. (锈病) 云南(214).

Eulalia sp. (金茅属)

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (锈病) 广西(245).

Puccinia pollinae-quadrinervis Diet. (锈病) 云南(214).

Eupatorium chinensis L. (泽兰, 兰草)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

E. formosanum Hay. (台泽兰)

Cercospora eupatorii-formosani Saw. (叶斑病) 台湾(359).

Cercospora eupatorii Saw. (叶斑病) 台湾(359).

Coleosporium eupatorii Arthur (锈病) 台湾(277, 289).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

E. fortunei Turcz. var. **tripartitum** Nakai

Coleosporium eupatorii Arthur (锈病) 台湾(289).

E. japonicum Thunb. (泽兰)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

E. lindleyanum DC.

Coleosporium eupatorii Arthur (锈病) 安徽(245), 江苏(214).

E. sp. (泽兰属)

Cercospora ageratoides Ell. et Ev. (叶斑病) 安徽(239), 广西(239).

C. costaricensis Syd. (叶斑病) (239).

Coleosporium eupatorii Arthur (锈病) 贵州(245), 江苏(32, 36), 广西(245).

Puccinia tenuis (Schw.) Burr. (锈病) 广西(246).

Euphorbia esula L.

Uromyces kalmusii Sacc. (锈病) 黑龙江(369).

E. esula L. var. **latifolia** Ledeb.

Melampsora euphorbiae (Schrb.) Cast. (锈病) 黑龙江(313).

E. helioscopia L. (泽漆)

Cercospora euphorbiae Kell. et Sw. (= *C. helioscopiae* Sy.) (叶斑病) 江苏(29, 32).

E. humifusa Willd. (地锦)

Cercospora brachypus Ell. et Ev. (叶斑病) 四川(221).

Uromyces proeminens (DC.) Lev. (锈病) “东北”(290), 河北(63, 316), 河南(373).

- Euphorbia humifusa** Willd. var. **pilosa** Thellung
Uromyces proeminens (DC.) Lev. (锈病) “东北”(272).
- E. pekinensis** Rupr. (大戟)
Aecidium euphorbiae Gmel. (锈病) 河北(315), 山西(340), 山东(64).
Melampsora euphorbiae-dulcis Otth. (锈病) 山东(66), 江西(245).
- E. sieboldiana** Morr. et Decne. (甘遂)
Melampsora euphorbiae-dulcis Otth. (锈病) 安徽(231).
Uromyces proeminens (DC.) Lev. (锈病) 江苏(106).
- E. sp.** (大戟属)
Cercospora euphorbiae Kell. et Sw. (= *C. helioscopiae* Syd.) (叶斑病) 四川(33, 150, 215), 河南(13).
Melampsora euphorbiae (Schr.) Cast. (锈病) “西康”(57), 广西(245).
M. euphorbiae-dulcis Otth. (锈病) 陕西(7), 安徽(245), 江苏(32, 36), 浙江(64).
Uromyces striolatus Tranzsch. (锈病) “西康”(340).
- Euphorbia longana** Lam. (龙眼, 桂圆)
Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).
Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).
- Eurya japonica** Thunb. (柃木)
Colletotrichum euryae Saw. (炭疽病) 台湾(360).
- Evodia meliaefolia** Benth. (辣树)
Cercospora evodiae H. et P. Syd. (叶斑病) 台湾(350).
Coleosporium evodiae Diet. (锈病) 贵州(245), 广东(274), 台湾(277, 289, 368).
- E. officinalis** Dode (吴茱萸)
Coleosporium evodiae Diet. (锈病) 四川(150, 214), 安徽(245).
- E. rutaecarpa** Benth. (吴茱萸, 辣子)
Coleosporium evodiae Diet. (锈病) 湖南(214).
- E. sp.** (吴茱萸属)
Coleosporium evodiae Diet. (锈病) 四川(150, 214), 贵州(245), 湖南(32, 36), 安徽(245), 广东(32, 36), 广西(245).

Evonymus alata Regel (卫茅)*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(165).**E. europaea** L. var. **hamiltoniana** Max. (桃叶卫茅)*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(165).**E. japonicus** Thunb. (杜木, 大叶黄楊)*Cercospora destructiva* Rav. (叶斑病) 四川(150), 湖南(32), 山东(374), 江苏(29, 32).*Cylindrosporium frigidum* (Sacc.) Vassil 山东(374).*Fusicladium evonymi-japonici* Hori —(55).*Oidium evonymi-japonici* (Arc.) Sacc. (白粉病) 四川(150).**E. venosa** Hemsl.*Phoma subnervisequa* Desm. 陝西(237).**E. sp.** (杜木属)*Cercospora evonymi* Erikss. (叶斑病) 河北(317), 河南(13).*Macrophoma cylindrospora* (Desm.) Berl. et Vogl. 河南(13).*Phyllosticta bolleana* Sacc. 陝西(237).**Fagopyrum tataricum** Gaertn. (苦荞麦)*Macrophoma fagopyri* Saw. 台湾(360).**F. vulgare** Hill. (荞麦)*Alternaria tenuis* Nees “西康”(57), 河南(13).*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 四川(150), 台湾(350).*Cercospora fagopyri* Nakata et Takimoto (叶斑病) 内蒙(373), “热河”(294), “西康”(57), 四川(221), 湖南(112), 河南(13, 215).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(209), “西康”(57), 云南(111, 112, 212), 江苏(106, 128), 福建(10), 台湾(350).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers 四川(150).*Phyllosticta fagopyri* Miura 吉林(294, 313).*Phyllosticta polygonorum* Sacc. 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 四川(75).*Puccinia fagopyri* Barcl. (锈病) 河南(13), 江苏(106), 浙江(32, 36, 205), 福建(32, 36).*Ramularia rufomaculans* Peck 江苏(106).*Pseudomonas* sp. 云南(111).

Festuca elatior L. (羊茅)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (叶锈病) 新疆(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88)**F. extremiorientalis** Ohwi (远东羊茅)*Puccinia festucae* (DC.) Plowr. (锈病) 黑龙江(273), “东北”(290).**F. ovina** L. (羊孤草, 绵羊孤茅)*Puccinia festucae-ovinae* Tai (锈病) 云南(214).**F. sp.** (羊茅属)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).*Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. 新疆(88).*P. graminis* Pers. (稈锈病) 新疆(88).**Ficus beecheyana** Hook et Arn.*Guignardia fici-beecheyanae* Saw. 台湾(360).*Meliola microtricha* Syd. (煤病) 台湾(380).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Phyllachora fici-beecheyanae* Saw. (黑痣病) 台湾(360).**F. bengalensis***Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Triposporiopsis spinigera* (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**F. carica** L. (无花果)*Botrytis depradens* Cke. (灰霉病) 江苏(47).*Cercospora fici* Heald et Wolf (叶斑病) 台湾(351).*Colletotrichum caricae* Stev. et Hall. (炭疽病) 云南(212), 江苏(128), 台湾(351).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*C. salmonicolor* Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).*Glomerella cingulata* (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 福建(10).*Phakopsora fici-erectae* Ito et Otani (锈病) 广东(112, 233, 344), 台湾(278), “华南”(342), ——(231).

Ficus carica L. (无花果)

Phytophthora carica (Hara) Hori (疫病) 台湾(287,350).

Tubercularia fici Edg. 河南(13).

Uredo sawadae Ito (锈病) 台湾(290).

花叶病(Mosaic) 江苏(127), 广东(82).

F. elastica Roxb. (橡皮树, 印度橡皮树, 印度橡胶树)

Colletotrichum elasticae Tassi (炭疽病) 台湾(359).

F. formosana Max.

Phakopsora fici-erectae Ito et Otani (炭疽病) 台湾(278).

Physalospora fici-formosanae Saw. 台湾(360).

F. formosana Max. f. shimadai Hay.

Meliola microtricha Syd. (煤病) 台湾(380).

F. foveolata Wall. (珍珠莲, 木莲菖)

Chaetothyrium dictyosporum Petr. 广西(340).

F. foveolata Wall. var. arisanensis Kudo

Meliola sakahensis Yamam. (煤病) 台湾(381).

F. harlandi Benth. (哈氏榕)

Cercospora fici-harlandii Saw. (叶斑病) 台湾(358).

F. heteromorpha Hemsl. (异叶天仙果)

Phakopsora nishidana Ito (锈病) 湖南(214).

F. hirta Vahl. (牛奶子)

Septoria pirottae Tassi (斑枯病) 云南(306).

F. martini Levl.

Phakopsora nishidana Ito (斑枯病) 湖南(214).

F. nervosa Heyne (九丁树)

Montagnellina fici Saw. 台湾(360).

Uredo sawadae Ito (锈病) 台湾(290,360).

F. retusa Linn. (榕树)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn). Yamam. (煤病) 台湾
(387).

F. septica Burm. f.

Cercospora cladophora Saw. (叶斑病) 台湾(360).

C. fici-septicae Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Gloeosporium fici-septicae Saw. (炭疽病) 台湾(360).

Guignardia fici-septicae Saw. 台湾(360).

Ficus septica Burm f.

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phyllachora fici-septicae Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

F. variolosa Wall.

Phyllachora fici-variolosae Petr. (黑痣病) 广东(340).

F. vasculosa Wall. (白肉榕)

Phakopsora fici-erectae Ito et Otani (锈病) 台湾(278).

F. wightiana Wall. (山榕, 雀榕)

Mycosphaerella fici-wightianae Saw. 台湾(358).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phyllachora fici-wightianae Saw. (黑痣病) 台湾(350).

Phyllosticta cylindrospora Saw. 台湾(360).

P. fici-wightianae Saw. 台湾(360).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

F. sp. (榕属)

Irenina cheoi Hansf. (煤病) 贵州(254).

Irenopsis benguetensis Stev. et Rold. (煤病) 广西(254).

Meliola microtricha Syd. (煤病) 台湾(387).

Phakopsora fici-erectae Ito et Otani (锈病) 江西(245).

Trabutia chinense Yates (黑痣病) 浙江(231), 广东(389).

T. elmeri Theiss. et Syd. (黑痣病) 广东(32, 187).

Filipendula angustiloba Max. (狭裂合叶子)

Triphragmium ulmariae (Schw.) Link (锈病) 台湾(290).

F. kiraishiensis Hay.

Triphragmium ulmariae (Schw.) Link (锈病) 台湾(290).

F. nuda Grubav.

Triphragmium ulmariae (Schw.) Link. (锈病) 黑龙江(115), 吉林(115), 辽宁(115).

Filipendula palmata (Pall.) Max. (合叶子)*Guignardia ulmariae* (Thuem.) Miura “东北”(313).*Triphragmium ulmariae* (Schw.) Link (锈病) 黑龙江 (115, 272, 313), 吉林(115), 辽宁(115), “东北”(290).**Firmiana simplex** Wight (梧桐)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 四川 (150, 208).*Uncinula clintonii* Peck (白粉病) “西康”(57), 贵州(213), 安徽(219), 江苏(219), 浙江(219), 广西(208).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**Flueggea capillipes** Pax. (金柑藤)*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).**F. microcarpa** Blume (金柑藤)*Phakopsora cingens* (Syd.) Hirat. f. (锈病) 台湾 (266, 280, 289).**F. sp.** (白饭树属)*Phakopsora cingens* (Syd.) Hirat. f. (锈病) 广东(274).**Foeniculum officinale** Allesch. (怀香)*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).**F. vulgare** Gaertn. (茴香)*Fusicladium depressum* (Berk. et Br.) Sacc. 黑龙江(294), “热河”(294).**Forsythia sp.** (连翘属)*Phyllosticta forsythiae* Sacc. 河南(13).**Fortunearia sinensis** Rehd. et Wils. (牛鼻栓)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(208).**Fortunella crassifolia** Sw. (金相, 金弹)*Capnodium citri* Berk. et Desm. (煤病) 广西(163).*Diplodia natalensis* Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) 广西(163).*Phoma citricarpa* McAlp. (黑点病) 广西(163).*Sphaceloma fawcetti* Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.) (瘡痂病) 广西(163).*Pseudomonas cyringae* van Hall 广西(163).**F. crassifolia** Sw. (金相, 金弹)*Xanthomonas citri* (Hasse) Dowson (潰瘍病) 广西(163).

黄龙病 (Decline) 广西(163).

胶肿病 (Gummosis) 广西(163).

Fortunella margarita (Lour.) Sw. (金橘, 罗浮)*Penicillium italicum* Wehmer (青霉病) 广西(163).**F. obovata** Tanaka (朋橘, 寿橘)*Sphaceloma fawcetti* Jenk. (*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)

(瘡痂病) 福建(113)

F. sp. (金橘属)*Diplodia natalensis* Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 广西(163).*Tylenchulus semipenetrans* Cobb (綫虫病) 广东(98).

紋斑病, 主要缺 Zn 广西(163).

Fragaria chiloensis Duch. (智利草莓)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 四川(91).*Fusarium oxysporum* Schlecht. (萎蔫病) ——(135).*Marssonina potentillae* (Desm.) Fisch. (褐斑病) 河北(116).*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau 辽宁(313), 江苏(106), 浙江(49), “华东”(341), 福建(121).*Phyllosticta fragaricola* Desm. et Rab. (叶斑病) “东北”(371), 山东(14).**F. chiloensis** Duch. var. **ananassa** Bail. (草莓)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 江苏(128).*Marssonina potentillae* (Desm.) Fisch. (褐斑病) 台湾(350).*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau 黑龙江(294), 辽宁(294), 江苏(128), 福建(10).*Phyllosticta fragaricola* Desm. et Rab. 辽宁(294).*P. grandimaculans* Bubak et Krieg. 山东(374), 台湾(358).*Rhizopus nigricans* Ehrb. (軟腐病) 江苏(128), 福建(10).**F. moschata** Duch.*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau 浙江(49), “华南”(342).**F. sp.** (草莓属)*Dendrophoma obscurana* (Ell. et Ev.) Anders. 湖南(112).*Marssonina potentillae* (Desm.) Fisch. (褐斑病) 河南(13).*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau 辽宁(313), “西康”(57), 四川(194), 河南(13), 广东(141).*Phyllosticta fragaricola* Desm. et Rab. (叶斑病) 河南(13).*Pucciniastrum potentillae* Kom. (銹病) 安徽(245), 江西(245).

Fraxinus bungeana DC. (小叶白蜡)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

F. chinensis Roxb. (白蜡树, 梣, 小叶梣)

Aecidium fraxini-bungeanae Diet. (锈病) 四川(75, 150, 214), 贵州(340).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) “西康”(57), 四川(150), 江苏(208), 浙江(208).

Uncinula fraxini Miyabe (白粉病) 四川(150, 226), 广西(208).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

F. chinensis Roxb. var. **rhynchophylla** Hemsl. (大叶梣)

Aecidium fraxini-bungeanae Diet. (锈病) 四川(214), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 64), 江西(32, 36).

Coniothyrium fraxini Miura 吉林(313), 辽宁(313).

Uncinula salmoni Syd. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313).

Uropyxis fraxini (Kom.) Magn. 吉林(313), “东北”(290, 295), 江苏(369).

F. mandshurica Rupr. (满洲白蜡树)

Uncinula salmoni Syd. (白粉病) “东北”(282).

F. retusa Champ. (苦槠树)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).

F. sp. (梣属)

Aecidium fraxini-bungeanae Diet. (锈病) 广西(246).

Phyllosticta fraxini Ell. et Mart. 河北(317).

Uncinula fraxini Miyabe (白粉病) “热河”(317), 河北(317).

U. salmoni Syd. (白粉病) 江苏(47).

Fritillaria dagana Turcz.

Puccinia hsinganensis Miura (锈病) 黑龙江(313).

F. maximowiczii Freyn.

Uromyces lilii (Link) Fuck. (锈病) “东北”(290).

F. sp. (贝母属)

Uromyces lilii (Link) Fuck. (锈病) 黑龙江(313).

Gaillardia pulchella Foug (天人菊)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Galeopsis tetrahit L.

Peronospora lamii Al. Br. (霜霉病) 台湾(287).

Galium aparine L. (豬殃殃)

Peronospora aparines (de Bary) Gaum. (霜霉病) 四川
(150), 江苏(220), 台湾(287).

Puccinia punctata Link (銹病) 四川(150).

P. punctiformis Barcl. et Diet. (銹病) 貴州(245).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川
(150).

G. aparine L. var. spurium Koch. (豬殃殃)

Peronospora aparines (de Bary) Gaum. (霜霉病) 台湾
(287).

G. asperifolium Wall. (豬殃殃)

Puccinia punctiformis Barcl. et Diet. (銹病) 云南(214).

G. verum L.

Puccinia punctata Link (銹病) 黑龙江(272), 辽宁(313),
“东北”(272), 山东(66).

Thekopsora guttata (Schroet.) Syd. (銹病) 黑龙江(272).

G. sp. (豬殃殃屬)

Puccinia punctata Link (銹病) “西康”(57), 云南(214).

Garcinia spicata Hook (福樹)

Phoma garciniae Saw. 台湾(360).

Gardenia angusta (L.) Merr. (梔子)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

G. angustifolia

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾
(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾
(387).

G. jasminoides Ell. (黃梔子)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Zukaliopsis gardeniae Saw. 台湾(355).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

G. jasminoides Ell. var. grandiflora Hort. (梔子花)

Hemileia gardeniae-floridiae Saw. (銹病) 台湾(290).

Phyllosticta gardeniicola Saw. 台湾(358).

Gardenia jasminoides Ell. var. **ovalifolia** (Curt.) Hort.*Pestalozzia theae* Saw. (輪斑病) 台灣(358).*Scorias cylindrica* Yamam. (煤病) 台灣(386).**Gelonium aequouereum** Hance (餅樹)*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台灣(387).**Gentiana macrophylla** Pall. (秦艽)*Puccinia gentianae* Mart. (銹病) 黑龍江(313), “東北”(290).*Septoria gentianae* Thuem. (斑枯病) 河北(340).**G. rigescens** Franch. (黑龍胆)*Cronartium gentianeum* Thuem. (銹病) 雲南(214).**G. scabra** Bge. (龍胆)*Septoria gentianae* Thuem. (斑枯病) 遼寧(313).*S. microspora* Speg. (斑枯病) 遼寧(313).**G. veitchiorum** Hemsl.*Puccinia gentianae* Mart. (銹病) 四川(298).**G. wutaiensis** Marquand*Puccinia gentianae* Mart. (銹病) 山西(340).**G. yunnanensis** Franch. (滇龍胆)*Cronartium gentianeum* Thuem. (銹病) 雲南(332).**G. sp.** (龍胆屬)*Mycosphaerella gentianae* (Niessl.) Lindau (= *Sphaerella gentianae* Niessl.) 雲南(333).*Phyllosticta gentianaecola* (DC.) Pat. 雲南(333).*Puccinia gentianae* Mart. (銹病) 陝西(237), 雲南(333).**Geranium nepalense** Sweet (牻牛兒苗)*Coleroa circinans* (Fr.) Wint. 西藏(332).*Septoria expansa* Niessl. (斑枯病) 黑龍江(313).*Uromyces geranii* (DC.) Lev. (銹病) 吉林(313), 雲南(214).**G. pratense** L.*Venturia geranii* (Fr.) Wint. 陝西(237).**G. sibiricum** L. (牻牛兒苗)*Uromyces geranii* (DC.) Lev. (銹病) 黑龍江(272), “東北”(272, 290), 河北(218).**G. strigosum** Fr. (伏毛龍胆)*Coleosporium geranii* Pat. (銹病) 雲南(214),

Geranium sp. (老鹳草属)*Coleosporium geranii* Pat. (锈病) “西康”(57), 云南(336).*Coleroa circinans* (Fr.) Wint. 浙江(22, 32), 河南(13).*Uromyces geranii* (DC.) Lev. (锈病) 河北(316), 新疆(67), 安徽(246), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 63), 江西(246).**Gilibertia** sp.*Meliola leptoclada* Syd. (煤病) 台湾(387).**Ginkgo biloba** L. (银杏)*Macrophomina phaseoli* (Maubl.) Ashby (茎腐病) 四川(19).*Pestalozzia ginkgo* Hori (= *P. sinensis* Shen) (轮斑病) 四川(150), 江苏(102).*Phyllosticta ginkgo* Brun. 山东(374).**Girardinia** sp. (蝎子草属)*Aecidium girardiniae* Syd. (锈病) 广西(246).**Gladiolus gandavensis** van Houtt. (唐菖蒲)*Fusarium moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) (枯萎病) ——(135).*F. oxysporum* Schlecht. var. *gladioli* Mass. ——(135).**G. gandavensis** van Houtt. (唐菖蒲)*Fusarium scirpi* Lamb. et Fautr. ——(135).*Pseudomonas gladioli* Severini 河北(138), 江苏(138).**Glechoma hederacea** L. (连钱草)*Puccinia glechomatis* DC. (锈病) 辽宁(313), 安徽(231), 江苏(220), 台湾(290, 356).**G. hederacea** L. var. *longituba* Nakai (连钱草)*Puccinia glechomatis* DC. (锈病) 黑龙江(272).**G. sp.** (活血丹属)*Puccinia glechomatis* DC. (锈病) 广西(246).**Gleditschia sinensis** Lam. (皂荚)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**Glehnia littoralis** (Fr. Schm.) Miq. (珊瑚菜)*Puccinia phellopteri* Syd. (锈病) 河北(275).**Glyceria acutiflora** Torr. (甜茅)*Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化萎缩病) 台湾(287).

Glyceria sp. (甜茅屬)

Puccinia coronata Corda (銹病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36).

Glycine max (L.) Merr. (大豆)

Alternaria atrans Gibson (黑斑病) 江苏(69).

A. tenuis Nees (黑斑病) 河北(374), 山东(374).

Ascochyta sojae Miura (褐斑病) 吉林(294, 313), “西康”(57), 四川(150), 江苏(128).

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 河北(116).

C. kikuchii Matsumoto et Tomoyasu (紫斑病) 黑龙江(166a, 294), 吉林(166a, 294), 辽宁(294), “西康”(57), 四川(150), ——(69).

C. sojae Hara (灰斑病) 黑龙江(60, 294, 313), 吉林(294), 辽宁(294, 313), “热河”(294, 345), 河北(51, 116), “西康”(57), 四川(150), 云南(212, 215), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51, 124), 福建(10).

Colletotrichum glycines Hori (*Glomerella glycines* (Hori) Lehman et Wolf) (炭疽病) 黑龙江(166a), 吉林(166a, 294), 河北(116), “西康”(57), 四川(75, 150), 云南(212), 湖南(112), 河南(13), 江苏(69, 128), 福建(10), 台湾(356).

C. lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 广西(178).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 四川(150), 貴州(174), 台湾(350).

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. var. *tracheiphilum* (Smith) Wr. -(枯萎病) 四川(150), ——(135).

F. javanicum Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr. 河南(13), ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) Wr. 四川(150).

Macrophoma mame Hara (莢枯病) 吉林(166a), 辽宁(294), 四川(69, 150), 江苏(69).

Mycosphaerella sojae Hori (褐斑病) 黑龙江(166a, 294), 吉林(166a, 294), 辽宁(294), “东北”(255), 四川(69, 150), 河南(13), 山东(51).

Glycine max (L.) Merr. (大豆)

Ophionectria sojae Hara 四川(150).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 黑龙江(166a), 吉林(166a), 四川(150), ——(69).

P. sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Peronospora manschurica (Naum.) Syd. (霜霉病) 黑龙江(60, 166a, 294, 313), 吉林(43a, 166a, 294, 313), 辽宁(43a; 294), “东北”(287), “热河”(294, 345), 河北(173, 220, 321), 山西(321), “西康”(57), 四川(75, 150, 194), 云南(212), 贵州(174), 江苏(51, 201, 220), 浙江(49, 220), 台湾(287, 351).

P. trifoliorum de Bary (霜霉病) 河北(342).

P. viciae de Bary (霜霉病) “华南”(166, 197).

Phakopsora pachyrhizi Syd. (锈病) 吉林(294, 313), “东北”(272), 河北(116), 四川(150), 云南(212), 贵州(174, 245), 湖南(214), 安徽(245), 江苏(128), 江西(245), 福建(10, 121), 台湾(264), “华南”(342).

Phomopsis sojae Lehman (*Diaporthe sojae* Lehman) (黑点病) 黑龙江(166a), 吉林(166a), “西康”(57), 四川(69, 150), 云南(212), 江苏(69).

Phyllosticta phaseolina Sacc. 四川(75).

P. sojaecola Massal. (*Pleosphaerulina sojaecola* (Massal.) Miura) (灰星病) 黑龙江(166a, 294), 吉林(166a, 294, 313), 辽宁(294, 313), “热河”(294, 345), “西康”(57), 四川(69, 75, 150), 河南(13), 江苏(69).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 黑龙江(166a), 吉林(166a, 294, 313), “西康”(57), 四川(150), 江苏(128), 台湾(359).

Septoria glycines Hemmi (褐纹病) 黑龙江(166a, 294), 吉林(166a, 294, 313), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294, 345), 河北(116, 373), 云南(112, 212), 河南(13), 江苏(128), 福建(10).

Septoria sojae Thuem. (斑枯病) 江苏(231).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(209, 116).

Uromyces mucunea Rabh. (锈病) 吉林(294), “西康”(57).

Glycine max (L.) Merr. (大豆)

Pseudomonas glycinea Coerper (細菌性斑点病) 黑龙江(138,166a),吉林(138,166a),辽宁(138),河北(138),山西(138),陕西(138),四川(138),云南(138),湖北(138),湖南(138),河南(13,138),山东(138),江苏(138).

P. glycinea Coerper var. *japonica* (Takimoto) Bergey et al. 黑龙江(138,294),吉林(138,294),辽宁(138,294),“热河”(294,345),河北(138),山西(138),陕西(138),“西康”(57),四川(75,138),云南(138),湖南(138),河南(13,138),山东(138),安徽(138),浙江(138).

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson var. *sojense* (Hedges) Starr. et Burkh. (細菌性疫病) 黑龙江(166a,294),吉林(166a,294),辽宁(294),热河(345),河北(51,321),山西(319,321),湖南(112),河南(13),山东(51,321),安徽(51),江苏(51),广东(112),“各地”(138).

Soja virus 1 (花叶病) 河北(185),“西康”(57).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294),河北(321),河南(13),山东(127),安徽(127),江苏(127,128),“华东”(341),“各地”(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 黑龙江(166a,294),吉林(294),辽宁(294),“热河”(345).

Cuscuta chinensis Lamb. (菟絲子) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294),“热河”(294,345),河南(13).

G. ussuriensis Regel et Maack. (野大豆,蔓豆)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150,226).

Peronospora manschurica (Naum.) Syd. (霜霉病) 吉林(43a),辽宁(43a),“东北”(287),台湾(287).

Phakopsora pachyrhizi Syd. (锈病) 陕西(7).

G. sp. (大豆属)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(211).

Phakopsora pachyrhizi Syd. (锈病) 陕西(7),安徽(245),广西(245).

Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa (酒餅叶)

Leptothyrium glycosmidis Keissler 云南(305).

Glycyrrhiza aspera

Puccinia glycyrrhizae Tai (锈病) 甘肃(214).

G. echinata L. (刺甘草)

Uromyces glycyrrhizae (Rabh.) Magn. (锈病) 辽宁(313).

Glycyrrhiza glabra L. (甘草, 洋甘草, 汾草)

Uromyces glycyrrhizae (Rabh.) Magn. (锈病) “东北”(290), “热河”(294).

G. uralensis Fisch. (甘草)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Uromyces glycyrrhizae (Rabh.) Magn. (锈病) 河北(64), 山西(275, 340), 新疆(88).

Gnaphalium formosanum Hay.

Miyagia macrospora Hirat. 台湾(290).

G. indicum L. (狭叶鼠麴草)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Septoria gnaphalii-indici Saw. (斑枯病) 台湾(359).

G. japonicum Thunb. (细叶鼠麴草)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

G. luteo-album L. (黄白鼠麴草)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

G. luteo-album L. var. *multiceps* Hook f.

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) 台湾(359).

G. multiceps Wall. (鼠麴草)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Gomphrena globosa L. (千日红)

Cercospora gomphrenae Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Gordonia anomala Spreng. (大头茶)

Helicobasidium cinereum Saw. (紫羽纹病) 台湾(350).

G. axillaris Ditr.

Phyllosticta gordoniicola Saw. 台湾(358).

Gossypium arboreum L. (树棉)

Alternaria macrospora Zimm. (黑斑病) 四川(150).

A. tenuis Nees (黑斑病) 四川(150).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(91).

Gossypium arboreum L. (树棉)

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Atk.) Earle) (叶斑病) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

Colletotrichum gossypii South. (*Glomerella gossypii* (South.) Edg.) (炭疽病) 四川(150), 湖南(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

C. indicum Dastur. (印度炭疽病) 四川(150).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 四川(150).

Diplodia gossypina Cke. (*Physalospora gossypina* Stev.) 河北(105), 四川(150), 湖北(105), 湖南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

Fusarium moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) (红腐病) 四川(150).

F. vasinfectum Atk. (枯萎病) 四川(150).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 四川(150), 湖南(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

Phyllosticta malkoffii Bubak 湖北(105).

Ramularia areola Atk. (*Mycosphaerella areola* (Atk.) Ehrlich et Wolf) 四川(150), 江苏(105), 浙江(105), 广西(37).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(150).

Verticillium albo-atrum Reinke et Berth. (黄萎病) 辽宁(40), 河北(40), 陕西(40).

Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson (角斑病) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

缩叶病 (Cyrtosis) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

叶切病 (Tomosis) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

G. barbadense L. (海島棉, 光籽棉)

Alternaria tenuis Nees (黑斑病) 云南(212).

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Cke.) Earle) (叶斑病) 云南(215), 广东(112, 196a).

Gossypium barbadense L. (海島棉, 光籽棉)

Colletotrichum gossypii South. (*Glomerella gossypii* (South.) Edg.) (炭疽病) 广东(196a).

Phakopsora gossypii (Arthur) Hirat. f. (锈病) 云南(212, 214).

Phyllosticta gossypina Ell. et Mart. (叶斑病) 广东(196a).

Verticillium dahliae Kleb. (黄萎病) 云南(117, 212).

Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson (角斑病) 云南(212), 广东(196a), 广西(37), “各地”(138).

G. herbaceum L. (草棉, 陆地棉, 美棉)

Alternaria gossypina (Thuem.) Hopkins (黑斑病) 山东(322), 江苏(322).

A. macrospora Zimm. (黑斑病) 辽宁(294), “热河”(294), “西康”(57), 山东(322), 江苏(322).

A. tenuis Nees (黑斑病) 云南(212), 江苏(128).

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Cke.) Earle) (叶斑病) “热河”(315), “西康”(57), 四川(221), 云南(112, 212), 湖北(315), 湖南(113), 江苏(128), 台湾(315).

Colletotrichum gossypii South. (*Glomerella gossypii* (South.) Edg.) (炭疽病) 辽宁(294), 河北(166), 云南(212), 贵州(196), 湖南(112), 安徽(47), 江苏(128), 福建(10), 广西(112).

C. indicum Dastur. (印度炭疽病) 辽宁(294), “东北”(293), 江苏(71).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).

Diplodia gossypina Cke. (*Physalospora gossypina* Stev.) (黑果病) “西康”(57), 云南(212), 山东(71), 江苏(71, 128).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) “西康”(57), 四川(221).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) (红腐病) “华北”(323), 贵州(196), “华中”(323).

F. scirpi Lamb. et Fautr. “华北”(323), “华中”(323).

F. vasinfectum Atk. (枯萎病) 辽宁(175), “华北”(323), “华中”(323).

Gossypium herbaceum L. (草棉, 陆地棉, 美棉)

Macrosporium nigricans Atk. (黑斑病) “热河”(317), “西康”(57).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 辽宁(294), 江苏(128), 福建(10).

Pestalozzia gossypii Hori (輪斑病) 云南(212), 湖南(112), 福建(10).

Phakopsora gossypii (Arthur) Hirat. f. (锈病) 台湾(278, 289).

Phyllosticta gossypina Ell. et Mart. (叶斑病) 辽宁(294), 云南(112), 湖南(112).

Ramularia areola Atk. (*Mycosphaerella areola* (Atk.) Ehrlich et Wolf) (白霉病) 四川(221), 云南(212), 贵州(196), 福建(10), 台湾(359).

Thyrsospora gossipicola Nishikado 山东(322), 江苏(322).

Trichothecium roseum (Bull.) Link. 辽宁(294).

Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson (角斑病) 辽宁(294), “热河”(294), 河北(116), 云南(212), 湖南(112), 江苏(128).

縮叶病 (Cyrstosis) 貴州(196), 江苏(128).

叶切病 (Tomosis) 江苏(128).

G. hirsutum L. (陆地棉, 墨西哥棉)

Alternaria macrospora Zimm. (黑斑病) 辽宁(294), “热河”(294), 四川(150).

A. tenuis Nees (黑斑病) 四川(150).

Ascochyta gossypii Syd. (褐斑病)

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Cke.) Earle) (叶斑病) 辽宁(294), 河北(105), 四川(150), 云南(215), 湖北(105), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(29, 32, 105), 浙江(105), 江西(105), 广西(32).

Colletotrichum gossypii South. (*Glomerella gossypii* (South.) Edg.) (炭疽病) 辽宁(294), 河北(105), 四川(105, 150), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(29, 32, 105, 201), 浙江(105), 江西(105), 广西(32, 37, 105).

C. indicum Dastur. (印度炭疽病) 辽宁(294).

Gossypium hirsutum L. (陆地棉, 墨西哥棉)

- Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. (立枯病) 四川(150).
Diplodia gossypina Cke. (*Physalospora gossypina* Stev.) (黑果病) 河北(105), 四川(150), 湖北(105), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).
Fusarium anguioides Sherb. ——(135).
F. coeruleum (Lib.) Sacc. ——(135).
F. concolor Reink. ——(135).
F. solani (Mart.) App. et Wr. ——(135).
F. vasinfectum Atk. f. 1 Wr. (枯萎病) ——(135).
Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150).
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 辽宁(294), 四川(150), 湖北(105), 湖南(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).
Pestalozzia gossypii Hori (輪紋病) 江苏(102).
Phyllosticta gossypina Ell. et Mart. (叶斑病) 辽宁(294), “热河”(294), 四川(150).
P. malkoffii Bubak (叶斑病) 河北(105), 湖北(105), 河南(105), 山东(105).
Pythium deBaryanum Hesse (猝倒病) “西康”(57).
Ramularia areola Atk. (*Mycosphaerella areola* (Atk.) Ehrlich et Wolf) (粉霉病) 四川(150), 江苏(29, 32, 105), 广西(32, 37).
Trichothecium roseum (Bull.) Link 辽宁(294), 四川(150).
Verticillium albo-atrum Reinke et Berth. (黄萎病) 辽宁(40), 河北(40), 山西(40), 陕西(40), 山东(40).
V. dahliae Kleb. (黄萎病) 云南(117).
Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson (角斑病) 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(105), “西康”(57), 湖北(105), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105), 广西(37), “各地”(138).
 縮叶病 (Cyrstosis) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105), 广西(105).

Gossypium hirsutum L. (陆地棉, 墨西哥棉)

叶切病 (Tomosis) 河北(105), 湖北(105), 湖南(105), 河南(105), 山东(105), 安徽(105), 江苏(105), 浙江(105), 江西(105).

G. nanking Meyen. (鸡脚棉)

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Cke.) Earle) (叶斑病) 江苏(32), 广西(32).

G. sp. (棉属)

Alternaria gossypina (Thuem.) Hopkins (黑斑病) 山西(319), 河南(374), 山东(374).

A. macrospora Zimm. (黑斑病) “热河”(345), 河北(168, 321, 374), 四川(75, 179), 河南(374), 山东(321, 374), 安徽(374).

A. tenuis Nees (黑斑病) 四川(75, 179).

Aspergillus fumigatus Fres. 江苏(105).

A. niger van Tiegh. 新疆(88), 河北(105).

Cercospora gossypina Cke. (*Mycosphaerella gossypina* (Cke.) Earle) (叶斑病) 辽宁(294), 河北(321), 新疆(88), 四川(75, 179), 贵州(174), 河南(13), 山东(51, 321), 江苏(51), 广东(199), 广西(37), “华南”(342).

Choanephora cucurbitarum (B. et R.) Thaxter (花腐病) 江苏(71).

Colletotrichum gossypii South. (*Glomerella gossypii* (South.) Edg.) (炭疽病) 内蒙(58), 河北(321, 374), 陕西(105, 167), “西康”(57), 四川(73, 75, 179), 河南(13), 山东(71, 101, 321), 江苏(71, 106), 浙江(71), “华东”(341), 广西(105), 台湾(350).

C. indicum Dastur. (印度炭疽病) 河北(302), 山西(320, 319), 四川(179).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 河北(105), 四川(179), 湖南(105), 江苏(105), 江西(105).

Diplodia gossypina Edg. (*Physalospora gossypina* Stev.) (黑穗病) 河北(105), 陕西(105), 四川(179), 湖北(105), 河南(105), 安徽(105), 江苏(29, 32).

Fusarium moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) (红腐病) 贵州(174).

Gossypium sp. (棉属)

F. vasinfectum Atk. (枯萎病) “东北”(294), 新疆(88), 四川(75, 179), 河南(13), 江苏(105, 106).

F. vasinfectum Atk. f. 1 Wr. (枯萎病) 新疆(88).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).

Macrosporium nigricans Atk. (黑斑病) “东北”(294), 河北(51), 贵州(174), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 辽宁(294), 河北(105), 新疆(88), 四川(73, 75, 179), 河南(105), 山东(101, 105), 江苏(32), 广西(105).

Pestalozzia gossypii Hori (輪紋病) 四川(75), 浙江(49).

Phyllosticta gossypina Ell. et Mart. (叶斑病) “热河”(345), 河北(321), 四川(179), 河南(13), 山东(321, 374).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 江苏(105), 江西(105).

Ramularia areola Atk. (*Mycosphaerella areola* (Atk.) Ehrlich et Wolf) (粉霉病) 河北(321), 四川(179).

Rhizopus nigricans Ehrb. 河北(374), “华南”(342).

Septocylindrium areola (Atk.) P. et C. (粉霉病) 河南(13).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 辽宁(294), 河北(105), 山西(319), 新疆(88), 四川(179), 河南(13), 江苏(105), 江西(105).

Verticillium dahliae Kleb. (黄萎病) 辽宁(175), 新疆(88).

Xanthomonas malvacearum (Smith) Dowson (角斑病) 内蒙(58), “热河”(345), 河北(51, 321), 山西(319), 陕西(105), 新疆(88a), 四川(73, 75, 179), 河南(13), 山东(51, 321), 安徽(51), 江苏(51), 浙江(49), 广西(105, 178).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

缺 K 内蒙(58).

芽切病 (Ablasty) 河北(51), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).

縮叶病 (Cyrtosis) 四川(179), 河南(13), “华东”(341).

叶切病 (Tomosis) 四川(179), 贵州(105), 河南(13).

Guettarda speciosa L. (格他木)

Uredo guettardae Hirat. et Hashioka (锈病) 台湾(278, 290).

Gypsophila oldhamiana Miq. (絲石竹, 欧氏絲石竹, 細花瞿麦)

Puccinia gypsophilae Liou et Wang (锈病) 山东(66).

Halenia sibirica Borkh.

Puccinia haleniae Arthur et Holw. (锈病) 黑龙江(313), 山西(340).

Hamamelia mollis Oliv. (金縷梅)

Aecidium hamamelidis Diet. (锈病) 浙江(8).

Hedera sinensis Tobl. (常春藤)

Phyllosticta hederacea Allesch. (叶斑病) 四川(150).

Helianthus annuus L. (向日葵)

Alternaria tenuis Nees (黑斑病) 四川(75).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Cercospora pachypus Ell. et Kell. (叶斑病) 辽宁(294), “华北”(261), “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 四川(91), 台湾(350).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) “西康”(57), 四川(194), 云南(111, 112, 212), 湖北(47), 湖南(112), 安徽(47), 江苏(106), 浙江(47, 49), “华东”(341), 广西(112).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).

Puccinia helianthi Schw. (锈病) 黑龙江(60, 272, 313), 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), “东北”(272), 河北(62, 66, 116, 166, 197, 315, 373, 374), 山西(319), 新疆(67, 88), “西康”(57), 四川(150, 194), 云南(111, 212), 湖南(112), 河南(13), 山东(66, 231, 315, 374), 江苏(32, 36, 47, 106, 128, 201), “华东”(341).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江西(158), 台湾(350).

Septoria helianthi Ell. et Kell. (斑枯病) 黑龙江(294), 吉林(294), “东北”(346).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(294), 四川(75, 150), 河南(13), 山东(374), 江苏(128, 208, 219), 江西(219).

Helianthus annuus L. (向日葵)

Pseudomonas helianthi (Kawamura) Savulescu 黑龙江
(294), 吉林(294), 辽宁(138), 河北(138), 湖北(138), 河南
(138), 山东(138), 江苏(138).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294).

H. debillis Nutt. (小向日葵)

Puccinia helianthi Schw. (锈病) 安徽(374).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 安徽
(374).

H. tuberosus L. (菊薯, 菊芋)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).

Puccinia helianthi Schw. (锈病) 安徽(246).

H. sp. (向日葵属)

Cercospora helianthi Ell. et Ev. (叶斑病) “华北”(258).

Puccinia helianthi Schw. (锈病) 河南(13).

Helichrysum bracteatum Willd. (蜡菊, 麦秆菊)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾
(350).

Helicia formosana Hemsl. (山龙眼)

Meliola heliciae Yaman. (煤病) 台湾(383).

Heliotropium indicum L. (大尾摇)

Oidium heliotropii-indici Saw. (白粉病) 台湾(356).

Hemarthria sp. (牛鞭草属)

Puccinia cacao McAlp. (锈病) 广西(247).

Hemerocallis aurantiaca Baker (橙花萱草)

Colletotrichum liliacearum Ferr. (炭疽病) 山东(374).

H. citrina Baroni (黄花, 金针菜)

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 河北(63), 山东
(64, 66).

H. disticha Donn

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 台湾(290).

H. disticha Donn var. kwanso Nakai

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 台湾(290, 359).

H. dumortieri Mors.

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 河北(171).

H. flava L.

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 四川(194).

Hemerocallis fulva L. (萱草, 金針菜)

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 河北(63), 四川(75), 湖南(306), 江苏(231), 浙江(8).

H. minor Mill. (紅萱, 黃花菜)

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) 黑龙江(313), 东北(272), 山东(66).

H. sp. (萱草属)

Puccinia hemerocallidis Thuem. (锈病) “东北”(290), 陕西(7), 云南(212), 貴州(231), 河南(13), 安徽(231), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(231), 福建(32, 36), 广西(231).

Septoria hemerocallidis Teng (斑枯病) 江苏(29, 32).

Hemiptelea davidii Planch. (刺榆, 柾)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

Uncinula miyabei (Salm.) Sacc. et Syd. (白粉病) 浙江(219).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

Heptapleurum arboricolum Hay.

Meliola leptoclada Syd. (煤病) 台湾(382).

H. sp. (白芷属)

Meliola leptoclada Syd. (煤病) 台湾(387).

Heteropogon contortus (L.) Beauv. (黃茅)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).

Puccinia versicolor Diet. et Holw. (= *P. filipodia* Cummins) (锈病) 四川(150), 湖北(247).

Sorosporium anthistiriae (Cobb) Ling (黑粉病) 河北(153), 四川(149, 153), 湖南(153), 河南(153), 江苏(153), 福建(153).

S. caledonicum Pat. (黑粉病) 四川(149, 150, 153).

Sphacelotheca andropogonis (Opiz.) Bubak (黑粉病) 四川(149, 150, 153).

S. monilifera (Ell. et Ev.) Clint. (黑粉病) 云南(306).

Heterosmilax gaudichaudiana (Kunth.) Max. (肖菝葜)

Puccinia citrina Syd. (锈病) 广东(6).

P. ferruginea Lev. (锈病) 福建(214).

Hevea brasiliensis Muell.-Arg. (三叶胶, 巴西橡胶)

Helminthosporium heveae Petch (叶斑病) 广东(76).

Oidium heveae Stein (白粉病) 广东(76).

Phyllosticta heveae Zimm. (叶斑病) 台湾(359).

Hevea brasiliensis Muell.-Arg. (三叶胶, 巴西橡胶)*Sphaerostilbe repens* Berk. et Br. 广东(76).*Ustilina zonata* (Lev.) Sacc. 广东(76).*Loranthus chinensis* L. (松寄生) 广西(160).*L. parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广东(76, 160).*Viscum angulatum* Heyne. (青刚櫟寄生) 广东(76, 160).**Hibiscus abelmoschus** L. (黄葵)*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).**H. cannabinus** L. (洋麻, 芙蓉麻)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 吉林(294), 辽宁(294).*Cercospora abelmoschi* Ell. et Ev. (= *C. hibisci-cannabini* Saw.) (叶斑病) 吉林(294), 辽宁(294), “华北”(258), 台湾(351).*C. hibiscina* Ell. et Ev. (叶斑病) 吉林(294), 辽宁(294).*C. hibiscivora* Hara (叶斑病) 河北(299, 321), “华北”(258).*Choanephora cucurbitarum* (Berk. et Rav.) Thaxter (花腐病) 四川(73).*Colletotrichum hibisci* Poll. (炭疽病) 台湾(252, 350).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).*Fusarium equiseti* (Corda) Sacc. var. *bullatum* (Sherb.) Wr. — (135).*F. moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) — (135).*F. vasinfectum* Atk. (枯萎病) — (135).*Hyalothyridium nakatae* Hara 山西(321).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(299).*Phyllosticta hokusiensis* Hara 山西(321).*Bacterium* sp. 河北(299), 山东(299).**H. esculentus** L. (潺茄)*Cercospora malayensis* Stev. et Solh. (叶斑病) 台湾(358, 376).*Phoma hibisci-esculenti* Saw. 台湾(358).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Hibiscus mutabilis L. (木芙蓉)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 四川 (150, 208, 226), 云南(213), 河南(13), 浙江(208), 台湾(350).

H. rosa-sinensis L. (朱堇, 扶桑)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

H. sabdariffa L. (玫瑰洋麻)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

H. schizopetalus Hook f. (吊灯花)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

H. sylvestris L. (木槿)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

H. syriacus Linn. (木槿)

Haplosporella hibisci (Berk.) Pat. et Syd. 河南(374).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 云南(213).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

H. tiliaceus L. (黄堇, 右納)

Gloeosporium hibisci-tiliacei Saw. (炭疽病) 台湾(355).

Gnomoniella hibisci Saw. 台湾(360).

Phyllachora minuta P. Henn. (黑痣病) 台湾(358).

H. sp. (木槿属)

Cercospora althaeina Sacc. (叶斑病) “西康”(57).

Pseudomonas syringae van Hall. 西康(57).

Hierochloa glabra Trin. (光稈香草)

Puccinia coronata Corda (锈病) 河北(63).

Ustilago striiformis (Westd.) Niessl. (黑粉病) 河北(13, 198).

H. odorata Beauv. (香草)

Puccinia hierochloae Ito (锈病) 吉林(313), 辽宁(313).

Hippeastrum reginae Hers.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Holarthrena antidysenterica (止泻木)

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Holcus fulvus Br. var. **genuinus** Honda

Phyllachora holci-fulvi Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Puccinia nakanishikii Diet. (锈病) 台湾(290).

H. halepensis L.

Puccinia purpurea Cke. (锈病) 台湾(290).

Hordeum bogdanii (包顿大麦)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 新疆(88).

P. graminis Pers. (稈锈病) 新疆(88).

H. murinum L.

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) “东北”(290).

H. sativum Jessen (大麦)

Erysiphe graminis DC. (白粉病) “西康”(57).

Helminthosporium gramineum (Rabh.) Erikss. (*Pyrenophora graminea* (Rabh.) Ito et Kurib.) (条纹病) “西康”(57), 福建(121).

H. teres Sacc. (*Pyrenophora teres* (Sacc.) Drechsler) (网斑病) “西康”(57).

Puccinia hordei Otth. (= *P. anomala* Rostr.) (叶锈病) 河北(62).

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. (坚黑穗病) 河北(20), 台湾(152).

U. nuda (Jenssen) Rostr. (散黑穗病) 河北(20), 四川(149), 河南(149), 台湾(152).

H. sativum Jessen var. **hexastichon** (六列大麦)

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 台湾(354).

H. sativum Jessen var. **vulgare** Hack. (大麦)

Epicoccum tritici P. Henn. 四川(150).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 四川(75, 150), 台湾(354).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 四川(150).

Hordeum sativum Jessen var. **vulgare** Hack. (大麦)

Helminthosporium gramineum Rabh. (*Pyrenophora graminea* (Rabh.) Ito et Kurib.) (条纹病) 四川(75,150), 江苏(202), 台湾(350).

H. teres Sacc. (*Pyrenophora teres* (Sacc.) Drechsler) (网斑病) 四川(75,150).

Piricularia oryzae Cav. (瘟疫病) 台湾(350).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 四川(150).

P. graminis Pers. (稈锈病) 四川(150).

P. hordei Otth. (= *P. anomala* Rostr.) (叶锈病) 四川(150), 广东(274).

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. (坚黑穗病) 四川(75,150), 贵州(53).

U. nuda (Jenssen) Rostr. (散黑穗病) 四川(75,150), 贵州(53).

H. vulgare L. (大麦)

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. (黑霉病) 贵州(53).

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 四川(226), 云南(112, 212), 贵州(53, 174), 河南(13), 山东(42), 江苏(42, 106, 128, 201), 浙江(42, 54, 219), “华东”(341), 福建(10), 广西(178), 台湾(350).

Fusarium aquaeductuum (Radlk. et Rabh.) Lagerh. — (135).

F. avenaceum (Fr.) Sacc. — (135).

F. concolor Reink. — (135).

F. culmorum (Smith) Sacc. — (135).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 黑龙江(294), 内蒙(372), 贵州(35, 174), 山东(42), 安徽(42), 江苏(42, 128), 浙江(42), 福建(10), 台湾(350), — (135).

F. heterosporium Nees — (135).

F. redolens Wr. — (135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. — (135).

Hordeum vulgare L. (大麦)

Helminthosporium gramineum (Rabh.) Erikss. (*Pyrenophora graminea* (Rabh.) Ito et Kurib.) (条紋病) 黑龙江(60,294), 吉林(294,313), 河北(166,197,231), 陕西(167), “西康”(32), 四川(32,73,194), 云南(112,156,212), 貴州(53,174), 湖北(47), 湖南(112), 河南(13), 山东(42,182), 安徽(42,47), 江苏(29,32,42,47,106,128,201,202), 浙江(8,42,47,49,54), “华东”(341), 福建(10,121), 广西(32,37,178).

H. sativum Pam., King et Bakke (*Cochliobolus sativus* (Ito et Kurib.) Drechsler) 黑龙江(294), 河北(231), 江苏(128), 广东(141), 台湾(350).

H. teres Sacc. (*Pyrenophora teres* (Sacc.) Drechsler) 黑龙江(290), “西康”(57), 山东(42,182), 安徽(42), 江苏(42,128), 浙江(8,42,49,54), “华东”(341).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 山东(42), 安徽(42), 浙江(42), 江苏(42), 广东(141).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 河北(197), 云南(112,156,212), 貴州(53), 湖南(112), 河南(42), 山东(42), 安徽(42), 江苏(42,128), 浙江(42), 福建(10), 台湾(290).

P. graminis Pers. (稈锈病) 黑龙江(60,294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(168,372), 河北(166,168,197,231), “西康”(57), 云南(156,212), 貴州(53), 河南(13), 山东(42), 安徽(42), 江苏(42,106,128,201,202), 浙江(42,231), “华东”(341), 福建(10), 广东(141), 广西(37), 台湾(290).

Puccinia hordei Otth. (= *P. anomala* Rostr.) (叶锈病) 黑龙江(294), 吉林(294,313), 辽宁(294), 河北(62,373), 四川(194), 云南(111,112,156,212), 貴州(53,174,231), 湖南(112), 河南(13,231), 山东(42), 安徽(42), 江苏(32,36,42,128,201,202,231), 浙江(42,54,231), “华东”(341), 广东(141), 广西(32,37), 台湾(290).

Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis (云紋病) 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).

Hordeum vulgare L. (大麦)

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. (坚黑穗病) 黑龙江(294), 吉林(153, 294, 313), 辽宁(153), “东北”(198), 内蒙(168, 372), “热河”(153), 河北(32, 104, 116, 153, 166, 171, 198, 231, 373), 山西(153), 陕西(153, 167, 231), 甘肃(153), 青海(153), 新疆(88), “西康”(32, 57, 153), 四川(32, 73, 104, 149, 153, 194), 云南(111, 112, 153, 212), 贵州(53, 153, 174), 湖北(153), 湖南(112), 河南(10, 153, 231), 山东(42, 153, 182, 198), 安徽(32, 42, 104, 153, 231), 江苏(32, 42, 104, 128, 153, 201, 202, 231), 浙江(8, 32, 42, 49, 54, 104, 153, 198), “华东”(341), 江西(231), 福建(10, 113, 153), 广东(141, 153), 广西(32, 37, 153, 178), 台湾(153).

U. nuda (Jenssen) Rostr. (散黑穗病) 黑龙江(153, 294), 吉林(153, 294, 313), 辽宁(150, 294, 313), 内蒙(372), “热河”(153), 河北(32, 104, 116, 153, 166, 168, 197, 231), 山西(153), 陕西(167), 新疆(88, 153), “西康”(32, 104, 153), 四川(32, 73, 104, 153, 194), 云南(32, 104, 112, 153, 156, 212), 贵州(53, 174), 湖南(112), 河南(13, 153), 山东(14, 42, 153, 313), 安徽(42, 47, 153), 江苏(32, 42, 104, 106, 128, 153, 201, 202, 231), 浙江(8, 32, 42, 49, 54, 104, 153, 198), “华东”(341), 江西(153), 福建(10, 121, 153), 广东(141, 153), 广西(32, 37, 153, 178), 台湾(153).

Xanthomonas translucens (Jones) Dowson (黑颖病) 黑龙江(294).

H. sp. (大麦属)

Puccinia graminis Pers. (稈锈病) 河北(62).

P. hordei Otth. (= *P. anomala* Rostr.) (叶锈病) 广西(246).

Hosta coerulea Tratt. (紫萼)

Puccinia funkiae Diet. (锈病) “东北”(313), 贵州(246) 江苏(106).

Houttuynia cordata Thunb. (蕺菜)

Uredo houttuyniae Saw. (锈病) 台湾(360).

Hovenia dulcis Thunb. (拐枣, 枳椇)

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 四川(150).

Elytranthe fordii (Hance) Merr. (枫寄生) 广东(160).

Viscum angulatum Heyne (青刚櫟寄生) 广西(160).

Hoya carnos R. Br. (球兰, 毡兰)*Meliola hoyae* Sacc. (煤病) 台湾(380).*Puccinia variiformis* Pat. (锈病) 台湾(290).**Humulus japonicus** Sieb. et Zucc. (葎草)*Cercospora humuli* Hori (叶斑病) “华北”(258), 四川(150), 台湾(358).*Coniothyrium humuli* Hollos 河北(20).*Cylindrosporium humuli* Ell. et Ev. 河南(13).*Pseudoperonospora humuli* (Miyabe et Takahashi) Wils. (霜霉病) 四川(150).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**H. lupulus** L. (忽布, 蛇麻, 啤酒花)*Pseudoperonospora humuli* (Miyabe et Takahashi) Wils. 黑龙江(294).**H. lupulus** L. var. **cordifolius** Max. (蛇麻草, 华忽布)*Sphaerotheca humuli* (DC.) Burr. (白粉病) 江苏(106).**Hydrangea angustipetala** Hay.*Aecidium hydrangiicola* P. Henn. (锈病) 台湾(280, 290).*Cercospora hydrangeae* Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(357).*Irenina hydrangeae* Yamam. (煤病) 台湾(385).**H. anomala** Don. (木枝挂苦藤, 蔓性八仙花)*Pucciniastrum hydrangeae-petioleidis* Hirat. (锈病) 台湾(289).**H. chinensis** Max.*Colletotrichum hydrangeae* Saw. (炭疽病) 台湾(358).*Irenina hydrangeae* Yamam. (煤病) 台湾(385).**H. kawakamii** Hay.*Pucciniastrum hydrangeae-petioleidis* Hirat. (锈病) 台湾(289).**H. longifolia** Hay.*Aecidium hydrangiicola* P. Henn. (锈病) 台湾(280, 290).**H. macrophylla** (Thunb.) DC.*Cercospora hydrangeae* Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(357).**H. opuloides** K. Koch. (八仙花)*Cercospora obtegens* H. et P. Syd. (叶斑病) 江苏(47).*Septoria hydrangeae* Brigg. (斑枯病) 江苏(47).

Hydrangea strigosa Rehd.*Aecidium hydrangeae* Pat. (锈病) 浙江(32,36).**H. umbellata** Rehd. (繖形繡球花)*Aecidium hydrangiicola* P. Henn. (锈病) 浙江(32,36).**H. sp.** (八仙花属)*Irenina hydrangeae* Yamam. (煤病) 台湾(387).*Phyllosticta hydrangeae* Ell. et Ev. 河南(13).*Pucciniastrum hydrangeae-petiolelaridis* Hirat. (锈病) 貴州(245).*Septoria hydrangeae* Brigg. (斑枯病) 河南(13), 福建(10).**Hydrocotyle rotundifolia** Roxb. (天胡荽)*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**Hypericum ascyron** L. (湖南連翹, 金絲蝴蝶)*Melampsora kusanoi* Diet. (锈病) 黑龙江(272), 辽宁(313), 陝西(7).**H. japonicum** Thunb.*Uromyces hyperici* Curt. (锈病) 台湾(290).**H. patulum** Thunb. (金絲梅)*Melampsora kusanoi* Diet. (锈病) 云南(214), 貴州(245).**H. patulum** Thunb. var. **henryi** Veitch. (大花金絲梅, 亨氏金絲梅)*Melampsora kusanoi* Diet. (锈病) 云南(214).**H. sp.** (金絲桃属)*Melampsora kusanoi* Diet. (锈病) “西康”(57), 广西(245).*Uromyces hyperici* Curt. (锈病) 广西(245).**Hypoestes cumingiana** Benth. et Hook f.*Puccinia hypoestis* Saw. (锈病) 台湾(290,359).**Idesia polycarpa** Max. (山桐子, 椅)*Melampsora idesiae* Miyabe (锈病) 湖南(32,36).**Ilex cornuta** Lindl. (枸骨)*Macrophoma ilicis-cornutae* Teng 江苏(32), 浙江(32).*Physalospora ilicella* Teng var. *minor* Teng 江苏(28, 32).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**I. ficoidea** (榕叶冬青)*Englerulaster sinensis* Syd. 广东(362).

Ilex formosana Max. (台冬青)*Guignardia ilicis-formosanae* Saw. 台湾(358).*Meliola ilicicola* Yamam. (煤病) 台湾(381).**I. latifolia** Thunb. (波罗树)*Physalospora ilicella* Teng 江苏(28,32).**I. micrococca** Max. var. **longifolia** Hay. (长叶小果冬青)*Cercospora ilicis-micrococcae* Saw. (叶斑病) 台湾(358).**I. rotunda** Thunb. (铁冬青)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**I. wilsonii** Loes.*Cercospora cheonis* Chupp et Linder (叶斑病) 江西(240).*C. yerbae* Speg. (叶斑病) 江西(231).**I. sp.** (冬青属)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**Impatiens balsamina** L. (凤仙花)*Cercospora fukushiana* (Matsumoto) Yamam. (叶斑病)

四川(150), 河南(13), 广东(112), 台湾(377).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150)*Phytophthora cactorum* (Lebert et Cohn.) Schroet. (疫病) 江苏(47).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(313), 河北(116, 172, 315), “西康”(57), 四川(150, 226), 云南(111, 112, 212, 213), 河南(13), 山东(14, 219), 安徽(219, 231), 江苏(201, 219), 浙江(219), 福建(213), 广东(112, 141).**I. nolitangere** L. (水金凤)*Cercospora campi-silii* Speg. (叶斑病) ——(239).*Plasmopara obducens* Schroet. (霜霉病) 四川(150).*Puccinia nolitangeris* Corda (= *P. argentata* (Schultz.) Wint.) (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272, 290).*Septoria noli-tangeris* Gerard (斑枯病) 四川(150).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 辽宁(313).**I. textori** Miq. (野凤仙花)*Plasmopara obducens* Schroet. (霜霉病) 四川(150).**I. uliginosa** Franch. (水金凤)*Puccinia impatientis-uliginosae* Tai (锈病) 云南(214).

Impatiens sp. (凤仙花属)

Puccinia nolitangeris Corda (= *P. argentata* (Schultz.) Wint.) (锈病) 新疆(67), 贵州(218, 231).

Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. (白茅)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Puccinia microspora Diet. (锈病) 广西(247).

P. rufipes Diet. (锈病) 四川(150), 云南(214), 江苏(231), 福建(231), 广西(246), “华南”(342).

Sphacelotheca nankinensis Zundel (黑粉病) 江苏(390).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).

I. cylindrica (Linn.) Beauv. var. **koenigii** Dur. et Schinz. (白茅)

Cercospora imperatae (Syd.) Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Mycosphaerella imperatae Saw. 台湾(360).

Puccinia rufipes Diet. (锈病) “东北”(273, 290), 广西(274), 台湾(290, 359).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

Incarvillea sinensis Lam. (角蒿)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Indigofera arrecta Hochst.

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

I. cinerascens Fr. (灰色木蓝)

Ravenelia laevis Diet. et Holw. (锈病) 云南(214).

I. dielsiana Craib (大理木蓝)

Ravenelia macrocapitula Tai (锈病) 云南(214).

I. hancockii Craib (韩氏木蓝)

Ravenelia macrocapitula Tai (锈病) 云南(214).

I. kirilowii Max. (苦扫根)

Cercospora indigoferae Miura 辽宁(313).

Parodiella perisporiodes (Berk. et Curt.) Speg. 辽宁(313).

I. scabrida Dunn (腺毛木蓝)

Ravenelia indigoferae-scabridae Tai (锈病) 云南(213).

Indigofera suffruticosa Mill. (野青树, 靛)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 台湾(350).**I. tinctoria** L. (木蓝, 槐蓝)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 台湾(350).**I. sp.** (木蓝属)*Parodiella periosporioides* (Berk. et Curt.) Speg. 四川(150).*Ravenelia indigoferae* Tranzsch. (锈病) 广西(245).*R. laevis* Diet. et Holw. (锈病) 云南(214).*Uromyces sphaerocarpus* Syd. (锈病) 安徽(246).**Indocalamus niitakayamensis** Nak.*Phyllachora indocalami* Saw. (黑痣病) 台湾(358).**Inula britannica** L. (旋复花)*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) 吉林(313).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).**I. japonica** Thunb.*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).**I. salicina** L. (歌仙草)*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).**I. serrata** Bur. et Fr. (旋复花)*Coleosporium inulae* (Kunze) Rabh. (锈病) 云南(214).**I. sp.** (旋复花属)*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) 河南(13).*Coleosporium asterum* (Diet.) Syd. (锈病) 浙江(231).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 辽宁(313).*Septoria inulae* Sacc. et Speg. (斑枯病) 河北(316).**Ipomoea aquatica** Forsk. (蕹菜)*Albugo ipomoeae-aquaticae* Saw. (白锈病) 四川(75, 150, 194, 221), 台湾(287, 351).*A. ipomoeae-panduranae* (Schw.) Sw. (白锈病) “西康”(57), 四川(193), 江苏(141, 201), 福建(10, 113), 广东(141), 广西(37, 193).*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 台湾(350).*Cercospora ipomoeae* Wint. (叶斑病) 福建(910, 113).

Ipomoea aquatica Forsk. (蕹菜)*Mycosphaerella ipomoeaecola* Hara 四川(150).*Myrothecium roridum* (Tode) Fr. 四川(150,229).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito (立枯病) 台湾(350).*Phyllosticta ipomoeae* Ell. et Kell. (叶斑病) 福建(10).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**I. batatas** (L.) Poir. (西洋甘薯,番薯,白薯,山芋)*Albugo ipomoeae-panduranae* (Schw.) Sw. (白锈病) 河南(13),江苏(128).*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 四川(150,157).*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halst. (黑疤病) 辽宁(294),河北(116),山东(101),江苏(72).*Cercospora timorensis* Cke. (叶斑病) 河北(47),西康(57),四川(150),云南(112),湖南(112),河南(13),安徽(47),江苏(128),福建(10),台湾(355),“华南”(342).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 江苏(128),台湾(350).*Fusarium anguioides* Sherb. —(135).*F. bulbigenum* Cke. et Mass. var. *batatae* Wr. 辽宁(294),河南(13),江苏(128),—(135).*F. culmorum* (Smith) Sacc. —(135).*F. heterosporium* Nees —(135).*F. javanicum* Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.) 山东(182).*F. moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).*F. oxysporum* Schlecht. f. 2 Wr. 四川(150,157), —(135).*F. scirpi* Lamb. et Fautr. var. *acuminatum* (Ell. et Ev.) Wr. —(135).*F. solani* (Mart.) App. et Wr. —(135).*Macrophomina phaseoli* (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(347,350).*Phoma batatas* Ell. et Halst. 河南(13),福建(10,121).*Phomopsis batatae* Ell. et Halst. (*Diaporthe batatatis* Harter et Field) 四川(150,157).

Ipomoea batatas (L.) Poir. (西洋甘薯, 番薯, 白薯, 山芋)

Phyllosticta batatae (Thuem.) Cke. 辽宁(290), 四川(150).

Rhizopus delamar (Boidin) Wehmer et Hanzawa 江苏(188).

R. nigricans Ehrb. (軟腐病) 新疆(88), “西康”(57), 四川(150, 157, 221), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128), 福建(10), 广东(233).

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (菌核病) 陝西(59).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128), 福建(10), 台湾(358).

Septoria bataticola Taub. (斑枯病) 江苏(128).

Sphaceloma batatas Saw. (*Elsinoe batatas* Jenk. et Vieg.) (疮痂病) 台湾(355).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(150).

花叶病 (Mosaic) 江苏(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

I. batatas (L.) Poir. var. *edulis* Mak. (甘薯)

Helicobasidium mompa Tanaka (紫紋羽病) 台湾(350).

I. hederacea Jacq. (牽牛花)

Albugo ipomoeae-panduranae (Schw.) Sw. (白锈病) 河北(231), “西康”(57), 四川(150), 云南(212), 江苏(106, 193, 201), 福建(10).

Cercospora ipomoeae Wint. (叶斑病) 河北(166, 197, 315), “西康”(57), 四川(150), 湖北(47), 安徽(231), 浙江(231).

Macrophoma ipomoeae Pass. 河北(20, 29, 32).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150).

I. pes-caprea Roth (罌藤)

Cercospora ipomoeae Wint. (叶斑病) 台湾(359).

I. reptans (Linn.) Poir. (蕹菜)

Albugo ipomoeae-panduranae Sw. (白锈病) 湖南(112), 广西(112, 178).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

I. sp. (番薯属)

Aecidium kaernbachii P. Henn. (锈病) 广东(32, 36, 274), 台湾(368).

Cercospora timorensis Cke. (叶斑病) “华北”(171).

Ipomoea sp. (番薯属)

Meliola malacotricha Speg. (煤病) 台湾(380,387).

Puccinia heitoensis Ito et Murayama (锈病) 台湾(359).

Iris collettii Hook f.

Vermicularia liliacearum West. (黑色炭疽病) 云南(306).

I. dichotoma Pall. (白射干)

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313), “东北”(272), 河北(116).

Scolecotrichum iridicola Miura 黑龙江(313).

I. ensata Thunb. var. **chinensis** Max. (蠹实)

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 黑龙江(313), 吉林(313), 辽宁(313), 甘肃(214), “西康”(57), 河南(13).

I. japonicus Thunb. (蝴蝶花)

Alternaria iridicolum (Ell. et Ev.) Ell. (黑斑病) 四川(150).

Mycosphaerella iridis (Auersw.) Schroet. 山西(340).

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 四川(150).

Vermicularia liliacearum West. (黑色炭疽病) 四川(150), 贵州(306).

I. lactea Pall. var. **chinensis** Koidz. (馬蘭)

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) “东北”(290), 河北(62), 陕西(7), 新疆(67), 江苏(47), 江西(47).

I. setosa Pall.

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 河北(47).

I. sibiricus L. vel. aff.

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 新疆(67).

I. tectorum Max. (鳶尾)

Didymellina iridis (Desm.) Hoehn. 福建(10).

Fusarium javanicum Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.) —(135).

F. oxysporum Schlecht. —(135).

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 江苏(47).

Pseudomonas indicola (Takimoto) Stapp. 江苏(138).

I. tenuifolia Pall. vel. aff.

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 新疆(67).

I. sp. (鳶尾属)

Cladochytrium tenue Nowak 河南(13).

Puccinia iridis (DC.) Wallr. (锈病) 甘肃(35), 云南(212, 333), 江苏(106), 广西(246).

Isachne australis R. Br. (毛鴨嘴草)

Sphacelotheca isachnes (Syd.) Ling (= *Ustilago isachnes* Saw., *U. isachnes* Syd.) (黑粉病) 台湾(152,153,360).

I. formula Buse

Uromyces leptodermus Syd. (銹病) 台湾(360).

Ischaemum akoense Honda

Cerebella paspali Cke. et Mass. 台湾(360).

Helminthosporium ischaemi Saw. 台湾(360).

Sphacelotheca tanglinensis (Tracy et Earle) Zundel (黑粉病) 台湾(360).

I. aristatum L. (毛穗鴨嘴草, 鴨嘴草)

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (銹病) 台湾(290).

Sphacelotheca tanglinensis (Tracy et Earle) Zundel (黑粉病) 福建(153), 广东(153), 台湾(152,153), “华南”(342).

I. ciliare Retz. (芒鴨嘴草, 紆毛鴨嘴草)

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (銹病) 台湾(279,290).

Sphacelotheca tanglinensis (Tracy et Earle) Zundel (黑粉病) 福建(114,153), 广东(153), 台湾(153,288,351), “华南”(342).

I. ciliare Retz. var. **genuinum** Hack.

Melampsora syntherismae Saw. (銹病) 台湾(360).

Sphacelotheca tanglinensis (Tracy et Earle) Zundel (黑粉病) 福建(153), 广东(153), 台湾(152,153).

I. ciliare Retz. var. **scrobiculatum** Honda

Melampsora syntherismae Saw. (銹病) 台湾(360).

I. crassipes (Steud.) Thell. (鴨嘴草)

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (銹病) 台湾(279,290).

I. guianense Kunth

Phakopsora incompleta (Syd.) Cummins (銹病) 台湾(279,290).

I. rugosum Salisb. (皺穎鴨嘴草)

Sphacelotheca tanglinensis (Tracy et Earle) Zundel var. *hainanae* (Zundel) Ling (黑粉病) 广东(153,390).

I. rugosum Salisb. var. **segetum** Hack.

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito (立枯病) 台湾(350).

Ischaemum timorense Kunth var. **peguense** Hack.*Cerebella ischaemicola* Saw. 台湾(358).*Sorosporium flagellatum* Syd. et Butl. (黑粉病) 福建(153), 台湾(152, 153).**I. sp.** (鴨嘴草屬)*Sorosporium flagellatum* Syd. et Butl. (黑粉病) 台湾(283).*Sphacelotheca tanglinensis* (Tracy et Earle) Zundel (黑粉病) 广东(27, 32).**Ischurochloa stenostachya** Nakai*Macrophoma ischurochloae* Saw. 台湾(360).*Phyllachora shiraiana* Syd. (黑痣病) 台湾(360).*Scaphidium ischurochloae* Saw. 台湾(360).*Tubeufia javanica* Penz. et Sacc. 台湾(360).**Itea chinensis** Hook et Arn. (华鼠刺, 鼠刺)*Phyllosticta iteae* Saw. (叶斑病) 台湾(360).**I. chinensis** Hook et Arn. var. **arisanensis** Max.*Meliola cylindrophora* Rehm. (煤病) 台湾(380).**I. chinensis** Hook et Arn. var. **sub serrata** Max.*Meliola cylindrophora* Rehm. (煤病) 台湾(380).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**I. sp.** (鼠刺屬)*Meliola cylindrophora* Rehm. (煤病) 台湾(387).**Ixora chinensis** Lam. (仙丹花, 龙船花)*Cercospora ixorae* Solheim (叶斑病) 台湾(377).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Triposporiopsis spinigera* (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**I. coccinea** Linn. (橙紅龙船花)*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Triposporiopsis spinigera* (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**I. parviflora***Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Jasminum grandiflorum L. (素馨)

Cercospora jasminicola Muller et Chupp (叶斑病) 台湾 (360)

J. odoratissimum L. (黄馨, 金茉莉)

Cercospora jasminicola Muller et Chupp (叶斑病) 台湾 (358).

J. primulinum Hemsl. (云南黄馨)

Sphaerulina intermixta Sacc. f. *jasmini* Keissler 云南 (304).

J. sambac Soland (茉莉花)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phoma jasmini-sambactis Saw. 台湾(350).

J. sp. (茉莉属)

Asterina jasmini Hansf. (煤病) 广西(254).

Jeffersonia dubia Max. (洋虎耳草)

Triphragmiopsis jeffersoniae Naumov 辽宁(115).

Juglans cattaensis Dode (野核桃, 华胡桃)

Melanconium oblongum Berk. 江苏(29, 32).

J. mandshurica Max. (胡桃楸, 核桃楸, 满洲胡桃)

Microstroma juglandis (Bereng.) Sacc. 吉林(313).

J. regia L. (胡桃, 核桃)

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. —(135).

Melanconium oblongum Berk. 江苏(29, 32).

Microsphaera yamadai (Salm.) Syd. (白粉病) 河北(116, 172, 209).

Microstroma juglandis (Bereng.) Sacc. 云南(306).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(91).

Phyllosticta juglandis (DC.) Sacc. 河北(222, 321).

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (白色斑駁病) 黑龙江 (60).

P. sulfureus (Bull.) Fr. (褐色心材腐朽病) 河南(13).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 河北(116).

Xanthomonas juglandis (Pierce) Dowson 河北(138, 222, 321), 河南(13), 山东(138), 江苏(138).

Juglans sp. (胡桃属)*Antennaria pannosa* Berk. 云南(333).*Marssonina juglandis* (Lib.) Magn. (褐斑病) 河北(317).**Juncus** sp. (灯心草属)*Cercospora junicola* Chupp (叶斑病) “西康”(57).**Juniperus chinensis** L. (檜柏)*Diplodia juniperi* Westd. 河南(374).*Gymnosporangium haraeum* Syd. (锈病) 辽宁(313), 河北(64, 116, 222, 313), “西康”(57), 四川(150, 194), 山东(313), 江苏(201, 220), 浙江(8), 广西(37).*G. japonicum* Syd. (锈病) 河北(166), 江苏(32, 36, 220), 广东(141).*G. yamadai* Miyabe (锈病) 吉林(294, 313), 辽宁(272, 294, 313), “东北”(272), 河北(64, 116, 222, 313, 316), 四川(150), 江苏(32, 36, 201).*Pithya cupressi* (Batsch.) Rehm. 台湾(355).**J. formosana** Hay. (山刺柏, 刺松)*Gymnosporangium corniforme* Saw. (锈病) 台湾(267, 278, 290, 354).**J. squamata** Ham. (香青)*Gymnosporangium formosanum* Hirat. f. et Hashioka (锈病) 台湾(267, 290, 359).**Justicia gendarussa** L. (藜篱木焦)*Puccinia thwaitesii* Berk. (锈病) 广东(274), 台湾(290).**Kadsura japonica** Dun. (南五味子)*Meliola kadsurae* Yamam. (煤病) 台湾(383).**Kalopanax pectus** (Thunb.) Nakai (刺楸)*Phyllosticta acanthopanacis* Syd. 江苏(29, 32).**K. pictus** (Thunb.) Nakai*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 208).*Phyllosticta acanthopanacis* Syd. 四川(150), 江苏(364).**Keteleeria davidiana** (Fr.) Beissner. (铁杉)*Streptothrix fusca* Corda 云南(306).**K. evelyniana** Mast. (云南油杉)*Cronartium keteleeriae* Tai (锈病) 云南(214).**Kochia scoparia** Schrad. (地肤)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Peronospora kochiae* Gaum. (霜霉病) 吉林(294), 辽宁(43a), 河北(173).

Koelreuteria bipinnata Franch. (复羽叶欒树)

Nyssopsora koelreuteriae (Syd.) Tranzsch. (锈病) 浙江 (218, 364).

Typhulochaeta koelreuteriae (Miyake) Tai (白粉病) 河北 (315), 河南 (13, 213).

K. formosana Hay. (台湾欒树)

Nyssopsora formosana (Saw.) Lutjeharms (锈病) 台湾 (269, 270, 290, 355).

K. integrifoliola Merr. (黄山欒树)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江 (164, 165).

K. paniculata Laxm. (欒树)

Nyssopsora chinense (Tai et Cheo) Tai (锈病) 陕西 (218).

Uncinula bulbosa (Tai et Wei) Tai (白粉病) 浙江 (208).

K. sp. (欒树属)

Meliola koelreuteriae Hansf. (煤病) 浙江 (32, 36), 广西 (254).

Kummerowia stipulacea Mak. (掐不齐)

Peronospora desmodii Miyabe, Ito et Tokunaga (霜霉病) 黑龙江 (43a).

K. striata (Thunb.) Schindl. (鸡眼草)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) 湖南 (214).

Kyllingia brevifolia Rottb. var. *gracillima* (Miq.) Kukenthal

Puccinia kyllingiae-brevifoliae Miura (锈病) 四川 (150), 台湾 (290, 359).

K. monocephala Rottb. (单头水蜈蚣)

Puccinia mysorensis Syd. et Butl. (锈病) 台湾 (290, 368).

P. taihokuensis Saw. (锈病) 台湾 (359).

Lactuca brevirostris Champ. (山萵苣)

Puccinia minussensis Thuem. (锈病) “热河” (317).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾 (350).

L. sativa L. (萵苣, 青筍)

Ascochyta lactucae Rost. (褐斑病) 四川 (150).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川 (91), 贵州 (174), 湖南 (112), 江苏 (128), 浙江 (8, 49), 广西 (178).

Lactuca sativa L. (莴苣,青筍)

Bremia lactucae Regel. (霜霉病) “西康”(57), 四川(75, 150, 221), 云南(112, 212), 貴州(196), 湖南(112), 江苏(128), 广西(112, 178).

Cercospora longissima Sacc. (叶斑病) “华北”(258), 湖南(112), 广东(112, 370), 台湾(358, 377).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (莖腐病) 江苏(128).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128), 浙江(8, 49, 50), 江西(158), 福建(10), 广东(141), 广西(112, 178).

Septoria lactucae Pass. (斑枯病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294), 四川(33, 75, 150, 221), 云南(112, 212), 貴州(174), 湖南(112), 河南(13), 江苏(106, 128), 广西(112).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 江苏(128).

Pseudomonas marginalis (Brown) Stev. (緣叶枯病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Xanthomonas vitians (Brown) Starr. et Weiss (腐敗病) 湖南(112). 花叶病 (Mosaic) 四川(127), 湖北(127), 江苏(127), 浙江(127).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

L. sativa L. var. angustana Hort. (莴苣)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 广西(37).

L. sativa L. var. crispa L. (皺叶莴苣,玻璃生菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 广西(37).

L. scariola L. (野莴苣)

Septoria lactucae Pass. (斑枯病) 黑龙江(60).

L. scariola L. var. sativa Bisch. (莴苣)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Septoria lactucae Pass. (斑枯病) 台湾(351).

L. sp. (山莴苣属)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(194).

Bremia elliptica Saw. (霜霉病) 台湾(287).

B. lactucae Regel. (霜霉病) 河北(166), 四川(194), 浙江(8).

Lactuca sp. (山萵苣屬)

- Cercospora longissima* Sacc. (叶斑病) 河南(13).
Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (莖腐病) 台湾(350).
Protomyces lactucae Saw. 台湾(354).
Puccinia lactucae-repentis Miyabe et Miyake (銹病) 四川(214).
P. minussensis Thuem. (銹病) 貴州(246), 湖南(32,36), 安徽(246), 江苏(32,36,364), 江西(32,36), 广西(32,246).
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(194), 台湾(350).
Septoria lactucae Pass. (斑枯病) 四川(194).
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(209), 河南(13).
Pseudomonas marginalis (Brown) Stev. (緣叶枯病) 四川(194).

Lagenaria siceraria (Molina) Stanley (葫蘆)

- Cladosporium cucumerinum* Ell. et Arth. (黑星病) 河南(13).
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 辽宁(313), 河北(321), 山西(321), 陝西(16), “西康”(57), 河南(13).
Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (莖腐病) 台湾(350).
Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) 山东(321), “华南”(342).
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).
S. humuli (DC.) Burr. (白粉病) 河北(172).
Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner “西康”(57).

Cucumis virus 1 (花叶病) 陝西(16), “西康”(57).

L. siceraria (Molina) Stanley var. *clavata* Ser. (扁蒲)

- Colletotrichum lagenarium* (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 辽宁(294).
Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(294).

- Lagenaria siceraria** (Molina) Stanley var. *gourda* Ser. (葫芦)
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) “热河”(294).
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) “热河”(294), 山东(374).
- Lagerstroemia indica** L. (紫薇)
Cercospora lythracearum Heald et Wolf (叶斑病) “华北”(258), 山东(258, 259).
Haplosporella setoana Togashi et Mizokami 河南(374).
Uncinula australiana McAlp. (白粉病) 四川(150, 208, 226), 云南(212), 湖北(47), 山东(374), 浙江(219).
Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).
- L. subcostata** Koehne. (南紫薇, 拘那花)
Cercospora lythracearum Heald et Wolf (叶斑病) 台湾(355).
Uncinula australiana McAlp. (白粉病) 台湾(351).
- L. subcostata** Koehne. var. *hirtella* Koehne. (毛南紫薇)
Cercospora lythracearum Heald et Wolf (叶斑病) 台湾(358)
- Lantana mista** Bail.
Cercospora formosana Yamam. (叶斑病) 台湾(377).
- L. camara** L. (馬纓丹, 七变花)
Cercospora formosana Yamam. (叶斑病) 台湾(377).
- Lappula echinata** Gilbert var. *heteracantha* Kuntze (鹤蚤)
Peronospora echinospermi Sw. (霜霉病) 黑龙江(43a), 辽宁(43a).
- Larix olgensis** Henry (黄花落叶松)
Triphragmiopsis laricinum (Chou) Wang (锈病) 吉林(115).
- L. potaninii** Batalin (紅杉, 波氏落叶松)
Fomes pini (Thore) Karst. (紅色腐朽病) “西康”(33, 34), 云南(33, 34).
F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).
Polyporus schweinitzii Fr. (紅色腐心病) “西康”(34), 云南(34).

Larix sp. (落叶松属)

Polyporus schweinitzii Fr. (紅色腐心病) “西康”(33), 云南(33).

Lathyrus davidii Hance (茫茫决明, 茫茫决明香豌豆)

Uromyces heimerlianus Magn. (锈病) 陕西(7).

L. odoratus L. (麝香豌豆, 香豌豆)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150), 江苏(128, 231), 福建(10), 广东(141).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128).

L. palustris Linn. (沼生香豌豆, 山黧豆)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

Laurus sp. (月桂)

Aegerita webberi Fawcett 广西(231).

Aschersonia placenta B. et Br. 广西(231).

Lawsonia sp. (散沫花属)

Asterina lawsoniae P. Henn. et E. Nym. (煤病) 广东(362).

Leersia hexandra Swartz (李氏禾, 油草)

Xanthomonas leersiae Fang et al. (細菌性条斑病) 广东(19a).

L. oryzoides Swartz. var. **japonica** Hack.

Piricularia leersiae (Saw.) Ito (瘟病) 四川(150).

Puccinia fushunensis Hara (锈病) 辽宁(313).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

Tolyposporium globuligerum (Berk. et Br.) Ricker (黑粉病) 四川(149, 150, 153).

Xanthomonas leersiae Fang et al. (細菌性条斑病) 江苏(19a).

L. sp. (李氏禾属)

Uromyces halstedii de Toni (锈病) 湖南(32, 36).

Leleba dolichoclada

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Leleba oldhami Nakai

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Lens culinaris Medic. (小扁豆, 兵豆, 滨豆)

Peronospora viciae de Bary (霜霉病) 河南(13).

Leontice robustum (Max.) Diels

Aecidium caulophylli Komar. (锈豆) “东北”(313).

Leontopodium franchetii Beauv.

Mycosphaerella tassiana (de Not.) Johans. “西康”(340).

Leonurus macranthus Max. (藜菜)

Erysiphe galeopsidis DC. (白粉病) 江苏(219).

L. sibiricus L. (盆田草, 茺蔚)

Erysiphe galeopsidis DC. (白粉病) 河北(315).

Oidium leonuri-sibirici Saw. (白粉病) 台湾(354).

Ramularia leonuri Sacc. et Penz. 黑龙江(313), 河北(316), 台湾(358).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

L. sp. (茺蔚属)

Erysiphe galeopsidis DC. (白粉病) 四川(150).

Lepidium apetatum Will. (独行草)

Peronospora lepidii-virginici Gaum. (霜霉病) 黑龙江(43a), 遼宁(43a).

Lepironia mucronata Rich. (龙鬚草)

Phytophthora lepironiae Saw. (疫病) 台湾(287, 358).

Leptodermis glomerata Hutch. (团花滇丁香)

Coleosporium leptodermidis (Barcl.) Syd. (锈病) 云南(214).

L. pilosa var. microphylla (小叶毛滇丁香)

Coleosporium leptodermidis (Barcl.) Syd. (锈病) 云南(214).

L. potanini Batal. (波氏滇丁香)

Coleosporium leptodermidis (Barcl.) Syd. (锈病) 云南(214).

- Leptodermis potanini** Batal. var. *glauca* (Diels) H. Winkl.
Coleosporium leptodermidis (Barcl.) Syd. (锈病) 云南 (214).
- L. potanini** Batal. var. *tomentella* H. Winkl.
Coleosporium leptodermidis (Barcl.) Syd. (锈病) 云南 (214).
- Leptopyrium fumarioides** Reinch. (蓝堇草)
Peronospora leptopyrii Pai (霜霉病) 黑龙江(43a).
- Lespedeza bicolor** Turcz. (胡枝子, 二色胡枝子)
Cercospora latens Ell. et Ev. (= *C. lespedezae* Ell. et Dearn.) (叶斑病) 江苏(29, 32).
Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 浙江(219).
Pleospora lespedezae Miyake 江苏(317).
Uromyces lespedezae-bicoloris Tai et Cheo (锈病) 陕西 (218).
U. lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) 黑龙江(272), 辽宁(313), 吉林(63, 313), “东北”(272), 山西(340), 陕西(237), 湖南(214), 山东(66), 江苏(47).
U. rugulosus Pat. (锈病) 陕西(7).
- L. bicolor** Turcz. var. *japonica* Nakai (日本二色胡枝子)
Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) 台湾(290).
- L. buegeri** Miq. (木本胡枝子, 绿叶胡枝子)
Uromyces rugulosus Pat. (锈病) 陕西(7).
- L. chinensis** G. Don. (中华胡枝子)
Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) 辽宁(313).
- L. cyrtobotrya** Miq. (圆叶胡枝子, 短梗胡枝子)
Cercospora latens Ell. et Ev. (= *C. lespedezae* Ell. et Dearn.) (叶斑病) 台湾(357).
- L. cystoides** Nakai
Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) “东北”(290).
- L. dahurica** Schindler (达乌里胡枝子, 达呼尔胡枝子)
Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(172)
Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病) 黑龙江(272), 吉林(313), 河北(63), 陕西(7), 山东(66).

Lespedeza floribunda Bge. (多花胡枝子)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) -Curt. (锈病)
河北(63,315).

L. formosa (Vog.) Koehne. (美丽胡枝子, 红花胡枝子)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
江西(340), 广西(340).

L. hedysaroides (Pall.) Kitagawa (灯心草状胡枝子, 尖叶铁扫帚)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
黑龙江(272), “东北”(313), 河北(63), 云南(214), 山东(66).

L. hedysaroides (Pall.) Kitagawa var. **inschanica** Kitagawa

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
“东北”(272).

L. pubescens Hay. (毛胡枝子)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
台湾(290).

L. sericea Miq. (铁扫帚, 絹毛胡枝子, 截叶铁扫帚)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 吉林(282).

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
吉林(313).

L. striata Hook et Arn. (鸡眼草)

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
安徽(65).

L. tomentosa Sieb. (白胡枝子, 山豆花, 白花胡枝子)

Cercospora latens Ell. et Ev. (= *C. lespedezae* Ell. et Dearn.) (叶斑病) 山西(340).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 辽宁(282,313).

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
安徽(231), 江苏(106,231).

L. yunnanensis (Franch.) Schindl. (真蕨子梢)

Uromyces rugulosus Pat. (锈病) 云南(335).

L. sp. (胡枝子属)

Cercospora latens Ell. et Ev. (= *C. lespedezae* Ell. et Dearn.) (叶斑病) 江苏(209).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Uromyces lespedezae-procumbentis (Schw.) Curt. (锈病)
“西康”(57), 贵州(246), 湖南(32,36,316), 河南(13), 安徽(246), 江苏(32,36), 浙江(32,36), 江西(246), 广西(246).

U. rugulosus Pat. (锈病) 湖南(32,36).

Leucaena glauca Benth. (銀合欢)

Uredo leucaenae-glaucæ Hirat. et Hashioka (锈病) 台湾 (290).

Leucas ciliata Benth. (繡球防风)

Puccinia leucadis Syd. (锈病) 云南(214), 貴州(340).

Ligularia dictyoneura (Franch.) H.-M.

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 云南(214).

L. hodgsoni Hook

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 四川 (150, 226).

L. lapathifolius (Franch.) H.-M.

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 云南(214).

L. sibirica Cass.

Puccinia expansa Link (锈病) 河北(218).

L. speciosa F. et M.

Puccinia eriophori Thuem. (锈病) 辽宁(313).

L. stenocephala Matsum. et Koidz. var. **typica** M. et K.

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 台湾(289).

L. tangutica (Max.) Matt.

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 陝西(7).

L. tussilaginea Mak. (橐吾)

Puccinia asteris Duby (锈病) 台湾(290).

L. tussilaginea Mak. var. **formosana** Hay.

Ascochyta ligulariae Saw. (褐斑病) 台湾(358).

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 台湾(289).

Uromyces ligulariae Hirat. et Hash. (锈病) 台湾(277, 290, 359).

L. sp. (橐吾属)

Coleosporium ligulariae Thuem. (锈病) 湖南(32, 36).

Puccinia ligulariae Thuem. (锈病) 陝西(7), 河南(13).

Ligustrum compactum Hook et Thoms. (长叶女贞)

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) “西康”(57).

L. ibota Sieb. (水蜡树, 毛綠水蜡树)

Aecidium klugkistianum Diet. (锈病) 安徽(246).

Cercospora ligustri Roum. (叶斑病) 江苏(231).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).

Ligustrum lucidum Ait. (女貞, 大女貞)

Aecidium klugkistianum Diet. (銹病) 湖北(47), 江苏(32, 36).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏藥病) 浙江(8).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. nokoensis Masam. et Mori

Phaeodothis ligustri Saw. (黑痣病) 台灣(358).

L. quihoui Carr. (小叶女貞, 小叶小蜡樹)

Aecidium klugkistianum Diet. (銹病) 江苏(32, 36).

L. robustum Bl.

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) “西康”(57).

L. sinense Lour. (小叶女貞)

Aecidium klugkistianum Diet. (銹病) 江苏(231).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. japonicum Thunb. (日本女貞, 女貞)

Zukaliopsis gardeniae Saw. 台灣(355).

L. vulgare L. (女貞)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164).

L. sp. (女貞屬)

Aecidium klugkistianum Diet. (銹病) 湖南(214, 364), 河南(13), 江苏(231).

A. ligustricola Cummins (銹病) 广西(246).

Phyllosticta ligustrina Sacc. 江苏(47).

Lilium cathayanum Wils. (荞麥葉貝母)

Acanthostigma lilii Keissler 云南(306).

L. cordifolium (心葉百合)

Acanthostigma lilii Keissler 云南(304).

L. davuricum Ker.

Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn.) Schroet (疫病) 台灣(287).

L. longiflorum Thunb. (麝香百合, 卷丹)

Botrytis liliorum Hino (葉枯病) 台灣(350).

L. philippinense Veitch (菲律賓百合)

Botrytis liliorum Hino (葉枯病) 台灣(350).

L. sp. (百合屬)

Rhizopus necans Mass. (腐敗病) 河南(13).

Lindera communis Hemsl. (香葉樹)

Meliola linderae Yamam. (煤病) 台灣(382).

Phyllosticta nobilis Thuem. 湖南(306)

Lindera glauca Bl. (山胡椒)

Microsphaera benzoinis Tai (白粉病) 安徽(208).

L. glauca Bl. var. **kawakami** Hay.

Guignardia linderae Saw. 台湾(359).

L. oldhami Hemsl.

Cercospora lindericola Yamam. (叶斑病) 台湾(377).

L. strychnifolia F. Villars (烏药)

Asterina sepulta Berk. et Curt. (煤病) 湖南(315).

Puccinia lauricola Cummins (锈病) 广西(244).

L. sp. (山胡椒属)

Asterina linderae Hansf. (煤病) 贵州(254).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 湖南(213), 广西(231).

Puccinia coronopsora Cummins (锈病) 贵州(244).

Uncinula fraxini Miyabe (白粉病) 四川(150, 226).

Linum usitatissimum L. (亚麻)

Cercospora sesami Zimm. (叶斑病) 江苏(106).

Colletotrichum lini (West.) Tochinai (炭疽病) 黑龙江(294).

Fusarium lini Bolley (萎蔫病) 黑龙江(60, 294, 313), 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), 河北(372), 四川(150), ——(135).

Melampsora lini (Ehr.) Lev. (锈病) 黑龙江(294), “东北”(289), 河北(47, 231), 陕西(237), “华北”(341), 新疆(88), 四川(150).

Cuscuta epilinum Weihe (菟丝子) 黑龙江(294), 吉林(294).

L. sp. (亚麻属)

Colletotrichum lini (West.) Tochinai (炭疽病) 台湾(351).

Liquidambar formosana Hance (枫, 枫香)

Cercospora liquidambaris Cke. et Ell. (叶斑病) 台湾(358).

C. tuberculans Ell. et Ev. (叶斑病) 湖南(306).

Didymosporium liquidambaris Teng 江苏(29, 32).

Phyllosticta liquidambaricola Saw. 台湾(358).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 安徽(219), 广西(208).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Elytranthe fordii (Hance) Merrr. (枫寄生) 广西(160).

Liquidambar formosana Hance (枫, 枫香)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).*L. yadoriki* Sieb. (樟寄生) 广西(160).*Viscum articulatum* Burm. f. (无叶枫寄生) 广西(160).**Liriope graminifolia** Baker (麦門冬)*Cercospora liriope* Tai (叶斑病) 江苏(210).*Sphaerulina rhodeae* P. Henn. et Shirai 江苏(103).*Vermicularia ophiopogonis* Pat. 四川(150).**L. minor** Mak. (小麦門冬)*Puccinia ophiopogonis* (Syd.) Cummins (锈病) 台湾(271, 280).**L. sp.** (麦門冬屬)*Vermicularia liliacearum* West. 江苏(103).**Litchi chinensis** Sonn. (荔枝)*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Skierka nephelii* (Saw.) Ito et Murayama 台湾(290, 358).*Cephaleuros virescens* Kunze (藻斑病) 广东(80).**Lithocarpus dealbata** (Hook f. et Thoms.) Rehd. (白欖)*Sphaerotheca lanestris* Harkness (白粉病) 云南(213).**L. uraiianus** Hay.*Septobasidium bogoriense* Pat. (膏药病) 台湾(350).*Uromyces decipiens* Syd. (锈病) 台湾(355).**L. uvariifolia** (Hance) Rehd. (大果石欖)*Cephaleuros virescens* Kunze (藻斑病) 广东(80).**L. variolosa** (Franch.) Chun*Dimerium elegans* Syd. 四川(306).**Litsea citrata** Bl. (山鸡椒)*Meliola litseae* Syd. (煤病) 台湾(380).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).**L. glutinosa** (Lour.) C.B. Rob. (潺橘树)*Phyllachora cantonensis* Syd. (黑痣病) 广东(370).**L. hayata** Kanehira*Meliola neolitseae* Yamam. (煤病) 台湾(382).**L. pungens** Hemsl. (木薑子)*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 广西(208).**L. sp.** (木薑子屬)*Meliola neolitseae* Yamam. (煤病) 台湾(387).*Puccinia morata* Cummins (锈病) 广西(244).

• **Livistona chinensis** R. Br. (蒲葵)

Graphiola cylindrospora Syd. (黑粉病) “华南”(342).

Stylina disticha (Ehr.) Syd. 广东(27,32).

Lobelia pyramidalis Wall. (圓錐半边蓮)

Coleosporium campanulae (Pers.) Lev. (锈病) 江西(245).

Ramularia lobeliae Saw. 台湾(389).

L. radicans Thunb. (半边蓮)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

L. sp. (半边蓮属)

Coleosporium campanulae (Pers.) Lev. (锈病) 貴州(245), 广西(245).

Puccinia aucta Berk. et Mull. (锈病) 河北(171).

Lolium italicum A. Br.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (莖腐病) 台湾(350).

L. multiflorum L. (多花黑麦草)

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 江苏(68,106).

L. perenne L. (黑麦草)

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 江苏(68).

Puccinia coronata Corda (冠锈病) 江苏(68).

Lomatogonium bicoronatum

Puccinia lomatogonii Petr. (锈病) 四川(340).

Lonicera cyanocarpa Franch. (蓝果忍冬)

Rhabdospora decipiens (B. et Cke.) Sacc. 云南(306).

L. japonica Thunb. (忍冬, 金銀花)

Puccinia festucae (DC.) Plowr. (锈病) 江苏(32,36).

L. japonica Thunb. var. *sempervillosa* Hay. (毛金銀花)

Cercospora lonicericola Yamam. (叶斑病) 台湾(377).

Cladosporium lonicerae Saw. (叶霉病) 台湾(389).

Irenina lonicerae Yamam. (煤病) 台湾(385).

L. maackii Max. (金銀木)

Melasmia lonicerae Jacz. 吉林(313).

Puccinia festucae (DC.) Plowr. (锈病) 江苏(218).

Septoria lonicerae-maackii Miura (斑枯病) 辽宁(313).

Rhytisma lonicericola P. Henn. (黑痣病) 吉林(313), “西康”(57), 河南(13).

- Lonicera maximowiczii** Max. (紫枝金銀花, 麦毛忍冬)
Leptostroma lonicericolum Rab. 陝西(237).
- L. modesta** Rehd.
Melasmia loniceriae Jacz. 江西(340).
- L. orientalis** Lam.
Leptostroma lonicericolum Rab. 陝西(237).
- L. stephanocarpa** Franch. (冠果忍冬)
Phyllachora xylostei (Fr.) Fuck. (黑痣病) 陝西(237).
- L. trichosantha** Bur. et Franch. (毛花忍冬)
Rhytisma lonicericola P. Henn. (黑痣病) 云南(306)
- L. vesicaria** Kom.
Phyllosticta caprifolii (Opiz.) Sacc. 辽宁(313).
- L. sp.** (忍冬属)
Irenina loniceriae Hansf. (煤病) 貴州(204).
Melasmia loniceriae Jacz. (黑痣病) “西康”(340).
Rhytisma lonicericola P. Henn. (黑痣病) 河北(315).
- Lophatherum gracile** Brongn. (淡竹叶)
Balansia andropogonis Syd. 台湾(360).
- L. gracile** Brongn. var. *elatum* Hack. (淡竹叶)
Puccinia lophatheri (Syd.) Hirat. (锈病) 台湾(290).
- L. gracile** Brongn. var. *genuinum* Hack. (滇竹叶)
Puccinia lophatheri (Syd.) Hirat. (锈病) 台湾(290).
- Loropetalum chinense** Oliv. (繼花, 繼木, 拟金縷梅)
Loranthus maclurei Merr. (榔榆寄生) 广西(160).
- Luffa acutangula** Roxb. (广东絲瓜)
Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) 湖南(112), “华南”(342).
Pseudomonas lachrymans (Smith et Bryan) Carsner (角斑病) “西康”(57).
- L. cylindrica** Roem. (絲瓜)
Cercospora citrullina Cke. (白星病) 辽宁(294), 云南(215), 广西(30, 32, 37).
Choanephora cucurbitarum (B. et R.) Thaxt. (花腐病) 四川(221).
C. manshurica (Saito et Nagatomo) Tai (花腐病) 四川(150).
Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst. (炭疽病) 四川(221).

Luffa cylindrica Roem. (絲瓜)*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台灣(350).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 山西(319).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 四川(150).*P. sasakii* (Shirai) Ito 台灣(350).*Pseudoperonospora cubensis* (Berk, et Curt.) Rost. (霜霉病) “东北”(287), 四川(221), 江苏(128, 220), 福建(10), 广西(37), 台灣(287, 356).*Pythium aphanidermatum* (Eds.) Fitz. (綿腐病) 河北(116), 江苏(128).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(294), 四川(150).**Lychnis cognata** Max. (淺裂剪秋羅)*Septoria lychnidis* Desm. (斑枯病) 辽宁(313).**L. senno** Sieb. et Zucc. (剪秋羅)*Septoria lychnidis* Desm. (斑枯病) 河北(317).**L. sp.**(剪秋羅屬)*Uromyces crassivertex* Diet. (銹病) 江西(246).**Lycianthes biflora** Bitter (十萼茄)*Cercospora atro-marginalis* Atk. (葉斑病) 台灣(360).**Lycium chinense** Mill. (枸杞)*Cercospora chengtzensis* Tai (葉斑病) 四川(150, 215).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).*Peronospora lycii* Ling et M. C. Tai (霜霉病) 四川(150, 155).**Lycopersicum esculentum** Mill. (番茄)*Alternaria dauci* (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (早疫病) 黑龍江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 內蒙(372), “熱河”(294, 345), 河北(373), 陝西(16), 新疆(88), “西康”(57), 四川(75, 150, 230), 湖南(112), 山東(374), 安徽(374), 江苏(128), “華南”(342).*A. tenuis* Nees (黑斑病) 四川(150, 230).*A. tomato* (Cke.) Jones (黑斑病) 吉林(294), 辽宁(294), 熱河(294), 河北(166), 山東(14), 江苏(106), 福建(10).*Ascochyta lycopersici* Brun. (灰腐病) 四川(150, 230).*Botryosporium pulchrum* Corda (果腐病) 河南(13), 福建(10, 121).

Lycopersicum esculentum Mill. (番茄)

- Cercospora diffusa* Ell. et Ev. (叶斑病) 广西(215).
C. fuligena Roldan (叶斑病) 湖南(112), ———(239).
Cladosporium fulvum Cke. (黑霉病) 江苏(128).
Colletotrichum lycopersici Chester (炭疽病) 四川(150, 230).
C. nigrum Ell. et Halst. (= *Vermicularia capsici* Syd.) (炭疽病) 四川(150, 230).
C. phomoides (Sacc.) Chester (炭疽病) 河南(13).
Corticium centrigenum (Lev.) Bres. (立枯病) 四川(75, 150, 230), 台湾(350).
Diplodina destructiva (Plowr.) Petr. (黑腐病) 四川(150, 230).
Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 台湾(350).
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ———(135).
F. bulbigenum Cke. et Mass. var. *lycopersici* (Brushi) Wr. et Reink. (萎蔫病) 四川(150), 江苏(128), 福建(10), 广东(141), ———(135).
F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ———(135).
F. oxysporum Schlecht. (萎蔫病) ———(135).
F. semitectum Berk. et Rav. ———(135).
Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (炭疽病) 四川(150, 230).
Helminthosporium carposaprum Poll. (灰斑果腐病) 四川(91).
Myrothecium roridum (Tode) Fr. (漆腐病) 四川(150, 229, 230).
Nematospora coryli Peglion (酸腐病) 四川(150, 230).
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 吉林(294), “热河”(345), 四川(150, 230), 福建(10, 121).
Phyllosticta lycopersici Peck 福建(10, 121), 台湾(358).
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (晚疫病) 河北(315), 云南(212), 台湾(237).
P. lycopersici Saw. 台湾(358).
P. parasitica Dast. 陕西(16), 四川(150, 230).
Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (绵腐病) 四川(150, 230), 台湾(359).

Lycopersicum esculentum Mill. (番茄)

Pythium deBaryanum Hesse (苗立枯病) 吉林(294), “热河”(345).

Rhizopus nigricans Erh. (軟腐病) 山东(14).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128), 台湾(350).

Septoria lycopersici Speg. (斑枯病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), 内蒙(372), “热河”(294), 河北(116, 373), 陕西(16), 四川(75, 150, 230), 云南(111, 112, 212), 贵州(174), 河南(13), 江苏(128), 广西(178).

Stemphylium solani Weber (*Thyrosopora solani* (Weber) Saw.) 台湾(355).

Trichothecium roseum (Bull.) Link (腐敗病) 四川(221).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 陕西(16).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 四川(230).

Oospora lactis Fr. var. *parasitica* Pritchard et Porte (水腐病) 四川(150, 230).

Phytobacter lycopersicum Groe. (果斑病) 河南(13).

Pseudomonas tomato (Okabe) Breed et al. (細菌性叶斑病) 台湾(327).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (枯萎病) 四川(75), 湖北(138), 湖南(112), 安徽(138), 江苏(128, 138), 浙江(138), 江西(138), 福建(10, 113), 广东(112), “华南”(342).

X. vesicatoria (Doidge) Dowson (疮痂病) 辽宁(138), 湖南(112).

Cucumis virus 1 (花叶病) 陕西(16), 四川(75, 230), 江苏(228).

Lycopersicon virus 1 (条斑病) 陕西(16), 四川(75).

Lycopersicon virus 3 (斑枯病) 四川(132, 230).

Lycopersicon virus 6 (丛枝病) 陕西(16), 四川(230).

Nicotiana virus 1 (花叶病) 河北(184), 山西(319), 陕西(16), 四川(230), 河南(127), 山东(127), 江苏(127), 浙江(127), 福建(10, 113), 广东(141).

Complex of *Solanum virus 1* and *Nicotiana virus 1* (条紋毒素病) 四川(230), 江苏(127).

Coconema radicibola (Greef) Cobb (根瘤病) 福建(10).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Lycopersicum esculentum Mill. (番茄)

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95), 广东(100, 141).

花腐病 (Bottom rot) 陝西(16), 四川(230).

蒂腐病 (Blossom-end-rot) 四川(75), 貴州(196), 福建(10).

Lycopus europaeus L. (欧地瓜儿苗)

Puccinia menthae Pers. (锈病) 安徽(246).

Lycoris radiata Herb. (石蒜)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

Lygodium microstachyum Desv. (海金砂)

Cercospora lygodii Saw. (叶斑病) 台湾(360).

Lyonia ovalifolia (D. Don.) H.-M. (南烛, 緞木)

Exobasidium pieridis P. Henn. (餅病) 台湾(355).

Maackia amurensis Rupr. et Max. (高丽槐, 懷槐, 朝鮮槐)

Cercospora cladrastidis Jacz. (叶斑病) 吉林(313), 辽宁(313).

Uromyces amurensis Komar. (锈病) 辽宁(313).

Macaranga tanarius Muell.-Arg. (血桐)

Cercospora macarangae H. et P. Syd. (叶斑病) 台湾(355).

Machilus arisanensis Hay. (阿里山桢楠)

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(382).

M. bournei Hemsl. (桢楠)

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 四川(214).

M. kusanoi Hay.

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Cercospora machili Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Helminthosporium machili Saw. 台湾(359).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(382).

M. makinoi Hay.

Stagnospora machili Saw. 台湾(359).

M. pseudo-longifolia Hay. (假长叶桢楠)

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Gloeosporium machili Saw. (炭疽病) 台湾(359).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(382).

M. thunbergii Sieb. et Zucc. (紅楠, 豬脚楠)

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(382).

Stagnospora machili Saw. 台湾(359)

Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. var. **kwashotensis** Yamam.

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

M. zuihoensis Hay.

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(382).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

M. sp. (楨楠属)

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 四川(150).

Aegerita webberi Fawcett 广西(231).

Melanopsichium inouyei (P. Henn. et Shirai) Ling (黑粉病) 四川(149,150,153).

Meliola machili Yamam. (煤病) 台湾(387).

Puccinia machili Cummins (锈病) 广西(244).

P. machilicola Cummins (锈病) 贵州(244).

Magnolia coco DC. (夜香木兰,夜合花)

Macrophoma magnoliae Saw. 台湾(358).

Phyllosticta magnoliae-pumilae Saw. 台湾(359).

P. yugokwa Saw. 台湾(358).

M. grandiflora Linn. (洋玉兰)

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

M. sp. (木兰属)

Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. 江苏(29,32).

Phyllosticta magnoliae Sacc. 广东(29,32).

Mahonia bealei Carr. (阔叶十大功劳)

Asterina mahoniae Keissl. (煤病) 湖南(304,306).

M. fortunei Mouill (细叶十大功劳)

Puccinia graminis Pers. (锈病) 四川(150,214).

P. graminis tritici Erikss. et Henn. (锈病) “西康”(148), 四川(148),湖北(148).

M. lomariifolia Takeda (十大功劳)

Gambleola cornuta Mass. (锈病) 台湾(289).

Mallotus cochinchinensis Lour. (白叶子)

Irenina mallotica Yamam. (煤病) 台湾(381).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

M. japonicus Muell.-Arg. (野梧桐,楸)

Cercospora malloti Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(357,358,378).

Mallotus japonicus Muell.-Arg. (野梧桐, 楸)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 台湾(350).*Irenina mallotica* Yamam. (煤病) 台湾(381).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Pucciniastrum malloti* Hirat. (锈病) 台湾(269, 278, 289).*Uredo malloti* P. Henn. (锈病) 台湾(359).**M. philippensis** (Lam.) Muell. (粗糠柴, 加麻刺)*Irenina subapoda* (Syd.) Stev. (煤病) 台湾(380).**M. repandus** Muell.-Arg. (山岩枫)*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).**M. sp.** (野桐属)*Meliola mallotica* Yamam. (煤病) 台湾(387).*Phakopsora malloti* Cummins (锈病) 贵州(245).**Malus asiatica** Nakai (沙果, 花红)*Coniothyrium pirinum* (Sacc.) Sheld (白星病) 河北(222).*Diplodia natalensis* Evans (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (蒂腐病) 四川(150).*Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fuck. (*Venturia inaequalis* (Cke.) Wint.) (煤斑病) 云南(212).*Gloeosporium album* Osterw. (炭疽病) 四川(150).*Glomerella cingulata* (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 江苏(201).*Gymnosporangium yamadai* Miyabe (锈病) 河北(231), 四川(91), 云南(212), 江苏(201).*Macrophoma kawatsukai* Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 四川(150).*Marssonina mali* (P. Henn.) Ito (褐斑病) 河北(222), 四川(221).*Penicillium expansum* Link (青霉病) 江苏(122).*Phyllosticta pirina* Sacc. (灰斑病) 河北(222).*Podosphaera leucotricha* (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 云南(212).*Valsa mali* Miyabe et Yamada (腐烂病) 河北(222).

花脸, 锈果(病毒病害) 遼宁(46), 河北(46, 222), 山西(46), 陕西(46), 甘肃(46), 山东(46).

Malus baccata (L.) Borkh. (山荆子, 山定子)

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose)
(輪紋病) 四川(150).

花臉, 銹果(病毒病害) 遼寧(46), 河北(46), 山西(46), 陝西(46), 甘肅(46), 山東(46).

M. baccata (L.) Borkh. var. **mandshurica** Schneid. (山荆子, 棠梨木)

Phleospora microspora Miura 遼寧(313).

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 遼寧(313).

M. halliana Koehn. var. **spontanea** Rehd. (白花垂絲海棠)

Gymnosporangium yamadai Miyabe (銹病) “東北”(290).

M. manshurica Koehne.

Marssonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 遼寧(313), “東北”(294).

Monochaeta mali (Ell. et Ev.) Sacc. (褐斑病) “東北”(313).

M. prunifolia Borkh. (海棠果)

Gymnosporangium yamadai Miyabe (銹病) ——(245).

Marssonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 河北(222).

Valsa mali Miyabe et Yamada (腐爛病) 河北(222).

花臉, 銹果(病毒病害) 遼寧(46), 河北(46), 山西(46), 陝西(46), 甘肅(46), 山東(46).

M. pumila Mill. (蘋果)

Alternaria mali Roberts (輪斑病) 遼寧(96), 河北(222, 321), 山西(321), 四川(150), 雲南(111, 112, 212), 山東(321).

Aspergillus fumigatus Fres. 四川(150).

A. luchuensis Inui 四川(150).

A. luteo-niger (Lutz.) Thom. et Church 江蘇(122).

A. niger van Tiegh. 江蘇(122).

Botryosphaeria ribis (Tode) Gross. et Dugg. (干腐病) 遼寧(96).

Cercospora mali Ell. et Ev. 湖南(316).

Coniothecium chomathosporium Corda (粗皮病) 遼寧(96).

Coniothyrium pyrinum (Sacc.) Sheld. 河北(116, 222, 321), 山西(321), 山東(321).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. (*Venturia inaequalis* (Cke.) Wint.) (黑星病) 河北(47), 新疆(88), 雲南(212), 河南(13), 山東(10), 江蘇(128).

Malus pumila Mill. (苹果)

- Gloeodes pomigena* (Schw.) Colby. (煤污病) 遼宁(96).
Gloeosporium album Osterw. (炭疽病) 四川(150).
Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病)
遼宁(96), 河北(222, 321), 四川(75), 山东(10), 江苏(128).
Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 河北(166).
G. yamadai Miyabe (锈病) “东北”(272), 河北(20, 32, 36, 116, 222, 321), 四川(150), 河南(13), 山东(10, 321), 江苏(32, 36, 128, 201).
Hendersonia mali Thuem. 河北(321), 山东(321).
Leptothyrium pomi (M. et F.) Sacc. (煤点病) 遼宁(96), 河北(116), 江苏(128).
Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (輪紋病) 遼宁(96), 四川(150, 224).
Marssonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 遼宁(96), 河北(222, 321), 四川(75, 150), 湖北(316), 山东(10, 321).
Monochaeta mali (Ell. et Ev.) Sacc. (褐斑病) 云南(111, 112).
Mycosphaerella pomacearum (Corda) Sacc. (圓星病) 河北(315, 321), 山东(321).
Penicillium expansum Link (青霉病) 遼宁(96), 四川(150).
Pestalotzia traverseta Sacc. 四川(150).
Phomopsis truncicola Miura (胴枯病) 遼宁(96), 山东(10).
Phyllosticta mali Pril. et Delacr. (灰斑病) 云南(111, 112), 江苏(128), 福建(10).
P. pirina Sacc. (灰斑病) 遼宁(96), 河北(222, 321), 山东(11, 321).
P. solitaria Ell. et Ev. (圓斑病) 山东(11).
P. turmanensis Miura (叶斑病) 遼宁(96).
Phytophthora cactorum (Lebert et Cohn.) Schroet. 台湾(287).
P. parasitica Dast. 四川(150).
Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 遼宁(96), 新疆(88), 貴州(174), 山东(11).
P. oxycanthae (DC.) de Bary (白粉病) 江苏(106).

Malus pumila Mill. (苹果)

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 遼宁(96), 河北(222), 四川(150).

Rosellinia necatrix (R. Hart.) Berl. (白紋羽病) 山东(11).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 云南(112, 212), 江苏(128).

S. laxa Aderh. et Ruhl. f. *mali* (Worm.) Harrison (花腐病) 山东(11).

S. mali Takahashi (花腐病) 山东(11).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 遼宁(96), 河北(222, 315, 321), 河南(13), 江苏(32, 128).

Stagonospora prominula (Berk. et Curt.) Sacc. — (315).

Trichothecium roseum (Bill.) Link (果腐病) 四川(150).

Valsa mali Miyabe et Yamada (腐烂病) 遼宁(96), 河北(221, 222), 山西(321), 新疆(88), 山东(11, 321), 江苏(128).

Agrobacterium rhizogenes (Riker et al.) Conn. (細菌性毛根病) 遼宁(96, 138).

A. tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 遼宁(96, 138), 河北(222), 陝西(138), 山东(11), 江苏(128).

Pseudomonas sp. 云南(111).

花叶病(Mosaic) 河北(116).

花脸, 锈果(病毒病害) 遼宁(46, 96), 河北(46, 222), 山西(46), 陝西(46), 甘肃(46, 167), 山东(11, 46).

小叶黄化病(Rosette). 河北(222, 321), 山东(11).

缺 B 河北(222), 山东(11).

缺 Fe 山东(11).

缺 K 山东(11).

缺 Zn 河北(222), 山东(11).

水心病(非侵染性病害) 遼宁(96).

泡肿病(非侵染性病害) 山东(11).

虎皮病(非侵染性病害) 遼宁(96).

苦陷病(非侵染性病害) 遼宁(96), 山东(11).

蜜果病(非侵染性病害) 山东(11).

縮果病(非侵染性病害) 遼宁(96).

橡皮病(非侵染性病害) 遼宁(96).

Malus pumila Mill. var. *domestica* Schneid. (苹果)

Alternaria mali Roberts (輪斑病) 遼寧(294,313), “热河”(294).

Aspergillus luteo-niger (Lutz.) Thom. et Church 江苏(122).

A. niger van Tiegh. 江苏(122).

Botryosphaeria ribis (Tode) Gross. et Dugg. (胴腐病) 遼寧(294).

Cercospora mali Ell. et Ev. 遼寧(294,313).

Coniothecium chomatosporum Corda (粗皮病) 遼寧(294,313).

Coniothyrium pyrinum (Sacc.) Sheld. 遼寧(294,313).

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台灣(350).

Coryneum foliicolum Fuck. 遼寧(313).

Diaporthe pomigena (Schw.) Miura (黑点病) 遼寧(294,313).

Endomycopsis mali (Lewis) Dekker (厚皮性腐敗病) 遼寧(294,313).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 遼寧(294), 江苏(122).

Gymnosporangium yamadai Miyabe (銹病) 吉林(294,313), 遼寧(272,294,313).

Haplosporella mali (West.) Pet. et Syd. 山东(374).

Helicobasidium mompa Tanaka (紫紋羽病) 遼寧(294).

Leptosphaeria mandshurica Miura 黑龙江(294,313).

Marssonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 黑龙江(294), 遼寧(294,313).

Mycosphaerella pomacearum (Corda) Sacc. 山东(374).

Penicillium expansum Link (青霉病) 遼寧(294,313), 江苏(122).

P. frequentans Westlings var. 江苏(122).

P. islandicum Sopp. 江苏(122).

Pestalozzia malicola Hori (大星病) 遼寧(294).

Phyllosticta mali Pril. et Delac. (叶枯病) 遼寧(294,313).

P. pirina Sacc. (褐紋病) 遼寧(294,313).

P. turmanensis Miura 遼寧(294,313).

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 遼寧(294,313).

Malus pumila Mill. var. **domestica** Schneid. (苹果)

Sclerotinia kenjiana Miura (花腐病) 遼宁(294,313).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 遼宁(294,313).

Trichothecium roseum (Bull.) Lk. (果腐病) 遼宁(294,313), 江苏(122).

Valsa mali Miyabe et Yamada (腐烂病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294,313), 河北(374).

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 遼宁(294).

花脸, 锈果(病毒病害) 遼宁(294).

护膜病(非侵染性病害) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294).

缩果病(非侵染性病害) 遼宁(294).

M. pumila Mill. var. **tomentosa** Koch.

Massonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 云南(111,112).

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 云南(112).

M. sieboldii (Reg.) Rehd.

Gymnosporangium yamadai Miyabe (锈病) “东北”(290).

Podosphaera oxycanthae (DC.) de Bary (白粉病) 河北(317).

M. spectabilis Borkh. (海棠)

Botryosphaeria ribis (Tode) Gross. et Dugg. (胴腐病) 河南(374).

Cercospora mali Ell. et Ev. 山东(374).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 河北(116).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 浙江(8).

G. yamadai Miyabe (锈病) 河北(64,116,317), 河南(13,374), 江苏(209).

Leptothyrium pomi (Mon. et Fr.) Sacc. (煤点病) 河北(116).

Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. (白粉病) 云南(213).

M. sp. (苹果属)

Coniothyrium pirinum (Sacc.) Sheld. 河北(222).

Fusicladium dentriticum (Wallr.) Fuck. (*Venturia inaequalis* (Cke.) Wint.) (黑星病) 河北(51).

Malus sp. (苹果属)

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 河北(51).

Gymnosporangium yamadai Miyabe (锈病) “东北”(66), 河北(20), 河南(47, 66).

Leptothyrium pomi (Mon. et Fr.) Sacc. (煤点病) 河北(51).

Marssonina mali (P. Henn.) Ito (褐斑病) 河北(222).

Penicillium expansum Link (青霉病) 江苏(122).

Phyllosticta mali Patt. et Delac. (叶斑病) 河北(51).

P. pirina Sacc. (灰斑病) 河北(222).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 河北(51).

Valsa mali Miyabe et Yamada (腐烂病) 山东(51).

花脸, 锈果(病毒病害) 河北(222).

Malva sylvestris L. (锦葵)

Cercospora althaeina Sacc. (叶斑病) 河北(315, 316).

Colletotrichum malvarum Southworth (炭疽病) 四川(150).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Puccinia malvacearum Mont. (锈病) 四川(91).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (绵腐病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

M. verticillata L. (冬葵, 冬苋菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Malvastrum tricuspidatum A. Gray (赛葵)

Kuehneola malvicola Arthur (锈病) 台湾(290).

Mangifera indica L. (芒果, 檳果, 檬果)

Cercospora mangiferae Koord. (叶斑病) 台湾(358, 377).

Gloeosporium mangiferae P. Henn. (炭疽病) 浙江(8, 49, 55).

Meliola mangiferae Earle (煤病) 台湾(380).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Pestalozzia paucisetia Sacc. “华南”(342).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

Pleurococcus sp. (绿藻寄生) 广东(80).

Manihot utilissima Pohl. (木薯, 参茨)

Cercospora henningsii Allesch. (*Mycosphaerella manihotis* Syd.) 广东(215, 344, 352), 台湾(350), “华南”(342).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (茎腐病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Stilbonectria lateritia (Berk.) Karst. 广东(344).

M. sp. (木薯属)

Cercospora henningsii Allesch. (*Mycosphaerella manihotis* Syd.) (叶斑病) 广西(30, 32).

Maranta arundinacea L. (竹筴, 葛郁金)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Marsilea quadrifolia L. (四叶草)

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Medicago edgeworthii

Pseudopeziza trifolii (Biv. et Bern.) Fuck. “西康”(340).

M. hispida Gaertn. (南苜蓿)

Colletotrichum medicaginis-denticulatae Saw. (炭疽病) 台湾(356).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150), 台湾(350).

Peronospora aestivalis (Syd.) Gaum. (霜霉病) 四川(150), “东北”(287).

M. lupulina L. (天蓝, 天蓝苜蓿, 黑荚苜蓿)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(172).

Uromyces striatus Schroet. (锈病) 陕西(237), 贵州(246).

M. sativa L. (紫苜蓿, 苜蓿)

Cercospora medicaginis Ell. et Ev. (叶斑病) “华南”(342).

Colletotrichum trifolii Bain (炭疽病) 江苏(68).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Diplodia medicaginis 江苏(68).

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 吉林(294).

E. polygoni DC. (白粉病) 新疆(88), 安徽(219), 江苏(106).

Mycosphaerella davisii F. R. Jones 新疆(88).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Medicago sativa L. (紫苜蓿, 苜蓿)

Peronospora aestivalis (Syd.) Gaum. (霜霉病) 黑龙江(294), 吉林(43a, 294), 辽宁(294), “东北”(287), 河北(373), 新疆(372), 江苏(68).

P. trifoliorum de Bary (霜霉病) 新疆(88), 江苏(106), “华南”(342).

Pyrenopeziza medicaginis (Lib.) Fuck. (黄斑病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 山东(47), 江苏(68).

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Stemphylium botryosum Wallr. (輪斑病) 江苏(68).

Uromyces striatus Schroet. (锈病) 辽宁(294), “东北”(272, 290), “热河”(294), 河北(63, 171), 新疆(88), 江苏(32, 3, 68, 106, 205), 台湾(280, 290, 359).

Pseudomonas medicagenis Sackett. (細菌性莖疫病) 黑龙江(138).

Xanthomonas alfalfae (Riker, Jones, Davis) Dowson (細菌性叶斑病) 江苏(68, 138).

花叶病(Mosaic) 江苏(127).

M. sp. (苜蓿属)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Uromyces striatus Schroet. (锈病) 河南(13).

Melampyrum roseum Max. (山蘿花)

Coleosporium melampyri (Rebent.) Klebahn. (锈病) “东北”(272), 辽宁(313), 浙江(32, 36).

Phyllosticta melampyricola Miura 吉林(313).

Septoria melampyri Straas. (斑枯病) 吉林(313).

Melandryum apricum Rohrb. (女娄菜)

Septoria lychnidis Desm. (斑枯病) 山西(340).

Melastoma candidum Don. (野牡丹)

Cercospora melastomobia Yamam. (叶斑病) 台湾(537, 359).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

M. candidum Don. var. nobotan Mak.

Cercospora melastomobia Yamam. (叶斑病) 台湾(358).

Phyllachora melastomae-candidae Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Physalospora melastomatis Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Melastoma sp. (野牡丹属)

Munkiodothis melastomata (Hoehn.) Theiss. et Syd. 广东 (32, 187, 362).

Melia azedarach L. (楝树)

Cercospora subsessilis H. et P. Syd. (叶斑病) 四川(150), 云南(215), 湖北(231), 河南(13), 江苏(29, 32, 231), 福建(215), 广东(29, 32, 231), 广西(32, 362), 台湾(355).

Melanconium meliae Teng 江苏(29, 32).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).

M. sp. (楝属)

Cercospora subsessilis H. et P. Syd. (叶斑病) 江西(240).

Melica nutans L.

Puccinia melicae (Erikss.) Syd. (锈病) 辽宁(313).

M. sp.

Puccinia rangiferina Ito (锈病) 河北(316).

Melilotus alba Desr. (白香草木犀)

Uromyces baeumlerianus Bubak (锈病) 江苏(68).

花叶病 (Mosaic) 江苏(127).

M. indica (L.) Allesch. (印度草木犀, 苦草)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150), 云南(112).

Peronospora meliloti Syd. (霜霉病) 四川(150).

Uromyces baeumlerianus Bubak (锈病) 河北(374), 四川(150), 河南(47).

Pseudomonas syringae van Hall. (褐斑病) 云南(112).

M. officinalis Desr. (草木犀)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(172).

Uromyces baeumlerianus Bubak (锈病) 江苏(68).

M. suaveolens Ledeb. (草木犀, 野草木犀)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313).

M. sp. (草木犀属)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 湖南(317).

E. polygoni DC. (白粉病) 云南(111).

Pseudomonas syringae van Hall. (褐斑病) 云南(111).

Meliosma cuneifolia Franch. (泡花树)

Aecidium meliosmae-pungentis P. Henn. et Shirai (锈病) 浙江(231).

Meliosma kirkii Hemsl. et Wils. (山青木)*Aecidium meliosmae* Keissler (锈病) 广东(303).**M. myriantha** Sieb. et Zucc. (泡吹, 山东泡花树)*Aecidium meliosmae-myrianthae* P. Henn. et Shirai (锈病) 江苏(32,36), 浙江(32,36).**M. oldhami** Miq. (南京珂楠树)*Phakopsora meliosmae* Kusano (锈病) 安徽(245).**M. parviflora** le Comte (蒙刺藤)*Aecidium meliosmae-myrianthae* P. Henn. et Shirai (锈病) 江苏(32,36), 浙江(32,36).**M. rhoifolia** Max. (漆叶泡花树)*Phakopsora meliosmae* Kusano (锈病) 台湾(265,289).**M. simplicifolia** Roxb. (单叶泡花树)*Phakopsora meliosmae* Kusano (锈病) 安徽(245).**M. stewardii** Merr. (庐山泡花树)*Aecidium meliosmae* Keissler (锈病) 江西(231).**M. sp.** (泡花属)*Aecidium meliosmae-myrianthae* P. Henn. et Shirai (锈病) 江苏(32,36), 浙江(32,36).*Phakopsora meliosmae* Kusano (锈病) 贵州(245).**Melissa officinalis** L.*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).**Melothria heterophylla** (Lour.) Cogn. (马瓟儿)*Cercospora melothriae* Saw. (叶斑病) 台湾(359).**M. indica** Sour.*Uropyxis arisanensis* (Hirat. et Hash.) Ito et Muray. 广东(389).**M. mucronata** Cogn.*Uropyxis arisanensis* (Hirat. et Hash.) Ito et Muray. 台湾(290).**M. sp.** (马瓟儿属)*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 江苏(219).*Uropyxis arisanensis* (Hirat. et Hash.) Ito et Muray. 云南(214).**Menispermum dahuricum** DC. (蝙蝠葛, 蝙蝠藤)*Cercospora menispermii* E. et H. (叶斑病) 辽宁(313).*Microsphaera alni* (Wallr.) Salm. (白粉病) 河北(135).*Septoria menispermii* Thuem. (斑枯病) 辽宁(313), 河北(340).

Menispermum diversifolium (Miq.) Gagn.

Septoria menispermii Thuem. (斑枯病) “热河”(316).

Mentha arvensis L. (薄荷)

Puccinia menthae Pers. (锈病) 吉林(62), “西康”(57), 四川(194), 江苏(47, 231), 浙江(8), 台湾(290).

M. arvensis L. subsp. *haplocalyx* Briq.

Puccinia menthae Pers. (锈病) 山西(340).

M. arvensis L. subsp. *haplocalyx* Briq. var. *sachalinensis* Briq.

Puccinia menthae Pers. (锈病) 黑龙江(313), 吉林(313).

M. arvensis L. var. *piperascens* Malinvaud (薄荷)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (草腐病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(356).

M. arvensis L. var. *vulgaris* Benth.

Septoria menthae (Thuem.) Oud. (斑枯病) 台湾(350).

M. piperita L. var. *officinalis* Sol.

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

M. sachalinensis Kudo

Puccinia menthae Pers. (锈病) 黑龙江(294), 吉林(294), “东北”(272).

M. sylvestris L.

Puccinia menthae Pers. (锈病) 新疆(67).

M. sp. (薄荷属)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 湖南(317).

Puccinia menthae Pers. (锈病) “热河”(317), 新疆(88), 浙江(32, 36).

Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc. (山靛)

Uromyces mercurialis P. Henn. (锈病) 浙江(66), 台湾(271, 290).

Metaplexis japonica (Thunb.) Mak. (蘿藦)

Cercospora miurae Syd. (叶斑病) 辽宁(313).

Michelia alba DC. (白蓝)

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

M. figo (Lour.) DC. (含笑)

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

M. fascata Bl. (含笑花)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350.)

Michelia sp. (含笑属)*Phyllosticta magnoliae* Sacc. 广东(29,32).**Microstegium ciliatum var. wallichiana Hack.***Balansia andropogonis* Syd. 台湾(360).*Cerebella paspali* Cke. et Mass. 台湾(360).*Phyllachora microstegii* Saw. (黑痣病) 台湾(360).*Puccinia pollinae-imberbis* Hirat. f. (锈病) 台湾(290).**M. vimineum A. Camus (莠竹)***Puccinia pollinae* Barcl. (锈病) 云南(214)..*P. pollinae-imberbis* Hirat. f. (锈病) 贵州(247), 安徽(247), 台湾(269).*P. polliniicola* Syd. (锈病) 台湾(247).**M. vimineum A. Camus var. imberbe Honda***Puccinia pollinae-imberbis* Hirat. f. (锈病) 台湾(247, 269, 290).**M. vimineum A. Camus var. typicum Honda***Puccinia pollinae-imberbis* Hirat. f. (锈病) 台湾(290).**M. sp. (莠竹属)***Phyllachora leptotheca* Theiss. et Syd. (黑痣病) 湖南(32,187), 福建(32,187).*Puccinia pollinae* Barcl. (锈病) 安徽(247).**Millettia reticulata Benth. (昆明鸡血藤, 鸡血藤)***Meliola banosensis* Syd. (煤病) 台湾(380).*Ravenelia millettiae* Hirat. et Hash. (锈病) 台湾(290, 355).*Uromyces amurensis* Komar. (锈病) 广西(246).**M. taiwaniana Hay. (台湾崖豆藤)***Cryptocoryneum millettiae* Saw. 台湾(359).*Hapalophragmium kawakamii* Hirat. et Hash. (锈病) 台湾(290).**M. sp. (鸡血藤属)***Meliola banosensis* Syd. (煤病) 台湾(387).**Miscanthus anomala Steud.***Sphacelotheca miscanthi* Yen (黑粉病) 四川(153), 山东(153,198).**M. floridulus (Labill.) Warb. (五节芒)***Ustilago kusanoi* Syd. (黑粉病) 贵州(153), 江苏(153), 浙江(153), 福建(153), 台湾(153).

Miscanthus japonicus (Thunb.) Anders. (日芒)*Balansia andropogonis* Syd. 台湾(360).*Cercospora miscanthi* Saw. (叶斑病) 台湾(360).*Cerella paspali* Cke. et Mass. 台湾(360).*Claviceps misonathi* Saw. (麦角病) 台湾(360).*Meliola andropogonis* Stev. et Roldan (煤病) 台湾(380).*M. panici* Farle (煤病) 台湾(380).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Phyllachora miscanthi* Syd. (黑痣病) 台湾(360).*P. miscanthi-japonici* Saw. (黑痣病) 台湾(358).*Puccinia erythropus* Diet. (锈病) 四川(214), 湖南(214).*P. miscanthi* Miura (锈病) 湖南(214), 台湾(290).*Sclerospora miscanthi* T. Miyake (霜霉病) 台湾(287, 292).**M. sinensis** Anders. (荻, 芒)*Balansia claviceps* Speg. 四川(150).*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) 湖北(215), 浙江(47).*P. miscanthi* Syd. (黑痣病) 四川(150), 广东(370), 台湾(360).*Puccinia erythropus* Diet. (锈病) 四川(32, 247), 贵州(246, 247), 湖南(32, 36, 247), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 247), 广东(32, 36, 247).*P. miscanthi* Miura (锈病) 新疆(247), 四川(32, 150), 安徽(47), 江苏(32, 36, 205), 浙江(247), 福建(32, 36, 247).*Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (霜霉病) 台湾(287).*Sclerotrachelum graminis* Fuck. 陕西(237).*Septoria miscanthina* Petr. (斑枯病) 广西(340).*Ustilago kusanoi* Syd. (黑粉病) 贵州(149, 150), 河南(13), 江苏(32, 104, 153), 浙江(32, 104, 153), 福建(153), 台湾(152, 153, 188).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(165).**M. sinensis** Anders. var. *variegatus* Bael. (斑叶芒)*Uredo miscanthi-sinensis* Saw. (锈病) 台湾(290).

Miscanthus sp. (芒属)

Phyllachora miscanthi Syd. (黑痣病) “西康”(57), 广东(32, 187), 广西(32).

Puccinia erythropus Diet. (锈病) 贵州(246, 247), 安徽(246, 247), 江西(246, 247), 广西(246, 247).

P. miscanthi Miura (锈病) 辽宁(313), 四川(247), 贵州(246, 247), 安徽(246, 247), 江西(246, 247), 福建(214), 广西(246, 247), 台湾(290).

Orobancha sp. (列当) 河南(13).

Momodica charantia L. (苦瓜)

Cercospora citrullina Cke. (叶斑病) 四川(150), 湖南(112).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (茎腐病) 台湾(350).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 云南(212).

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) 台湾(356), “华南”(342).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 四川(150).

Momordica charantia L. var. senegalensis Nakai (苦瓜)

Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rost. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

M. cochinchinensis Speng. (木鼈子, 番木鼈)

Cercospora citrulina Cke. (叶斑病) 台湾(359).

Monochoria vaginalis Presl (鴨舌草)

Burrillia ajrekari Thirum. 台湾(152, 153).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Stereosorus monochoriae Saw. 台湾(358).

Morus acidosa Griff. (鸡桑)

Aecidium mori Barcl. (锈病) 云南(214), 台湾(290).

Cephalosporium zonatum Saw. 台湾(350).

Cercospora flexuosa Tanaka (= *Clasterosporium mori* H. et P. Syd.) (叶斑病) 辽宁(294), 台湾(354).

C. missouriensis Wint. (叶斑病) 台湾(350).

C. mori Hara (叶斑病) 台湾(239), 各地(239).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

C. salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

Helicobasidium mompa Tanaka (紫紋羽病) 台湾(350).

Homodendron mori Yendo (捲叶病) 辽宁(294).

Morus acidosa Griff. (鸡桑)*Nothopateella chinensis* Miyake 吉林(294), 辽宁(294).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phakopsora fici-erectae* Ito et Otani (锈病) 台湾(290).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(282, 294), 东北(283), 四川(150, 226), 云南(213), 台湾(283, 356).*Sclerotinia shiraiana* P. Henn. (菌核病) 台湾(350).**M. alba** L. (桑)*Aecidium mori* Barcl. (锈病) 河北(64, 116), 四川(150), 云南(111, 212, 213), 江苏(32, 36, 106, 128, 201), 浙江(8, 49, 54, 64), 福建(10), 广东(233), “华南”(342).*Armillaria mellea* (Vahl.) Fr. (根腐病) 黑龙江(60), “西康”(57).*Ascochyta moricola* Berl. (褐斑病) 四川(150), 江苏(47).*A. morifolia* Saw. (褐斑病) “西康”(57), 台湾(350).*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 台湾(350).*Cercospora flexuosa* Tanaka (= *Clasterosporium mori* H. et P. Syd.) (叶斑病) 辽宁(294, 313), 河北(315), “西康”(57), 四川(150), 贵州(174), 河南(13), 山东(14), 安徽(47), 江苏(29, 32, 106, 201), 福建(10, 121), 广东(233), 台湾(354).*C. mori* Hara (叶斑病) 台湾(239), “各地”(239).*Colletotrichum morifolium* Hara (炭疽病) “西康”(57).*Coniothyrium fusciculatum* Sacc. 河北(317).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(350).*Cylindrosporium mori* (Lev.) Berl. (褐斑病) 四川(150), 云南(111), 河南(13), 江苏(47, 106).*Dilpodia moricola* Cke. et Ell. “西康”(57), 湖北(315), 江苏(29, 32, 128), 广西(344).*Fusarium lateritium* Nees var. *mori* Desm. (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc. var. *moricola* (Ntrs.) Wr.) 云南(212), 贵州(174), 湖南(315), 浙江(8, 49, 54), 广东(344), 台湾(354).*Haplosporella minor* Ell. et Barth. 江苏(103).*Helicobasidium mompa* Tanaka (紫纹羽病) 四川(150), 广东(233), 台湾(350).*Hormodendron mori* Yendo (捲叶病) 辽宁(294).*Leptosphaerulina moricola* Saw. (白星病) 台湾(350).*Macrosporium commune* Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) 江苏(47).

Morus alba L. (桑)

- Massaria moricola* Miyake (拟胴枯病) 浙江(8).
M. phorcioides Miyabe (拟胴枯病) 江苏(22, 32), 浙江(8).
Mitrula shiraiana (P. Henn.) Ito et Imai (= *Microglossum shiraianum* P. Henn.) 四川(156).
Mycosphaerella moricola Saw. 台湾(350).
M. morifolia Pass. 湖北(315).
Nothopateella chinensis Miyake 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), 河北(315).
Ovulariopsis moricola Delacr. (白粉病) 广东(370).
Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).
Periconia pycnospora Fres. 台湾(350).
Phakopsora fici-erectae Ito et Otani (锈病) 云南(212, 214), 江西(245), 广东(344), 台湾(290), “华南”(350).
Phoma morifolia Berl. 江苏(128).
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(294, 313), 河北(20, 116, 166, 172, 197, 208, 231), “西康”(57), 四川(75, 150, 208, 221, 226), 云南(111, 212, 213), 贵州(174, 213), 湖南(208, 213, 315), 河南(13, 208, 219), 安徽(219, 231), 江苏(47, 128, 201, 219), 浙江(219), “华东”(341), 福建(10, 231), 广东(141, 213, 231, 233), 台湾(350); “华南”(342).
Plasmodiophora mori Yendo (肿根病) 河南(13).
Polyporus hispidus (Bull.) Fr. (白色心材腐朽病) 河北(321).
Rosellinia necatrix (Hart.) Berl. (白纹羽病) 江苏(128).
Sclerotinia carunculoides Siegler et Jenkins (菌核病) 贵州(174).
S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏(128), 浙江(8), 台湾(350).
S. shiraiana P. Henn. (菌核病) 四川(150), 江苏(25, 32), 浙江(231), 台湾(350).
Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) “西康”(57), 四川(150), 安徽(47), 江苏(128), 浙江(8), 台湾(350).
S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8), 福建(10), 台湾(351).
Septoria kuwaeicola Yendo (斑枯病) 四川(150).

Morus alba L. (桑)

Spondylocladium mori Saw. 台湾(350).

Uncinula mori Miyake (白粉病) 湖南(315), 山东(321).

Uredo morifolia Saw. (锈病) 台湾(290).

Pseudomonas mori (Boyer et Lambert) Stev. (細菌性疫病)
“西康”(57), 四川(194), 山东(138), 安徽(138), 江苏(128,
138), 浙江(138), 广东(141).

花叶病 (Mosaic) 广东(82, 141).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东(100).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

M. cathayana Hemsl. (葫蘆桑, 华桑)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 广西(208).

M. latifolia Bur. (桑)

Aecidium mori Barcl. (锈病) 广东(234).

Cercospora flexuosa Tanaka (= *Clasterosporium mori* H.
et P. Syd.) (污叶病) 广东(234).

Fusarium lateritium Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.)
Sacc.) (芽枯病) 广东(234).

Helicobasidium mompa Tanaka (紫紋羽病) 广东(234).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 广东(234).

Rosellinia necatrix (Hart.) Berl. (白紋羽病) 广东(234).

M. multicaulis Perr. (白桑)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(356).

M. sp. (桑属)

Aecidium mori Barcl. (锈病) 云南(112).

Cercospora flexuosa Tanaka (= *Clasterosporium mori* H.
et P. Syd.) (叶斑病) 云南(112), 湖南(112).

C. moricola Cke. (黃暈褐斑病) 云南(112).

C. snelliana Reichert 貴州(239).

Cylindrosporium mori (Lev.) Berl. (褐斑病) 云南(112).

Myrosporella miniata Sacc. 江苏(29, 32).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(112).

Phyllosticta kuwaecola K. Hara (褐斑病) 湖南(112).

Mosla chinensis Max. (石薺薺)

Coleosporium perillae Syd. (锈病) 安徽(245).

M. formosana Max.

Coleosporium perillae Syd. (锈病) 台湾(289).

Mosla punctata Max. (石薺蓼)

Coleosporium perillae Syd. (銹病) 湖南(32,36),安徽(32,36),江苏(32,36),浙江(32,36),福建(32,36),广西(32).

M. sp. (石薺蓼屬)

Coleosporium perillae Syd. (銹病) 貴州(245),江西(245),广东(274).

Mucuna ferruginea Mats.

Cercospora stizolobii H. et P. Syd. (叶斑病) 台湾(276).

Muhlenbergia hugelii Trin. (乱子草)

Puccinia sinica Syd. (銹病) 湖北(364),江苏(364).

Muehlenbeckia platycladia Meisn. (竹节蓼)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河南(13).

Puccinia muehlenbeckiae (Cke.) Syd. (銹病) 江苏(214).

Murraya paniculata (L.) Jack. (月橘)

Meliola tenella Pat. (煤病) 台湾(380).

Phytophthora murrayae Saw. (疫病) 台湾(358).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Musa basjoo Sieb. (芭蕉)

Cercospora musae Zimm. (*Metasphaeria musae* (Zimm.) Saw.) (叶斑病) “西康”(57),安徽(374).

Helminthosporium torulosum (Syd.) Ashby (暗斑病) 河南(13).

M. cavendishii L. (粉蕉, 中国香蕉)

Cercospora musae Zimm. (*Metasphaeria musae* (Zimm.) Saw.) (叶斑病) 台湾(358).

C. musaecola Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Derminus musae Saw. 台湾(354).

Helminthosporium torulosum (Syd.) Ashby (暗斑病) 台湾(358).

Marasmius semiustus Berk. et Curt. 台湾(351).

Napicladium musae Saw. 台湾(358).

Pestalozzia leprogena Speg. 台湾(358).

Scolecotrichum musae Saw. 台湾(358).

M. sapientum L. (甘蕉, 香蕉)

Fusarium moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ——(135).

Musa sapientum L. (甘蕉, 香蕉)

F. moniliiforme Sheld. var. *subglutinans* Wr. et Reink.
(*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr. var. *subglutinans* Edwards) ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. ——(135).

Gloeosporium musarum Cke. et Mass. (炭疽病) 广东(79),
台湾(350).

Helminthosporium torulosum (Syd.) Ashby (暗褐斑病)
广东(79).

Macrophoma musae (Cke.) Berl. et Vogl. (果皮黑点病) 广东(79), 台湾(350).

M. sp. (芭蕉属)

Cercospora musae Zimm. (*Metasphaeria musae* (Zimm.)
Saw.) 台湾(359).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (白絹病) 台湾(262).

Gloeosporium musarum Cke. et Mass. (炭疽病) 云南(112,
212), 浙江(8, 49), 福建(10), 广东(76), 台湾(262).

Macrophoma musae (Cke.) Berl. et Vogl. (果皮黑点病) 云南(112), 浙江(8, 49), 江苏(122), 台湾(262).

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 台湾(262).

Thielaviopsis paradoxa (de Seynes) van Hoehn. (*Ceratocystis paradoxa* (Dode) Moreau) (軸腐病) 台湾(262).

Mussaenda parviflora Miq. (玉叶金花)

Coccomyces mussaendae Saw. 台湾(360).

Phyllosticta mussaendae Saw. 台湾(360).

Myoporium bonticoides A. Gray (苦檻蓝)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).

Myrica adenophora Hance var. kusanoi Hay.

Irenina manca (Ell. et Mart.) Stev. (煤病) 台湾(380).

M. rubra Sieb. et Zucc. (楊梅)

Irenina manca (Ell. et Mart.) Stev. (煤病) 台湾(380).

Mycosphaerella myricae Saw. 台湾(358).

Neocapnodium tanakai (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

- Myriopholis dieica** Bge. (螞蚱腿子)
Phakopsora compositarum Miyake (銹病) 河北(64).
- Myrsine africana** L. (鉄仔)
Coryneliospora fructicola (Pat.) Fitz. “西康”(340).
Heydenia myrsinea Keissler 云南(304).
- M. semiserrata** Wall. (刺叶鉄仔)
Heydenia myrsinea Keissler 云南(306).
- M. sp.** (鉄仔属)
Coryneliospora fructicola (Pat.) Fitz. 云南(251).
Irenina manca (Ell. et Mart.) Stev. (煤病) 台湾(387).
- Narcissus poeticus** L. (紅口水仙)
Fusarium bacridioides Wr. ——(135).
- N. tazetta** L. var. *chinensis* Roem. (中国水仙)
Sclerotium ambiguum Duby (菌核病) 四川(150).
Stagnospora narcissi Hallos (斑点病) 福建(10).
- Nasturtium globosum** Turcz. (园果蔊菜)
Peronospora nasturtii-palustris Ito et Tokunaga (霜霉病)
 河北(173).
- N. montanum** Wall. (蔊菜)
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾
 (350).
- N. palustis** (Leyss.) Bess. (风花菜)
Albugo candida (Pers.) Kuntze (白銹病) “东北”(287), 台湾(287).
Peronospora nasturtii-palustris Ito et Tokunaga (霜霉病)
 辽宁(43a).
- Neillia sinensis** Oliv. (尼里亚, 奈尔李)
Erinella neilliae Keissler 湖南(306).
- Nelumbo nucifera** Gaertn. (蓮)
Alternaria nelumbii (Ell. et Ev.) Enlows et Rand. (黑斑病) 河南(374), 安徽(374).
Cercospora nymphaeacea Cke. et Ell. (叶斑病) 河南(374).
Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).
- Neolitsea acuminata** Kanehira et Sasaki
Xenostele litseae (Pat.) Syd. (銹病) 台湾(290).
- N. variabilis** (Hay.) Kaneh. et Sasaki
Meliola neolitseae Yamam. (煤病) 台湾(382).
- N. sp.** (新木薑子属)
Meliola neolitseae Yamam. (煤病) 台湾(387).

Nerium indicum Mill. (夹竹桃)*Cercospora nerii-indici* Yamam. (叶斑病) 台湾(358,377).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**N. odorum** Soland (夹竹桃)*Corticium salmonicolor* Berk. et Br. 台湾(350).*Macrosporium nerii* Cke. (黑斑病) 江苏(29,32).**N. oleander** L. (欧洲夹竹桃)*Cercospora neriella* Sacc. (叶斑病) 台湾(239).**Nicotiana longiflora** Cav. (长花烟草)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 台湾(356).**N. rustica** L. (黄花烟,山菸)*Alternaria longipes* (Ell. et Ev.) Tisd. et Wadk. (黑斑病) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294),“热河”(294).*A. tabacina* (Ell. et Ev.) Hori (黑斑病) 辽宁(294).*Cercospora nicotianae* Ell. et Ev. (白星病) 黑龙江(294),辽宁(294),“热河”(294).*Phyllosticta nicotianae* Ell. et Ev. (斑点病) 辽宁(294),“热河”(294).*Erwinia aroideae* (Townsend) Holl. (软腐病) 黑龙江(294).*Pseudomonas tabaci* (Wolf et Foster) Stev. (野火病) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294).*Nicotiana virus* 1 (烟草花叶病) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294).*Nicotiana virus* 12 (烟草环斑病) 辽宁(294).**N. tabacum** L. (烟草)*Alternaria longipes* (Ell. et Ev.) Tisd. et Wadk. (黑斑病) 黑龙江(294),吉林(294),辽宁(294),“热河”(294,345),河北(116),“华北”(320),“西康”(57),四川(150),云南(212),贵州(174),山东(321,374).*A. tabacina* (Ell. et Ev.) Hori (黑斑病) 辽宁(294),河北(166,197),云南(111,112),湖南(112),河南(13),江苏(106,128),福建(10,183),台湾(309,354).*Ascochyta nicotianae* Pass. (褐斑病) 四川(93,150),台湾(309).*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 四川(75,93,150).*Cercospora nicotianae* Ell. et Ev. (蛙眼病) 黑龙江(294),辽宁(294),“热河”(294,345),“西康”(57),四川(75,93,150),河南(13),江苏(29,32,106,128),福建(10),台湾(309,320,350),“华南”(342).

Nicotiana tabacum L. (烟草)

Colletotrichum nicotianae Averna. (炭疽病) 四川(93), 湖南(112), 江苏(128).

C. tabacum Boning (炭疽病) 四川(150), 山东(92), 台湾(309).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (白絹病) 台湾(320, 350).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 山西(321), “华北”(320), 四川(93), 云南(112, 212, 213), 貴州(174), 台湾(350).

Fumago vagans Pers. (煤病) 台湾(309).

Fusarium oxysporum Schlecht. var. *nicotianae* Johnson (萎蔫病) 山东(302), ——(135).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖腐病) 江苏(19), 山东(19).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 台湾(309).

P. sasakii (Shirai) Ito 台湾(309).

Phyllosticta nicotianae Ell. et Ev. (斑点病) 辽宁(294), “热河”(294), 四川(93, 150), 河南(13).

P. tabaci Pass. (白斑病) 云南(111, 112), 湖南(112).

Phytophthora parasitica Dast. var. *nicotianae* (Breda de Haan) Tucker (黑胫病) “华北”(320), 四川(73, 75, 93, 94, 150), 貴州(94), 河南(94), 山东(94, 101, 321), 安徽(94), 浙江(94), 福建(10), 台湾(309, 320, 358).

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (苗猝倒病) 四川(150), 台湾(309)

P. deBaryanum Hesse (苗猝倒病) 河南(13).

Sclerotinia nicotianae Oud. et Kon. (菌核病) “西康”(57).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(93, 150), 台湾(309).

Septocylindrium areola (Atk.) P. et C. 四川(75).

Erwinia aroideae (Townsend) Holl. (軟腐病) 吉林(294), 辽宁(294), 河北(321), “华北”(320), “西康”(57), 河南(13), 江苏(128), 台湾(309, 320).

Pseudomonas angulata (Fromme et Murr.) Holl. (角斑病) “西康”(57), 四川(138), 云南(112), 河南(138), 山东(138, 320), 安徽(138).

Nicotiana tabacum L. (烟草)

P. cichorii (Sw.) Stapp. 台湾(320).

P. tabaci (Wolf et Foster) Stev. (野火病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 河北(321), “华北”(320), 云南(112), 贵州(196), 湖南(112), 河南(13, 138), 山东(138, 321), 安徽(138), 江苏(128), 台湾(309).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (枯萎病) 河北(321), “西康”(57), 河南(13), 山东(51, 321), 安徽(138), 江苏(128), 台湾(309), “华南”(342), “各地”(320).

Nicotiana virus 1 (烟草花叶病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(345), 河北(51, 320), 山西(319), “华北”(320), “西康”(57), 四川(73, 93), 湖北(127), 河南(13), 山东(51, 127, 320), 福建(10, 183), 广东(82), 台湾(309, 320), “华南”(342).

Nicotiana virus 12 (烟草环斑病) 辽宁(294), 山西(319), “西康”(57), 四川(93, 127), 湖北(127), 河南(13), 山东(51), 台湾(309).

Solanum virus 1 (花叶病) “西康”(57).

Solanum virus 2 (丫花叶病) “西康”(57).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) “华中”(320), 山东(95), 台湾(309, 320), “华南”(320).

缺 K 台湾(309).

缺 N 台湾(309).

Notaphobe konishii Hay.

Meliola sempeiensis Yamam. (煤病) 台湾(383).

Ocimum basilicum L. (罗勒, 零陵香)

Cercospora ocimicola Petrak et Ciff. (叶斑病) 台湾(239).

Oenanthe javanica (Bl.) DC. (水芹)

Puccinia oenanthes-stoloniferae Ito (锈病) 辽宁(313), “东北”(272, 290), 河北(63, 66), 四川(150, 214), 安徽(231), 江苏(231), 台湾(290, 359).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Septoria oenanthis-stoloniferae Saw. (斑枯病) 台湾(358).

Oenanthe sp. (水芹屬)*Puccinia oenanthos-stoloniferae* Ito (銹病) 广西(246).**Oenothera biennis** L. (月見草)*Cercospora oenotherae* Ell. et Ev. (叶斑病) “华北”(258).**O.** sp. (月見草屬)*Cercospora lingi* Tai (叶斑病) 四川(150, 215).*Puccinia oenanthos-stoloniferae* Ito (銹病) 浙江(32, 36).**Ophiopogon japonicus** Ker-Gawl. (沿阶草)*Vermicularia ophiopogonis* Pat. (黑色炭疽病) 湖南(306).**O.** sp. (沿阶草屬)*Cercospora liriopes* Tai (叶斑病) 江苏(210).**Ophiurus monostachys** Presl (单穗蛇尾草)*Sphacelotheca ophiuri* (P. Henn.) Ling (黑粉病) 云南(149, 151, 153).**Oplismenus compositus** (L.) Beauv.*Phyllachora oplismeni-compositi* Saw. (黑痣病) 台湾(360).*Puccinia levigata* (Syd. et Butl.) Hirat. f. (銹病) 台湾(280, 290).**Orchis** sp (紅門兰屬)*Puccinia anhweiana* Cummins (銹病) 安徽(246).**Origanum vulgare** L. (牛至, 馬脚兰)*Puccinia menthae* Pers. (銹病) 安徽(246), 江西(246), 台湾(279).**O.** *vulgare* L. var. *formosanum* Hay. (台湾牛至)*Puccinia menthae* Pers. (銹病) 台湾(290).**O.** sp. (牛至屬)*Puccinia menthae* Pers. (銹病) 貴州(246), 广西(246).**Orthodon lanceolatum** Kudo (石薺苧)*Coleosporium perillae* Syd. (銹病) 四川(150), 台湾(289).**Oryza sativa** L. (水稻)*Achlya prolifera* (Nees) de Bary (稻苗綿腐病) 辽宁(294), “西康”(57), 四川(150).*Acrocylindrium oryzae* Saw. (鞘腐病) 台湾(351).*Alternaria oryzae* Hara 黑龙江(294, 313), 吉林(294), “西康”(57), 四川(90, 91).*A. tenuis* Nees 四川(90, 91).

Oryza sativa L. (水稻)

Brachysporium oryzae Ito et Ishiyama 四川(150), 江苏(29, 32, 223), 广西(32).

B. senegalense Speg. 四川(90, 91).

Cercospora oryzae Miyake (条斑病) 河北(316), 四川(90, 91), 湖南(112), 广西(30, 32), 台湾(351).

Cladosporium herbarum Pers. Link (污点病) 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), “西康”(57), 云南(111, 112), 江苏(223).

Coniothyrium brevisporum Miyabe 江苏(314).

C. japonicum Miyake 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Curvularia geniculata (Fr. et Earle) Boed. 四川(91).

C. lunata (Wakker) Boed. 四川(90, 91), 江苏(97).

Diplodiella oryzae Miyake (谷斑病) 云南(212).

Entyloma oryzae Syd. (叶黑粉病) 吉林(153, 294), 辽宁(153, 294), “西康”(57), 四川(75, 149, 150, 153), 云南(153), 贵州(174), 湖北(153, 223, 231), 湖南(112), 安徽(153, 231), 江苏(128, 153, 223, 231), 浙江(153, 223, 231), 江西(153, 231), 福建(10, 113, 153, 183, 223, 231), 广西(112), 台湾(149, 153, 223, 288).

Ephelis oryzae Syd. (*Balansia oryzae* (Syd.) Naras. et Thirum.) (“一柱香”病) 四川(75), 云南(111, 112, 212).

Epicoccum hyalopes Miyake 台湾(351).

E. neglectum Desm. 四川(150).

Fusarium arthrosporioides Sherb. ——(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 吉林(294), 四川(150), 云南(212), 江苏(128, 223), ——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) (恶苗病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(345), 四川(75, 90, 150), 湖北(38), 湖南(38), 山东(321), 安徽(231), 江苏(223, 231), 浙江(223, 231), 江西(38), 广东(38, 231), 广西(38), 台湾(223, 350), ——(135)

Oryza sativa L. (水稻)

Helminthosporium oryzae van Breda de Haan (*Cochliobolus miyabeanus* (Ito et Kurib.) Drechsler) (胡麻斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294, 345), 河北(51, 116, 168, 223, 317, 321), 新疆(88), “西康”(57), 四川(75, 90, 150), 云南(112, 212), 贵州(174, 196), 湖北(223, 231), 河南(13, 231), 山东(51, 321), 安徽(51, 223, 231), 江苏(51, 128, 223, 231), 浙江(49, 223, 231), 江西(231), 福建(10, 113, 121, 183, 223, 231), 广东(76, 112, 141, 223, 231), 广西(37, 178, 231), 台湾(350, 351).

H. signoides Cav. (*Leptosphaeria salvinii* Catt.) 四川(90, 91, 150), 云南(212), 安徽(231), 江苏(106, 128, 223), 浙江(49, 223, 231), 福建(10), 广西(178), 台湾(223, 324, 351).

Oryza sativa L. (水稻)

Helminthosporium signoides Cav. var. *irregulare* Crally et Tullis 台湾(324).

Hendersonia oryzae Miyake 河北(316).

Marasmius plicatus Wakker 台湾(350).

Melanomma glumarum Miyake 江苏(314).

Metasphaeria albescens Thuem. (叶尖干枯病) 云南(212), 江苏(223), 浙江(223).

Monascus purpureus Went. 福建(231), 广东(231).

Mycosphaerella malinverniana Catt. 辽宁(255, 294).

M. shiraiana Miyake 江苏(314).

M. tassiana (de Not.) Johans 黑龙江(294).

M. tulasnei Jacz. 江苏(223).

Neovossia horrida (Tak.) P. et A. (稻粒黑穗病) 辽宁(153, 294), 河北(153, 223, 317), “西康”(57), 四川(149, 150, 153), 云南(153, 212), 湖北(170), 湖南(112, 170), 河南(13), 江苏(32, 104, 153, 201, 223, 231), 浙江(32, 104, 153, 223, 231), 江西(153, 170, 231), 台湾(152, 153, 223, 288).

Nigrospora oryzae (Berk. et Br.) Petch 四川(75, 90, 91, 150), 湖北(223), 江苏(223), 浙江(223), 福建(223).

Ophiobolus oryzae Miyake (褐鞘病) 四川(150), 云南(212), 江苏(223).

Oryza sativa L. (水稻)

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (紋枯病) 四川(150), 河南(13), 江苏(128, 231), 浙江(231), 福建(10, 113, 231), 广东(231).

P. sasakii (Shirai) Ito (紋枯病) 辽宁(294), 貴州(174), 江苏(223), 浙江(49, 223), 福建(223), 台湾(223, 347, 350).

Pestalozzia kawakamii Saw. 台湾(350).

Phaeoseptoria oryzae Miyake (谷斑病) 河北(316), 云南(212), 湖北(316).

Phaeosphaerella oryzae Hara (= *Trematosphaerella oryzae* (Miyake) Padw.) 辽宁(294, 313).

Phaeosphaeria cattanei (Thuem.) Miyake 云南(212).

P. oryzae Miyake 湖南(315).

Phoma glumarum Ell. et Tracy (穎枯病) 河北(116, 168), 四川(75, 150), 云南(212), 貴州(174), 湖南(112, 223), 江苏(128, 223), 浙江(223), 江西(231), 福建(10, 121, 183, 231), 广东(223), 台湾(223, 350), “华南”(342).

Phyllosticta miurai Miyake “华北”(321).

P. oryzaecola Hara (= *P. oryzae* Hori) (叶切病) 辽宁(294), 四川(150).

Piricularia grizea (Cke.) Sacc. (稻瘟病) 河北(166), 江苏(32), 广西(32).

P. oryzae Bri. et Cav. (稻热病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(345), 河北(116, 168, 197, 223, 321, 373, 374), 陕西(143), 新疆(88), 四川(75, 150), 云南(111, 112, 212), 貴州(174), 湖南(112, 231), 河南(13), 山东(321), 安徽(223, 231), 江苏(128, 223, 231), 浙江(49, 223, 231), 江西(231), 福建(10, 121, 183, 231), 广东(112, 141, 223), 广西(37, 178), 台湾(350), “华南”(342).

Pyrenochaeta oryzae Shirai (黑点病) 河北(168), 四川(150), 云南(212), 江苏(128, 223, 231), 浙江(223, 231).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.

(黄化矮缩病) 吉林(294), 辽宁(294), 台湾(287).

Sclerotium fumigatum Nakata 台湾(324).

Oryza sativa L. (水稻)

S. hydrophilum Sacc. (菌核鞘腐病) 四川(150), 江苏(128, 223), 浙江(49, 223), 台湾(324).

S. oryzae-sativae Saw. (菌核病) 黑龙江(294), 云南(212), 浙江(49), 台湾(351).

Sphaeropsis oryzae (Catt.) Sacc. 浙江(49).

Trichoconis padwickii Ganguly 四川(90, 91).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(90, 91)

Uromyces coronatus Miyabe et Nishida (锈病) 浙江(66).

Ustilaginoidea virens (Cke.) Tak. (稻麴病) 辽宁(294), 河北(223), 陕西(143), “西康”(57), 四川(75, 90, 150), 云南(111, 112, 212, 336), 贵州(174, 196), 湖南(231), 江苏(23, 32, 128, 201, 223, 231), 浙江(49, 223, 231), 福建(121, 168), 广东(112), 广西(223), 台湾(223, 350).

Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) Dowson (白叶枯病) “西康”(57), 云南(212), 湖北(19a, 43), 湖南(19a), 安徽(19a), 江苏(19a, 138, 223), 浙江(19a, 223), 江西(19a), 福建(10, 19a, 121), 广东(4).

X. oryzicola Fang et al. (细菌性条斑病) 广东(19a).

Oryza virus 1 (萎缩病) “西康”(57).

Aphelenchoides oryzae Yokoo. (干尖线虫病) 河北(59a), 山西(59a), 陕西(59a), 四川(59a), 贵州(59a), 湖北(59a), 湖南(59a), 安徽(59a), 江苏(59a), 浙江(59a), 江西(59a), 广东(59a).

旱青立病 (非侵染性病害) 河北(321).

烂秧 (非侵染性病害) 江苏(223).

嘉禾 (非侵染性病害) 江苏(223), 浙江(223).

鸟巢瘟 (非侵染性病害) 浙江(223).

米稻 (非侵染性病害) 江苏(223).

O. sp. (稻属)

Ustilaginoidea virens (Cke.) Tak. (稻麴病) “西康”(57).

Osbeckia crinita Benth. (长毛金锦香)

Septoria melastomatis Pat. (斑枯病) ——(332).

Osmanthus asiaticus Nak.

Aecidium osmanthi Syd. et Butl. (锈病) 台湾(360).

Cercospora osmanthi-asiatici Saw. (叶斑病) 台湾(358).

Osmanthus fragrans Lour. (木犀, 桂花树)*Aecidium osmanthi* Syd. et Butl. (锈病) 浙江(214, 231).*Zaghouania phillyreae* Pat. 浙江(275).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**O. matsumuranus** Hay. (羊屎果)*Meliola osmanthi* Syd. (煤病) 台湾(380).**Ostrya** sp. (苗榆属)*Gnomoniella vulgaris* (Ces. et de Not.) Sacc. 陕西(237).**Oxalis corniculata** L. (酢浆草)*Microsphaera russellii* Clint. (白粉病) 台湾(283, 350).*Puccinia sorghi* Schw. (锈病) 四川(150).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**O. griffithii** Edg. et Hook f.*Chnoopsora itoana* Hirat. f. (锈病) 台湾(279, 289).**O. japonica** Fr. et Sav. (山酢浆草)*Septoria oxalidis-japonicae* Pat. (斑枯病) 河南(13), 西藏(332).**O. martiana** Zucc. (多花酢浆草)*Meloidogyne* sp. (根结线虫病) 广东(100).**O. repens** Thunb. (酢浆草)*Mycosphaerella oxalidis* Saw. 台湾(360).**O. sp.** (酢浆草属)*Chnoopsora itoana* Hirat. f. (锈病) 贵州(246).**Pachyrhizus erosus** (L.) Urb. (豆薯)*Colletotrichum pachyrrhizi* Saw. (炭疽病) 台湾(358).*Phakopsora pachyrrhizi* Syd. (锈病) 云南(212, 214), 台湾(264, 280, 289, 356, 368).**P. tuberosus** Spreng. (块根豆薯, 土瓜, 地瓜)*Colletotrichum pachyrrhizi* Saw. (炭疽病) 四川(150).*Phakopsora pachyrrhizi* Syd. (锈病) 四川(150).*Pythium irregulare* Buisman (黑心病) 云南(136).*P. spinosum* Saw. (根腐病) 云南(136, 212).*P. ultimum* Trow. (根腐病) 云南(212).**Paederia chinensis** Hance. (牛皮冻, 鸡矢藤)*Cercospora paederiae* Tai (叶斑病) 江苏(210), 台湾(360).*Coleosporium paederiae* Diet. (锈病) 云南(214), 台湾(277, 289).

Paederia chinensis Hance. (牛皮冻, 鸡矢藤)

Puccinia zoysiae Diet. (锈病) 湖北(47, 218), 河南(66), 安徽(32, 36, 65, 66), 江苏(32, 36, 218), 浙江(32, 36, 218), 江西(32, 36, 47, 218), 广东(370), 台湾(277, 290, 368).

Uredo paederiae Syd. (锈病) 广东(32, 36).

P. scandens (Lour.) Merr. (鸡矢藤)

Phyllostictina paederiae Petr. 广西(340).

P. sp. (牛皮冻属)

Coleosporium paederiae Diet. (锈病) 贵州(245), 广东(274), 广西(245, 274).

Puccinia zoysiae Diet. (锈病) 云南(214), 广东(274).

Uredo paederiae Syd. (锈病) 台湾(290).

Paenonia albiflora Pallas (芍药)

Aecidium paeoniae Komar. (锈病) “东北”(272, 313).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(150).

Cercospora paeoniae Tehon et Daniels (叶斑病) 河北(116).

Cladosporium paeoniae Pass. (叶霉病) 河南(13), 江苏(284).

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. (锈病) 辽宁(313), “东北”(272), 江苏(32, 36, 103), 浙江(49).

P. obovata Max. var. *japonica* Mak.

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) “东北”(219).

P. suffruticosa Andr. (牡丹)

Botrytis paeoniae Oud. 江苏(106).

Cladosporium paeoniae Pass. (叶霉病) 四川(150), 河南(13), 江苏(284), 浙江(49).

Clasterosporium paeoniae Pass. 四川(150), 安徽(47).

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. (锈病) “西康”(57).

Hendersonia paeoniae Allesch. 四川(150).

Paliurus ramosissimus Poir. (马甲子)

Cercospora zizyphi Petch (叶斑病) 台湾(360).

Coniothyrium mizogamii Togashi 河南(374).

Phakopsora zizyphi-vulgaris (P. Henn.) Diet. (锈病) 四川(150), 河南(374), 台湾(265, 278, 289).

Paliurus sp. (馬甲子屬)

Phakopsora zizyphi-vulgaris (P. Henn.) Diet. (銹病) 四川(214).

Puccinia coronata Corda (銹病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(32, 36).

Panax pseudo-ginseng C. A. Meyer (假人參)

Colletotrichum panacicola Naka. et Tak. (炭疽病) 云南(212).

Uredo panacis Syd. (黃袍病) 云南(212, 214).

P. schinseng Nees (人參)

Alternaria radicina M., D. et E. (黑斑病) 內蒙(372).

Phytophthora ractorum (Lebert et Cohn.) Schroet. (疫病) 台灣(287).

P. odoratissimus L. f. (露兜樹)

Pestalozzia padani Saw. 台灣(360).

Panicum maximum Jacq. (羊草, 大黍)

Marasmius plicatus Wakker 台灣(350).

P. miliaceum L. (黍)

Cercospora fusimaculans Atk. (葉斑病) 台灣(355).

Helminthosporium panici-miliacei Nishikado (長形葉斑病) 遼寧(294), 內蒙(372, 373), “熱河”(294, 345), 河北(142, 168), 山西(256, 321).

H. yamadai Nishikado (圓形斑點病) 遼寧(294), “熱河”(294), 河北(142, 168), 山東(374).

Phyllosticta sorghina Sacc. 黑龍江(294), 遼寧(294, 313).

Sorosporium syntherismae (Peck) Farlow (黑粉病) 河北(142, 373), 山西(373).

Sphacelotheca destruens (Schlecht.) Stev. et A. (黑粉病) 黑龍江(60, 153, 294), 吉林(286, 294), 遼寧(153, 294), “東北”(288), 內蒙(321, 372), “熱河”(153, 294), 河北(142, 153, 168, 171), 山西(1, 32, 104, 153, 168, 198, 321), 陝西(153, 168), 甘肅(153, 231), 新疆(88), 河南(13).

Pseudomonas panici-miliacei (Ikata et Yamauchi) Savulescu (細菌性條斑病) 台灣(294).

Marasmius plicatus Wakker 台灣(350).

Panicum repens L. (舖地黍)*Balansia andropogonis* Syd. 台湾(360).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) “华南”(342).*Piricularia panici-paludosi* (Saw.) Ito (瘟病) 台湾(354).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Sorosporium formosanum* Saw. (黑粉病) 福建(153), 台湾(152, 153, 288).*Uromyces linearis* Berk. et Br. (锈病) 广东(270, 274, 389), 台湾(290, 359), “华南”(342).**P. sanguinale** L. (馬唐)*Colletotrichum graminicolum* (Ces.) Wils. (炭疽病) 台湾(357).*Marasmius plicatus* Wakker 台湾(350).*Piricularia grisea* (Cke.) Sacc. (瘟病) 台湾(350).**P. sp.** (黍属)*Puccinia pangasinensis* Syd. (瘟病) 广西(246).**Papaver alpinum** L. (高山罂粟)*Peronospora arborescens* (Berk.) de Bary (霜霉病) 黑龙江(313).**P. nudicaule** L. (冰島罂粟)*Mycosphaerella tassiana* (de Not.) Johans. 山西(340).*Peronospora arborescens* (Berk.) de Bary (霜霉病) “东北”(287).**P. somniferum** L. (罂粟)*Cercospora papaveri* Nakata (叶斑病) 台湾(239).*C. papavericola* Chupp (叶斑病) 台湾(239).*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 台湾(350, 354).*Helminthosporium papaveris* Saw. (*Pleospora calvescens* (Fr.) Tul.) 台湾(350).*Oidiopsis papaveris* Saw. (白粉病) 台湾(356).*Peronospora arborescens* (Berk.) de Bary 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294), “东北”(287), 内蒙(372, 373), “热河”(294).**Paraquilegia microphylla***Mycosphaerella tassiana* (de Not.) Johans. “西康”(340).

- Parthenocissus heterophylla** Merr. (爬墙虎)
Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 安徽(65).
- P. thunbergii** Nakai
Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 台湾
 (265, 280, 289).
Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).
- P. tricuspidata** (Sieb. et Zucc.) Pl. (爬山虎, 地锦)
Colletotrichum parthenocissi (Shen) Teng (炭疽病) 江苏(29, 32, 103).
- Paspalum distichum** L. (两耳草)
Tolyposporium evernium Syd. (黑粉病) 江苏(153).
- P. formosanum** Honda (台湾雀稗)
Puccinia paspalina Cummins (锈病) 台湾(290).
- P. scrobiculatum** L. (雀稗)
Balansia andropogonis Syd. 台湾(360).
Cerebella paspali Cke. et Mass. 台湾(360), “华南”(342).
Claviceps paspali Stev. et Hall. (麦角病) 台湾(360).
Ephelis japonica P. Henn. (“一柱香”病) 四川(150), 广东(370).
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 台湾(360).
Marasmius plicatus Wakker 台湾(350).
Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) “华南”(342).
Puccinia paspalina Cummins (锈病) 台湾(271).
Sorosporium paspali-thunbergii (P. Henn.) Ito (黑粉病)
 河北(153), 江西(153), 福建(153), 广东(153), 台湾(152, 153, 288).
- P. scrobiculatum** L. var. *orbiculare* (Forst.) Mak.
Ophiodothis paspali P. Henn. 台湾(358).
Puccinia paspalina Cummins (锈病) 台湾(290).
Sphacelotheca nankinensis Zundel (黑粉病) 江苏(153).
- P. thunbergii** Kunth (雀稗)
Sclerotium paspali Schw. (菌核病) 台湾(355).
Sorosporium paspali-thunbergii (P. Henn.) Ito (黑粉病)
 台湾(288).

Paspalum sp. (雀稗属)*Fusarium heterosporium* Nees 广西(231).*Puccinia paspalina* Cummins (锈病) 广东(274).*Sorosporium paspali-thunbergii* (P. Henn.) Ito (黑粉病)
河北(153), 江西(149, 153), 福建(153), 广东(153), 台湾(153).**Passiflora** *ceorulea* L. (西番莲)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 台湾(350).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. (茎腐病) 台湾(350).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**P. quadrangularis** L. (大果西番莲)*Gloeosporium passifloricolum* Saw. (炭疽病) 台湾(358).**Patrinia** *heterophylla* Bge.*Puccinia patriniae* P. Henn. (锈病) 安徽(65).**P. lupestris** Turcz.*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).**P. scabiosaefolia** Link (败酱, 黄花龙芽)*Puccinia hemerocallidis* Thuem. (锈病) 黑龙江(313),
“东北”(272, 290), 江西(47).**P. scabra** Bunge (粗糙败酱)*Puccinia hemerocallidis* Thuem. (锈病) 河北(64), 山西(340).**P. villosa** Juss. (败酱)*Puccinia hemerocallidis* Thuem. (锈病) 台湾(360).*P. patriniae* P. Henn. (锈病) 台湾(278, 290, 355).*Septoria patriniae* Miura (斑枯病) 辽宁(313).**P. sp.** (败酱属)*Puccinia patriniae* P. Henn. (锈病) 湖南(214), 广西(246).**Paulownia** *fargesii* Franch. (川桐)*Phyllactinia imperialis* Miyabe (= *P. salmonii* Blumer)
(白粉病) 四川(150).**P. fortunei** (Semml.) Hensl. (泡桐)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).*L. yadoriki* Sieb. (樟寄生) 广西(160).

Paulownia tomentosa (Thunb.) Schneid. (桐树, 絨叶泡桐)

Cercospora paulowniae Hori (叶斑病) 河南(13).

Gloeosporium kawakamii Miyabe (炭疽病, 鬼帚病) 遼寧(313), 河南(13).

Mycosphaerella paulowniae Shirai et Hara (褐斑病) 河南(13).

Phyllactinia imperialis Miyabe (= *P. salmonii* Blumer) (白粉病) 四川(213, 226), 河南(13).

Septobasidium tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 台湾(351).

Uncinula clintonii Peck (白粉病) 四川(213).

Pelargonium hortorum Bail. (天竺葵)

Xanthomonas pelargonii (Brown) Starr. et Burkholder (細菌斑点病) 江苏(138).

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. (狼尾草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).

Ephelis japonica P. Henn. (“一柱香”病) 四川(150).

Phyllachora pennisetina Syd. (黑痣病) 河北(340), 四川(150), 广东(362), 广西(340).

Sphacelotheca penniseti-japonici (P. Henn.) Ito (黑粉病) 四川(150, 153), 貴州(149, 153), 湖北(153), 湖南(153), 安徽(153, 393), 江苏(32, 104, 153), 浙江(32, 149, 135), 福建(153), 广东(32, 153).

Tilletia pennisetina Syd. (腥黑穗病) 河北(153, 198), 四川(149, 150, 153), 湖北(153), 湖南(32, 140, 153), 安徽(153, 393), 江苏(32, 104, 153, 364, 393), 江西(32, 104, 153).

Ustilaginoidea penniseti Miyake (麴病) 湖南(315).

P. japonicum Trin. (日本狗尾草)

Balansia andropogonis Syd. 台湾(360).

Phyllachora penniseti-japonici Saw. (黑痣病) 台湾(360).

P. purpurascens Mak. (狼尾草)

Ephelis japonica P. Henn. (“一柱香”病) 广东(362).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

Sphacelotheca penniseti-japonici (P. Henn.) Ito (黑粉病) 湖南(316), 江苏(231, 364), 浙江(231).

Pennisetum sinense Mez (狼尾草)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).**P. triflorum** Nees (三花狗尾草)*Tilletia pennisetina* Syd. (腥黑粉病) 江苏(340).**P. sp.** (狼尾草属)*Ephelis oryzae* Syd. (*Balansia oryzae* (Syd.) Naras. et Thirum.). (“一柱香”病) 广西(231).*Epichloe cinerea* B. et Br. (香柱病) 广西(231).*Fusarium heterosporium* Nees 广西(231).*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) 河北(315).*Sphacelotheca penniseti-japonici* (P. Henn.) Ito (黑粉病) 福建(344).*Tilletia pennisetina* Syd. (腥黑穗病) 河南(13).**Perilla frutescens** (L.) Brit. (白苏, 荏)*Coleosporium perillae* Syd. (锈病) 黑龙江(272), 吉林(313), 四川(150, 214), 贵州(245), 安徽(245), 江苏(47), 江西(245), 广西(245).*Septoria perillae* Miyake (斑枯病) “热河”(345).*Xanthomonas ricinicola* (Ell.) Dowson (细菌性斑点病) “热河”(345).**P. nankinensis** Decne. (紫苏)*Coleosporium perillae* Syd. (锈病) 四川(150, 214), 云南(214), 贵州(174), 湖南(32, 36, 316), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 福建(32, 36), 广西(32), 台湾(289).**P. ocimoides** L. (荏, 白苏)*Coleosporium perillae* Syd. (锈病) 黑龙江(294), 吉林(294).*Septoria kishitai* Fukui (斑枯病) “热河”(294).*S. perillae* Miyake (斑枯病) 吉林(294), 辽宁(294), 河北(317).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).**Persea gratissima** Gaertn. (鳄梨, 樟梨)*Macrophoma perseae* Saw. 台湾(351).*Phyllosticta perseae* Ell. et Mart. 台湾(358).*Cephaleuros virescens* Kunze (藻斑病) 广东(80).**P. sp.** (鳄梨属)*Puccinia scimitriformis* Cummins (锈病) 广西(244).

Persicaria lapathifolia Gray (大馬蓼)

Puccinia polygoni-amphibii Pers. (銹病) 黑龍江(273),
“東北”(273).

Petroselinum hortense Hoffm. (西洋旱芹)

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 廣東(100).

Petunia violacea Lindl. (撞羽朝顏)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣
(350).

花葉病 (Mosaic) 江蘇(127).

Peucedanum decursivum Max. (前胡)

Phyllosticta peucedani Saw. 台灣(360).

Puccinia nanbuana P. Henn. (銹病) 四川(220), 安徽
(246).

Septoria peucedanicola Saw. (斑枯病) 台灣(358).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165)

P. terebinthaceum Fisch. (石防風)

Puccinia angelicae Fuck. (銹病) 山東(66).

P. sp. (前胡屬)

Puccinia nanbuana P. Henn. (銹病) 湖南(32,36), 安
徽(32,36), 江蘇(32, 36), 廣西(246).

Phalaenopsis aphrodite Reichb.

Cylindrosporium phalaenopsidis Saw. 台灣(355).

Phalaris arundinacea L. (草蘆, 藎草, 藎草)

Puccinia sessilis Schneid. (銹病) “東北”(273).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et
Naras. (黃化矮縮病) 台灣(287).

P. arundinacea L. var. *genuina* Hack. (藎草)

Puccinia sessilis Schneid. (銹病) “東北”(290).

Pharbitis hederacea Choisy (牽牛花, 裂葉牽牛)

Albugo ipomoeae-panduranae (Schw.) Sw. (白銹病) 河
南(13).

Phaseolus angularis Wight (赤豆, 赤小豆)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龍
江(60), 河北(172).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli*
(Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (銹病) 黑龍江(60),
廣西(246).

Phaseolus aureus Roxb. (綠豆)

Ascochyta phaseolorum Sacc. (褐斑病) 河南(13).

Cercospora canascens Ell. et Mart. (叶斑病) 云南(215).
河南(13).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.)
(叶斑病) “热河”(345), 河北(321), 山西(1, 319), 河南
(13), 山东(321), 江苏(128).

Colletotrichum phaseolorum Tak. (炭疽病) “热河”(345).

Dothiorella phaseoli (Mauel.) Pat. et Syd. 江苏(128).

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 山西(1, 319).

Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. var. *tracheiphilum*
(Smith) Wr. (萎蔫病) 河南(13).

Phyllosticta phaseolina Sacc. (叶斑病) “热河”(345),
河南(13), 江苏(128).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) “热
河”(345), 四川(150), 河南(13), 安徽(219), 江苏(219).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli*
(Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) “热河”(345),
四川(75, 150), 山东(231), 江苏(128).

花叶病 (Mosaic) 山西(1).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

P. chrysantha Savi (金花草豆)

Dothiorella phaseoli (Mauel.) Pat et Syd. 湖北(364).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli*
(Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 江西(246).

P. coccineus L. (紅花草豆, 多花草豆, 多花豆)

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli*
(Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 遼宁(313),
“东北”(290), “西康”(57).

P. limensis Macf. (利瑪豆, 扁豆)

Colletotrichum truncatum (Schw.) Andr. et Moore (炭疽
病) 江苏(128, 162), 福建(10).

Diaporthe phaseolorum (Cke. et Ell.) Sacc. 江苏(128).
花叶病 (Mosaic) 江苏(127).

P. lunatus L. (雪豆, 金甲豆)

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.)
Lath.) (叶斑病) 台湾(359).

Phaseolus lunatus L. (雪豆, 金甲豆)

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) “华南”(342).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

P. lunatus L. var. macrocarpus

花叶病 (Mosaic) 广东(82).

P. minimus Roxb. f. typicus Hosok.

Phyllachora phaseolina Syd. (黑痣病) 台湾(359).

P. mungo L. (黑吉豆)

Alternaria azukiae Hara (黑斑病) 河南(13).

A. brassicae (Berk.) Sacc. var. *phaseoli* Brun. (黑斑病) 河南(13).

Ascochyta phaseolorum Sacc. (褐斑病) 河南(13).

Cercospora canescens Ell. et Mart. (叶斑病) “西康”(57), 四川(150), 云南(112, 212), 湖南(112), 江苏(231).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 河南(13).

Clathrococcum nipponicum Hiura (叶枯病) 河南(13).

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) “西康”(57), 河南(13).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) “西康”(57), 湖北(47), 江苏(47), 浙江(47).

Mycosphaerella pinodes (Berk. et Blox.) Vesterg. (褐纹病) 河南(13).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 台湾(350).

Phyllosticta azukiae Miura (叶斑病) 河南(13).

P. phaseolina Sacc. (叶斑病) 湖南(112), 河南(13), 广东(112).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(209), 山西(231), 四川(150), 河南(13), 江苏(231).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) “西康”(57), 河南(13), 江苏(32, 36).

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson (细菌性疫病) “西康”(57).

Phaseolus virus 1 (花叶病) “西康”(57), 河南(13).

Phaseolus mungo L. var. **subtrilobata** Fr. et Sav. (綠豆)

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (銹病) 河北(63).

P. pendulus (蔓小豆)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(172).

P. radiatus L. (小豆)

Alternaria azukiae Hara (黑斑病) 河北(321).

Cercospora canescens Ell. et Mart. (叶斑病) 河北(316), 湖北(315), 湖南(316).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (褐紋病) “热河”(345), 河北(51, 321), 貴州(174), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).

Colletotrichum phaseolorum Tak. (炭疽病) “热河”(345).

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 山东(321).

Macrosporium fasciculatum Cke. et Ell. 貴州(174).

Phyllosticta phaseolina Sacc. “热河”(345), 貴州(174), 湖北(315).

Septoria leguminum Desm. (斑枯病) “热河”(317).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) “热河”(345), 河北(51, 168, 172), 山西(219), 貴州(174), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51, 219).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (銹病) “热河”(345), 河北(168), 山西(1), 山东(321).

花叶病 (Mosaic) 河北(321).

P. radiatus L. var. **aurea** Prain. (小豆)

Alternaria azukiae Hara (黑斑病) 內蒙(372), 山西(373).

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 遼宁(294)

Clathrococcum nipponicum Hiura (叶枯病) 黑龙江(294).

Colletotrichum phaseolorum Tak. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294).

Phyllosticta phaseolina Sacc. (褐紋病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “东北”(371), “热河”(294).

Phaseolus radiatus L. var. **aurea** Prain. (小豆)*Septoria phaseoli* Maubl (斑枯病) 内蒙(372).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294).*Uromyces appendiculatus* (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), 热河(294).*Xanthomonas phaseoli* (Smith) Dowson (細菌性疫病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294).

花叶病 (Mosaic) 遼宁(294).

P. radiatus L. var. **typicus** Prain. (綠豆)*Ascochyta phaseolorum* Sacc. (斑紋病) 吉林(294), 遼宁(294).*Cercospora cruenta* Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 遼宁(294), 河北(374), 山东(374).*Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav.(*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 山东(374).*Erysiphe pisi* DC. (白粉病) 遼宁(294).*Phyllosticta azukiae* Miura 吉林(294).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294).*Uromyces appendiculatus* (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 吉林(294), 遼宁(294).*Xanthomonas phaseoli* (Smith) Dowson (細菌性疫病) 黑龙江(294), 遼宁(294).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294), 遼宁(294), 热河(294), 河南(294).

P. trinervius Hèyne.*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 台湾(350).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**P. vulgaris** L. (菜豆)*Alternaria brassicae* (Berk.) Sacc. var. *phaseoli* Brun.

(黑斑病) 吉林(294, 313), “东北”(313), “西康”(57), 四川(150), 江苏(128).

Phaseolus vulgaris L. (菜豆)

- Ascochyta phaseolorum* Sacc. (輪斑病) “西康”(57), 四川(33, 150), 云南(212).
- Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 江苏(128).
- Cercospora canescens* Ell. et Mart. (叶斑病) 四川(150, 194), 云南(212, 215), 河南(374), 山东(374), 江苏(106).
- C. columnaris* Ell. et Ev. (= *Isariopsis griseola* Sacc.) (角斑病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294, 345), 河北(116), 四川(150), 云南(112, 212, 215), 河南(13), 江苏(128), 台湾(358).
- C. cruenta* Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (褐斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “热河”(294, 345), “西康”(57), 四川(150), 貴州(174), 江苏(128), 福建(10).
- Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), “东北”(371), “热河”(294, 345), 河北(116), “西康”(57), 四川(150), 云南(212), 江苏(106, 128, 231), 福建(10).
- C. truncatum* (Schw.) Andr. et Moore (炭疽病) 河北(116), 四川(150).
- Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. (莖腐病) 四川(194), 江苏(128), 台湾(350).
- Erysiphe polygoni* DC (白粉病) 吉林(294, 313), 河北(209), “西康”(57), 江苏(128).
- Macrophomina phaseoli* (Mauubl.) Ashby (莖腐病) 河南(13).
- Macrosporium fasciculatum* Cke. et Ell. 貴州(174).
- M. phaseoli* Fautr. 河南(374), 山东(374).
- Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers 江苏(128).
- P. sasakii* (Shirai) Ito 台湾(347, 350).
- Phyllosticta noackiana* Allesch. “热河”(317), 河南(374).
- P. phaseolina* Sacc. (斑点病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), “热河”(345), 四川(150), 云南(112), 河南(13), 江苏(128).

Phaseolus vulgaris L. (菜豆)

Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. (猝倒病) 四川 (150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江苏 (128), 台湾(350).

Septoria phaseoli Maubl. (斑枯病) 内蒙(321), 山西 (321, 373).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北 (209).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(91).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(294, 313), “东北”(272), 内蒙(321), “热河”(294, 345), 河北(63, 166, 168, 197, 315), 山西(1, 168, 319), “西康”(57), 四川(150), 云南(112, 212), 贵州(246), 河南(13), 山东(63, 321, 374), 江苏 (32, 36, 128, 201), 浙江(63), 福建(10), 台湾(290).

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson (细菌性疫病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345), 河北(197), 四川(194), 云南(112), 河南(13), 江苏(128), “华南”(342), “各地”(138).

X. phaseoli (Smith) Dowson var. *sojense* (Hedges) Starr et Burk. (细菌性疫病) “西康”(57).

Phaseolus virus 1 (花叶病) 河北(184), “西康”(57).

Phaseolus virus 2 (黄色花叶病) “西康”(57).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 河南(13), 江苏(127), 浙江(127), 福建(10), 广东(82).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根结线虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 山东(95), 广东(100).

P. sp. (菜豆属)

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 四川(29, 32), 江苏(29, 32), 广东(29, 32).

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 河南(374).

Phaseolus sp. (菜豆属)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 江苏(219).

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link (= *U. phaseoli* (Pers.) Wint. var. *typica* Arthur) (锈病) 西康(57), 贵州(246), 浙江(63), 华东(341).

花叶病 (Mosaic) “华东”(341).

Phellodendron amurense Rupr. (黄蘗)

Coleosporium phellodendri Kam. (锈病) 黑龙江(272, 313), 吉林(313), 辽宁(313), “东北”(272, 295).

P. sachalinenses Sargent (硬皮蘗木)

Coleosporium phellodendri Kam. (锈病) 辽宁(313).

Phellopterus littoralis Fr. Schm. (珊瑚菜)

Puccinia phellopteri Syd. (锈病) 山东(66), 台湾(360).

P. phelloptericola Saw. (锈病) 台湾(360).

Philadelphus pekinensis Rupr. (太平花, 京山梅花)

Cercospora angulata Wint. (叶斑病) 河北(317).

P. tenuifolius Rupr. et Max. (堇叶山梅花)

Phyllosticta vulgaris Desm. var. *philadelphi* Sacc. — (313).

Phleum pratense L. (猫尾草, 梯牧草, 提摩太草)

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet. (白髮病) “东北”(287), 台湾(287).

Phlomis umbrosa Turcz. (糙苏)

Erysiphe galeopsidis DC. (白粉病) 山西(340).

E. polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Phlox drummondii Hook (桔梗石竹, 福祿考)

Septoria divaricata Ell. et Ev. (斑枯病) 江苏(103).

Phoebe formosana Hay.

Aecidium machili P. Henn. (锈病) 台湾(290).

Phoenix dactylifera L. (海枣, 战捷木)

Exosporium palmivorum Sacc. 台湾(350).

Graphiola phoenicis Poit. (黑粉病) 台湾(355).

P. hanceana Naud. (棕榈, 刺葵)

Graphiola phoenicis Poit. (黑粉病) 广东(27, 32).

P. hanceana Naud. var. *formosana* Becc. (刺葵)

Exosporium palmivorum Sacc. 台湾(358).

Graphiola phoenicis Poit. (黑粉病) 台湾(355).

Meliola palmicola Wint. (煤病) 台湾(380).

Phoenix sp. (海枣属)

Graphiola phonicis Poit. (黑粉病) 福建(10,149), “华南”(342).

Photinia amphidoxa (Schneid.) Rehd. et Wils.

Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 贵州(231).

P. kudoii Masamune

Irene photinicola Yamam. 台湾(383).

P. loriformis W. W. Smith

Cupnodium caespitosum Ell. et Ev. (煤病) 云南(306).

P. parvifolia Schneid. (细叶石楠)

Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 湖南(306), 江苏(32,36).

P. serrulata Lindl. (石楠)

Pestalozzia photiniae Thuem. (轮纹病) 江苏(102).

P. subumbellata Rehd. et Wils. (繖花石楠)

Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 江苏(32, 36, 220), 江西(220).

P. taiwanensis (台湾石楠)

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

P. villosa DC. (毛叶石楠)

Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 湖南(214); 江苏(220).

P. sp. (石楠属)

Gymnosporangium japonicum Syd. (锈病) 湖南(214), 台湾(280).

Phragmitis communis Trin. (蘆葦, 蘆)

Brachysporium phragmitis Miyake “西康”(57).

Coniosporium arundinis (Corda) Sacc. 河北(20, 29, 32), 四川(150), 江苏(29, 32).

Hadrotrichum phragmiticolum Teng 河北(374), 江苏(29, 32).

Hendersonia botulisporea Teng 广东(29, 32).

Napicladium arundinaceum (Corda) Sacc. 吉林(313).

Phragmitis communis Trin. (芦葦, 芦)

Puccinia magnusiana Koern. (锈病) “东北”(290), 河北(32, 36, 166, 197), “西康”(57), 安徽(246), 江苏(32, 36, 340), 浙江(32, 36, 47), 广东(370), 台湾(290).

P. moriokaensis Ito (锈病) 河北(66).

P. okatamaensis Ito (锈病) 河北(62), 浙江(48).

P. phragmitis (Schum.) Koern. (锈病) “东北”(290), 河北(32, 36, 66, 146, 171, 315), 新疆(67, 88), “西康”(57), 四川(150, 214), 云南(214), 江苏(32, 36, 47, 106, 205), 浙江(32, 36, 62).

P. karka Trin. (大蘆葦)

Phyllachora phragmitis-karkae Saw. (黑痣病) 台湾(360).

Puccinia invenusta Syd. (锈病) 云南(214).

Uredo phragmitis-karkae Saw. (锈病) 台湾(360).

P. longivalvis Steud.

Meliola arundinis Pat. (煤病) 台湾(380).

Puccinia magnusiana Koern. (锈病) “东北”(272), 台湾(359).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

P. sp. (蘆葦属)

Puccinia longinqua Cummins (锈病) 广西(246).

P. magnusiana Koern. (锈病) “西康”(57), 江苏(201).

P. moriokaensis Ito (锈病) 安徽(246).

P. phragmitis (Schum.) Koern. (锈病) 河北(20).

Phyllanthus flexuosus Muell.-Arg. (叶下珠)

Aecidium phyllanthi P. Henn. (锈病) 浙江(32, 36).

P. niruri L.

Cercospora phyllanthi Chupp (叶斑病) 台湾(358).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

P. reticulatus Poir. (白仔)

Ravenelia brevispora Hirat. f. et Hash. (锈病) 台湾(278, 290).

P. sp. (叶下珠属)

Aecidium phyllanthi P. Henn. (锈病) 河南(13).

Phyllostachys congesta Rendle (水竹, 木竹)

Ustilago shiraiana P. Henn. (黑粉病) 貴州(153), 河南(153), 江苏(153), 江西(153), 福建(153), 台湾(153).

P. edulis A. et C. Riv. (毛竹, 孟宗竹)

Meliola phyllostachydis Yamam. (煤病) 台湾(382).

P. makinoi Hay. (筴竹)

Lasmenia phyllostachydis Saw. 台湾(360).

Meliola phyllostachydis Yamam. (煤病) 台湾(382).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Paranthostomella phyllostachydis Saw. 台湾(360).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Ustilago shiraiana P. Henn. (黑粉病) 貴州(153), 河南(153), 江苏(153), 江西(153), 福建(153), 台湾(152, 153, 288).

Vermicularia nigronitensis Saw. (黑色炭疽病) 台湾(358).

P. puberula Munro (淡竹)

Balansia take (Miyake) Hara (鬼帚病) 浙江(8).

Myriangium haraeianum Tai et Wei 江苏(204), 浙江(8).

Phyllachora phyllostachydis Hara (竹黑肿病) 浙江(8)

Puccinia melanocephala Syd. (锈病) 貴州(246).

Stereostroma corticioides (Berk. et Br.) Magn. (竹霉) 江苏(201, 220), 浙江(8).

P. quilioi Riv. (苦竹)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

P. reticulata Koch. (箭竹, 刚竹)

Phyllachora phyllostachydis Hara (黑痣病) 浙江(8).

P. sinensis Sacc. (黑痣病) 四川(91).

Ustilago shiraiana P. Henn. (黑穗病) 福建(10, 121).

P. sp. (刚竹属)

Balansia take (Miyake) Hara (鬼帚病) 貴州(181, 196), 湖南(315), 河南(13), 江苏(23, 32, 47).

Calonectria bambusae (Hara) Hoehn. (棕肿斑病) 貴州(181), 江苏(23, 32).

Phyllostachys sp. (刚竹属)

Coccostromopsis arundinariae (Hara) Teng (= *Coccodiella arundinariae* Hara) 四川(150).

Coniosporium bambusae (Thuem. et Bolle) Sacc. 广东(344).

C. saccardianum Teng 湖南(29, 32), 江苏(29, 32), 广西(32).

Corticium bambusae Burt. (茎枯病) 河南(13).

Epichloe bambusae Pat. (香柱病) 贵州(181).

Meliola furcata Lev. (煤病) 浙江(220).

M. phyllostachydis Yamam. (煤病) 台湾(387).

Metasphaeria deviata Syd. 浙江(364).

Myriangium haraeum Tai et Wei (竹鞘黑圆病) “西康”(57), 四川(150), 贵州(181).

Phyllachora orbicula Rehm. (黑痣病) 福建(10).

P. shiraiana Syd. (黑痣病) 贵州(181).

Puccinia longicornis Pat. et Har. (锈病) 安徽(246), 江苏(32, 36, 220), 浙江(32, 36, 231).

P. melanocephala Syd. (锈病) 安徽(246).

P. phyllostachydis Kusano (锈病) 云南(213), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36, 220).

Scolecotrichum phyllostachydis Teng 江苏(29, 32).

Shiraia bambusicola P. Henn. (赤团子病) 四川(150), 贵州(181), 江苏(205), 浙江(205).

Shiraiella phyllostachydis Hara (小团子病) 河南(13).

Stereostromium corticioides (Berk. et Br.) Magn. (锈病) “西康”(32), 四川(32, 150), 贵州(181), 江苏(32, 36, 220), 浙江(32, 36, 220), 广西(32).

Ustilago shiraiana P. Henn. (黑粉病) 贵州(149, 153, 181), 河南(13, 149, 153), 江苏(32, 104, 153), 江西(32, 104, 153), 福建(910, 153), 台湾(153).

Physalis alkekengi L. (洋姑娘, 酸浆)

Cercospora physalidis Ell. (叶斑病) 安徽(47).

Phyllosticta physaleos Sacc. 黑龙江(60), 吉林(313).

P. angulata L. (苦蕒)

Entyloma australe Speg. (叶黑肿病) 江苏(153), 台湾(152, 153, 360).

Physalis minima L. (天泡菓)

Entyloma australe Speg. (叶黑肿病) 江苏(32, 104, 153), 台湾(153).

Phytolacca sp. (商陆属)

Ramularia harai P. Henn. 江西(231).

Picea asperata Mast. (云杉, 麦氏云杉)

Fomes pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) 甘肃(180).

F. roseus (Alb. et Schw.) Cke. (褐色顶腐病) 甘肃(180).

P. brachytyla Pritz. (垂枝云杉, 川云杉)

Fomes annosus (Fr.) Cke. (赤腐病) “西康”(31).

F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(31).

F. robustus Karst. (沟腐病) “西康”(31).

P. likiangensis (Franch.) Pritz. (丽江云杉)

Chrysomyxa ledi de Bary (锈病) 四川(306), 云南(306).

Fomes annosus (Fr.) Cke. (赤腐病) “西康”(34), 云南(34).

F. pini (Thore) Karst. (红色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

F. pinicola (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

P. neoveitchii Mast. (青杆)

Fomes pini (Thore) Karst. (红色腐朽病) 甘肃(180).

P. purpurea Mast. (紫果云杉)

Fomes pini (Thore) Karst. (褐色腐朽病) 甘肃(180).

F. pinicola (Sw.) Cke. (红色腐朽病) 甘肃(180).

P. sp. (云杉属)

Macrosporium helminthorioides (Corda) Sacc. et Trav. 江苏(29, 32).

Pierasma quassivides (苦树)

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 陕西(213).

Pieris hieracioides L. (毛连菜)

Septoria mougeotii Sacc. et Roum. (斑枯病) 吉林(313).

P. doyonensis H.-M.

Lophodermium pieridis Keissler (落叶病) 云南(304).

Pileostegia viburnoideis Hook f. et Thoms.

Meliola pileostegiae Yamam. (煤病) 台湾(385).

Pinellia ternata Breit. (半夏)

Colletotrichum pinelliae Saw. (炭疽病) 台湾(359).

Pinus armandi Franch. (华山松)*Cronartium quercum* Miyabe (锈病) 河南(13).*Fomes pini* (Thore) Karst. (红色腐朽病) 甘肃(180).**P. bungeana** Zucc. (白皮松)*Fusarium solani* (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) Wr. (萎蔫病) 河北(39).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 河北(39).**P. densiflora** Sieb. et Zucc. (赤松, 日本赤松)*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chev. (落叶病) 江苏(106).**P. koraiensis** Sieb. et Zucc. (海松)*Fusarium solani* (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) Wr. (萎蔫病) 辽宁(39).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 辽宁(39).**P. luchuensis** Mayr. (琉球松)*Cercospora pini-densiflorae* Hori et Nambu (叶斑病) 台湾(354).**P. massoniana** Lamb. (马尾松)*Cercospora pini-densiflorae* Hori et Nambu (叶斑病) 台湾(354).*Coleosporium solidaginis* (Schw.) Thuem. (锈病) 江苏(32, 36).*Cronartium quercum* Miyabe (锈病) “西康”(57), 四川(32, 150, 194), 江苏(32, 36, 201), 浙江(8).*Fusarium aquaeductuum* (Radlk. et Rabh.) Lagh. — (135).*F. avenaceum* (Fr.) Sacc. — (135).*F. bactridioides* Wr. — (135).*F. cavispermum* Corda — (135).*F. culmorum* (Smith) Sacc. — (135).*F. lateritium* Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) — (135).*F. moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) — (135).*F. oxysporum* Schlecht. — (135).*F. sambucinum* Fuck. f. 6 Wr. — (135).

Pinus massoniana Lamb. (馬尾松)*F. scirpi* Lamb. et Fautr. — (135).*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chev. (落叶病) 湖北 (47).*Pestalozzia funerea* Desm. var. *macrochaeta* Speg. 江苏 (102).*Loranthus chinensis* DC. (松寄生) 广西 (160).**P. tabulaeformis** Carr. (短叶松, 油松)*Cenangium abietis* (Pers.) Duby (树枝干枯病, 烂皮病) 河北 (171).*Cronartium quercum* Miyabe (锈病) 浙江 (8).*Fomes pini* (Thore) Karst. (紅色腐朽病) 甘肃 (180).*Fusarium solani* (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) Wr. (萎蔫病) 河北 (39).*Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 河北 (39).**P. taiwanensis** Hay. (台湾松)*Coleosporium asterum* (Diet.) Syd. (锈病) 台湾 (359).**P. thunbergii** Parl. (黑松, 日本黑松)*Pestalozzia macrotricha* Kleb. 江苏 (102).**P. yunnanensis** Franch. (云南松)*Cronartium flaccidum* (Alb. et Schw.) Wint. (锈病) 云南 (306).*C. quercum* Miyabe (锈病) “西康”(34), 云南 (34).*Fomes officinalis* (Vill.) Ames (褐色干腐病) “西康”(33, 34), 云南 (33, 34).*F. pini* (Thore) Karst. (紅色腐朽病) “西康”(33, 34), 云南 (33, 34).*F. pinicola* (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(34), 云南 (34).*Polyporus sulphureus* (Bull.) Fr. (褐色心材腐朽病) “西康”(34), 云南 (34).**P. sp.** (松属)*Armillaria mellea* (Vahl.) Fr. (根腐病) “西康”(57).*Cenangium japonicum* (P. Henn.) Miura (干枯病) 遼宁 (313).*Cronartium quercum* Miyabe (锈病) 浙江 (49).

Pinus sp. (松属)

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. (落叶病) 云南(27, 32, 333), 浙江(49).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).

Piper betle L. (枸橼, 蓑叶, 蘆子)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾(350).

P. futokadsura Sieb.

Mycosphaerella piperis Saw. 台湾(360).

Pisonia aculeata L. (避霜花)

Meliola pisoniae Stev. et Roldan (煤病) 台湾(380).

Pistacia chinensis Bge. (黄連木, 楷, 楷木)

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 河北(213).

Pileolaria pistaciae Tai et Wei (锈病) 山东(66), 安徽(220, 231), 江苏(32, 36, 220, 231), 浙江(32, 36), 江西(231), 台湾(269, 290).

P. terebinthi (DC.) Cast. (锈病) 江苏(32, 36).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 河南(13), 江苏(219).

P. weinmannifolia J. Poiss. (細叶楷木, 清香木)

Pileolaria terebinthi (DC.) Cast. (锈病) 云南(214).

Pisum sativum L. (豌豆)

Aphanomyces euteiches Drechsler (根腐病) 江苏(128).

Ascochyta pisi Lib. (褐斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 四川(75, 150, 221), 云南(212), 貴州(174), 湖南(112), 江苏(128), 广西(112), 台湾(358).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(150), 浙江(8, 49).

Cercospora columnaris Ell. et Ev. (= *Isariopsis griseola* Sacc.) (角斑病) “热河”(345).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) “热河”(345).

C. pisi-sativi Stev. (叶斑病) 四川(150, 215).

C. szechuanensis Tai (叶斑病) 四川(150, 215).

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav.

(*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 吉林(313), “热河”(345).

C. pisi Pat. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 遼宁(294), 四川(221), 广东(233).

Pisum sativum L. (豌豆)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 江苏(128)

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(373), 四川(150).

E. polygoni DC. (白粉病) 吉林(313), 内蒙(372), 四川(194), 云南(111, 112, 212, 213), 贵州(174), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128, 337), 福建(10, 113, 213), 广东(112, 233), 广西(37), 台湾(350).

Fusarium anguioides Sherb. ——(135).

F. lactis Pir. et Rib. ——(135).

F. orthoceras App. et Wr. var. *pisi* Linford ——(135).

F. oxysporum Schlecht. f. 8 Snyder (萎蔫病) ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) Wr. f. 2 Snyder ——(135).

Mycosphaerella pinodes (Berk. et Br.) Vesterg. (暗色斑病) “东北”(294), 四川(150), 云南(212).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江苏(128).

Peronospora pisi Syd. (霜霉病) 四川(150), 云南(212), 河南(13), 江苏(201).

P. viciae de Bary (霜霉病) “西康”(57), 云南(112), 江苏(47, 106, 128).

Phyllosticta phaseolina Sacc. (叶斑病) “热河”(345).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 贵州(174), 江苏(128), 浙江(8, 49, 50, 54), 江西(158), 广西(37), 台湾(350).

Septoria pisi West (斑枯病) 云南(212), 江苏(128).

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) 四川(150), 云南(111, 112, 212), 江苏(106, 128), 浙江(47), 台湾(290).

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson (细菌性疫病) “热河”(345).

花叶病 (Mosaic) 山东(127), 江苏(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根线虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 山东(95), 广东(100).

P. sativum L. var. arvense Poir. (豌豆)

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) 台湾(290).

Pithecolobium dulce Benth. (金龟树)

Corticium salmonicolor Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).

P. lucidum Benth. (亮叶围涎树)

Cercospora spilosticta Syd. (叶斑病) 台湾(360).

Gloeosporium pithecolobiicola Saw. (炭疽病) 台湾(360).

Irenina pithecolobii Yamam. (煤病) 台湾(385).

Pittosporum oligocarpum Hay. (少果海桐)

Meliola elmeri Syd. (煤病) 台湾(380).

Plactycarya sp.

Systremma natans (Tode) Theiss. et Syd. 安徽(231).

S. sambuci (P. et F.) Miller 安徽(231).

Plantago depressa Willd. (車前)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(172).

Peronospora alta Fuck. (霜霉病) 河北(173).

P. formosana Tateishi et Masamune (台湾車前)

Puccinia miscanthi Miura (锈病) 台湾(290).

P. major L. (車前)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 黑龙江(60), 吉林(313), 遼宁(313), 河北(209, 315), 西康(57), 四川(150), 云南(213), 河南(13), 江苏(106, 219).

Peronospora alta Fuck. (霜霉病) 黑龙江(43a), 遼宁(43a), 四川(150).

Puccinia cynodontis Lacroix (锈病) 浙江(8).

P. major L. var. *asiatica* Decne. (車前)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 台湾(350, 354).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Platanus orientalis L. (法国梧桐)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 江苏(201).

Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc. (化香树)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

Platycodon glaucum (Thunb.) Nakai (桔梗)

Septoria platycodonis Syd. (斑枯病) 河南(13).

S. platycodotis Petr. (斑枯病) 山西(340).

P. grandiflorum DC. var. *glaucum* Sieb. et Zucc. (桔梗)

Septoria platycodonis Syd. (斑枯病) 遼宁(313).

Platycodon sp. (桔梗属)

Coleosporium campanulae (Pers.) Lev. (锈病) 貴州 (245).

Plectranthus eriocalyx Dunn

Coleosporium plectranthi Barcl. (锈病) 云南(214).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

P. glaucocalyx Max. (回菜花)

Aecidium plectranthi Barcl. (锈病) “热河”(317).

Coleosporium plectranthi Barcl. (锈病) 吉林(313), “东北”(272, 313), 陝西(7), 安徽(231).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 吉林(313).

Peronospora lamii Al. Br. (霜霉病) 江苏(220, 231).

Septoria plectranthi Miura (斑枯病) 遼宁(313).

Poa annua L. (早熟禾)

Puccinia poae-sudeticae (West) Jorstad (锈病) 四川 (150, 214).

P. nipponica Koidz.

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化矮缩病) 台湾(287).

P. pratensis L. (六月禾, 垦塔启莓系踏草)

Puccinia poae-pratensis Miura (锈病) 吉林(313), 遼宁 (313), “西康”(57).

P. poae-sudeticae (West) Jorstad (锈病) “东北”(273, 290).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

P. serotina Roxb.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

P. sp. (早熟禾属)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 新疆(88).

Epichloe typhina (Pers.) Tul. (香柱病) 吉林(294, 313).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 江苏(231).

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 新疆(88).

P. graminis Pers. (稈锈病) 新疆(88).

P. poae-sudeticae (West.) Jorstad (锈病) 广西(246).

Podocarpus chinensis Wall. (小罗汉松)

Pestalozzia funerea Desm. 江苏(102).

Podocarpus macrophylla Don. (罗汉松)*Pestalozzia shiraiana* P. Henn. 台湾(354).**Pogonatherum crinitum** (Thunb.) Kunth. (金絲草)*Puccinia pogonatheri* Petch (锈病) 台湾(278, 290).**P. paniceum** (Lam.) Hack. (金髮草)*Phyllachora pogonatheri* Syd. (黑痣病) 台湾(360).*Puccinia pogonatheri* Petch (锈病) 台湾(247).**P. sp.** (罗汉松属)*Puccinia pogonatheri* Petch (锈病) 广东(274).**Pollia japonica** Thunb. (杜若)*Cercospora polliae* Saw. (叶斑病) 台湾(360).*Kordyana pollinae* Saw. 台湾(358).*Uromyces commelinae* Cke. (锈病) 台湾(290).**Polygonatum lasianthum***Phyllosticta cruenta* (Fr.) Kickx. 湖南(306).**P. officinale** Allesch. (菱荇, 玉竹)*Cercospora chinensis* Tai (叶斑病) 河北(210).*Macrophoma cruenta* (Fr.) Ferriaris “东北”(313).*Melophia polygonati* Miyake 河北(316).**P. officinale** Allesch. var. **humile** Baker*Ophiosporella komarovii* (Jacz.) Petr. 河北(340).**P. sibiricum** Red. (黄精, 西伯利亚老虎薑)*Rhabdospora umbrosa* Baum. “东北”(313).**P. sp.** (黄精属)*Aecidium dispori* Diet. (锈病) 遼宁(313).*Cylindrosporium komarowi* Jacz. 河北(317).*Phyllosticta cruenta* (Fr.) Kickx. (叶斑病) 河南(13), 江苏(29, 32).*Puccinia smilacinae* Syd. (锈病) 贵州(246).*Rhabdospora umbrosa* Boum. (叶斑病) 河南(13).**Polygonum aviculare** L. (蕹薹)*Cercospora polygonorum* Cke. (叶斑病) 贵州(240).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 吉林(313), 河北(172, 209, 317), “西康”(57), 山东(374), 安徽(219), 江苏(219).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).*Uromyces polygoni-aviculariae* (Pers.) Karst. (锈病) 黑龙江(272), 吉林(313), 遼宁(313), “东北”(272), 河北(63, 66, 316), 新疆(67), “西康”(57), 四川(33, 150, 214), 云南(214), 河南(231), 江苏(32, 36, 106, 231).

Polygonum bistorta L. (拳参)

Puccinia bistortae DC. (锈病) 河北(218, 317), 山东(66).

Sphacelotheca hydropiperis (Schum.) de Bary var. *borealis* Clint. (黑粉病) 黑龙江(153).

P. blumei Meisn. (馬蓼)

Puccinia congesta Berk. et Br. (锈病) 台湾(290).

P. polygoni-amphibii Pers. (锈病) 台湾(290).

Sphacelotheca hydropiperis (Schum.) de Bary (黑粉病) 台湾(288).

Ustilago cordai Liro (黑粉病) 台湾(287).

U. reticulata Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 台湾(358).

P. bungeanum Turcz. (本氏蓼)

Phyllosticta polygoni-bungeanae Miura 吉林(313).

Septoria polygonicola (Lasch.) Sacc. (斑枯病) 吉林(313).

S. polygonina Thuem. (斑枯病) 吉林(313).

Ustilago cordai Liro (黑粉病) 吉林(153), 遼宁(153), 内蒙(153), 山西(153, 198, 340), 安徽(153), 浙江(153), 福建(153), 广东(153), 台湾(153).

U. reticulata Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 吉林(313), 遼宁(313), “西康”(57).

P. campanulatum Hook f. var. fulvidum Hook f.

Ustilago ocrearum Berk. (黑粉病) “西康”(153), 贵州(391).

P. campanulatum Hook f. var. likiangensis (Smith) Steward

Puccinia kweichowana Cummins (锈病) 贵州(246).

P. capitatum Buch.-Ham.

Puccinia fagopyri Barcl. (锈病) 云南(214).

P. chinense L. (火炭母)

Cercospora persicariae Yamam. (叶斑病) 台湾(358).

Guignardia polygoni-chinense Saw. 台湾(360).

Puccinia benokiyamensis Hirat. f. (锈病) 广东(274).

P. calumnata Syd. (锈病) 陕西(7).

P. congesta Berk. et Br. (锈病) 广东(370), 台湾(290).

P. polygonicola Tai (锈病) 湖南(214).

P. polygoni-amphibii Pers. (锈病) 台湾(290).

Ustilago emodensis Berk. (黑粉病) 广西(153), 台湾(152, 153, 288).

- Polygonum chinense** L. var. **thunbergianum** Meisn. (赤地利)
Puccinia benokiyamensis Hirat. f. (锈病) 貴州(246), 台湾(290), 华南(274).
P. congesta Berk. et Br. (锈病) 台湾(290).
- P. convolvulus** L. (莽麦蔓)
Puccinia polygoni-amphibii Pers. (锈病) “东北”(272, 290).
- P. cuspidatum** Sieb. et Zucc. (虎杖)
Aecidium polygoni-cuspidati Diet. (锈病) 江苏(47).
Puccinia polygoni-amphibii Pers. (锈病) 陝西(237), “西康”(57), 四川(150, 214), 云南(214), 湖南(32, 36, 214), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36, 201), 浙江(32, 36, 62, 214), 广西(32, 340).
Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).
- P. hydropiper** L. (蓼, 水蓼)
Cercospora persicariae Yamam. (叶斑病) 台湾(358).
Sphacelotheca hydrpiperis (Schum.) de Bary (黑粉病) 吉林(153), “西康”(153), 云南(153), 湖南(153), 安徽(153, 393), 福建(153), 台湾(153, 288).
Ustilago cordai Liro (黑粉病) 吉林(153), 遼宁(153), 內蒙(153), 山西(153), 四川(149, 150), 安徽(153), 浙江(153), 福建(153), 广东(153), 台湾(153).
- P. hydropiper** L. var. **flaccidum** (Meisn.) Steward (水蓼)
Ustilago cordai Liro (黑粉病) 吉林(153), 遼宁(153), 內蒙(153), 山西(153), 安徽(153), 浙江(153), 福建(153), 广东(153), 台湾(153).
- P. hydropiper** L. var. **maximowiczii** Mak. (細叶蓼)
Ustilago cordai Liro (黑粉病) 福建(10).
- P. japonicum** Meisn. (香薷草)
Phytophthora polygoni Saw. (疫病) 台湾(287, 292, 351).
Ustilago filamenticola Ling (黑粉病) 四川(149, 150, 153).
- P. lapathifolium** L. var. **incanum** Ledeb. (灰毛大馬蓼)
Ustilago reticulata Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 台湾(288).
- P. lapathifolium** L. var. **lanatum** (Roxb.) Steward (錦毛大馬蓼)
Ustilago reticulata Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 山西(153), “西康”(153), 四川(153), 福建(153), 广西(149, 153), 台湾(153).

Polygonum multiflorum Thunb. (何首烏)*Alternaria tenuis* Nees (黑斑病) 四川(150).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台灣(350).*Puccinia polygoni-amphibii* Pers. (銹病) 四川(150), 云南(214), 湖南(32, 36), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 广西(32).*Uromyces polygoni-aviculariae* (Pers.) Karst. (銹病) —— (231).**P. nepalense** Meisn. (荞麦莧)*Puccinia benokiyamensis* Hirat. f. (銹病) 貴州(246).*P. polygonicola* Tai (銹病) 四川(150, 214). 云南(214).*Ustilago nepalensis* Liro (黑粉病) 陝西(153), 湖南(149, 153), 安徽(153).**P. nodosum** Pers. (大馬蓼)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(172), 福建(213).*Ustilago cordai* Liro (黑粉病) 台灣(287).*U. reticulata* Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 台灣(288).**P. orientale** L. (葳草)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(209), 河南(13).*Sclerotinia ciborioides* (Hoffm.) Noack. (菌核病) 江西(195).*Septoria polygonicola* (Lasch.) Sacc. (斑枯病) 吉林(313), 辽宁(313), 江苏(103).*S. polygonorum* Desm. (斑枯病) 江苏(29, 32).**P. orientale** L. var. **pilosum** Meisn. (葳草)*Septoria polygonicola* (Lasch.) Sacc. (斑枯病) 河北(316).*S. polygonina* Thuem. (斑枯病) 河北(315).**P. paleaceum** Wall. var. **pubifolium** Samuels.*Puccinia taliensis* Tai (銹病) 云南(214).**P. perfoliatum** L. (扛板归)*Puccinia polygoni-amphibii* Pers. (銹病) 辽宁(313).**P. sagittatum** L. (雀翘, 秋雀翘)*Sphacelotheca hydropiperis* (Schum.) de Bary (黑粉病)

吉林(153), “西康”(153), 云南(153), 湖南(153), 安徽(153), 福建(153), 台灣(153).

P. sagittatum L. var. **americanum** f. **sieboldi** Mak.*Puccinia polygoni-amphibii* Pers. (銹病) 辽宁(313).

Polygonum thunbergii Sieb. et Zucc. (鹿蹄草)

Puccinia polygoni-amphibii Pers. (锈病) 辽宁(313), 台湾(290).

P. viviparum L. (零余子珍珠菜)

Puccinia bistortae DC. (锈病) 新疆(67).

P. mammillata Schroet. (锈病) 陕西(7).

P. taliensis Tai (锈病) 云南(214).

P. sp. (蓼属)

Aecidium polygoni-cuspidati Diet. (锈病) 广西(246).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河南(13), 浙江(219).

Melanopsichium pennsylvanicum Hirschh. (黑粉病) 四川(153), 云南(32, 104, 153), 贵州(32, 153), 江苏(32, 104, 153), 浙江(32, 153), 台湾(153).

Puccinia benokiyamensis Hirat. f. (锈病) 贵州(246), 安徽(246), 广西(246).

P. bistortae DC. (锈病) 甘肃(35).

P. congesta Berk. et Br. (锈病) 安徽(246), 广西(246).

P. polygoni-amphibii Pers. (锈病) 四川(150).

P. polygoni-wojrichii Miyake (锈病) 贵州(246).

Sphacelotheca hydropiperis (Schum.) de Bary (黑粉病) 湖南(316).

S. hydropiperis (Schum.) de Bary var. *borealis* Clint. (黑粉病) 黑龙江(390).

Uromyces polygoni-aviculariae (Pers.) Karst. (锈病) 河北(166, 197).

Ustilago anhweiana Zundel (黑粉病) 安徽(153, 392).

U. cordai Lira (黑粉病) 广东(389).

U. emodensis Berk. (黑粉病) 广西(153, 393), 台湾(153).

U. ocrearum Berk. (黑粉病) “西康”(153).

U. reticulata Liro (= *U. utriculosa* auct.) (黑粉病) 河北(32, 315), 湖南(32, 104), 江苏(32, 104), 浙江(32).

Polypogon litoralis (With.) Smith (棒头草)

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 四川(150).

Puccinia coronata Corda (锈病) 四川(150), 云南(214).

P. sp. (棒头草属)

Puccinia coronata Corda (锈病) 云南(214).

Poncirus trifoliata Raf. (枳, 枸橘)*Anthina citri* Saw. 台湾(354).*Dothidea tetraspora* B. et Br. var. *citricola* Sacc. 福建(344).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).*Sphaeropsis ponciri* Teng 江苏(29, 32).*Xanthomonas citri* (Hasse) Dowson (潰瘍病) 四川(138), 貴州(138), 湖北(138), 湖南(138), 浙江(138), 江西(138), 福建(138), 广东(138), 广西(138).**Pongamia pinnata** (L.) Merr. (水黃皮)*Phyllachora pongamiae* (Berk. et Br.) Petch (黑痣病) 广东(32, 187).*Ravenelia hobsoni* Cke. (銹病) 广东(275), 台湾(271, 290).**Populus adenopoda** Max. (响叶楊)*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) 吉林(313), 云南(335), 安徽(219).**P. alba** L. (白楊)*Melampsora rostrupii* Wagner (銹病) 江苏(47).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(209).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).**P. italica** L.*Melampsora larici-populina* Kleb. (銹病) 河北(171).**P. laurifolia** Ledeb. (苦楊)*Coniothyrium populicola* Miura 吉林(313).*Cytospora chrysosperma* (Pers.) Fr. (*Valsa sordida* Nitschke) (腐爛病) 吉林(313), 辽宁(313).*Marssonina populicola* Miura 吉林(313).*Mycosphaerella mandshurica* Miura 辽宁(313).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(313).*Phyllosticta populea* Sacc. 辽宁(313).*Uncinula mandshurica* Miura (白粉病) 辽宁(313).*Venturia populina* (Vuill.) Fabr. (黑星病) 辽宁(313).**P. maximowiczii** Henry (馬氏楊, 辽楊)*Melampsora larici-populina* Kleb. (銹病) “东北”(289).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 黑龙江(60).

Populus nigra L. (欧洲黑楊)*Rhabdospora longispora* Ferraris 江苏(29,32).*Uredo tholopsora* Cummins (銹病) 貴州(246).**P. nigra L. var. pyramidalis Spach. (塔花黑楊)***Cytospora chrysosperma* (Pers.) Fr. (*Valsa sordida* Nitschke) (腐烂病) 辽宁(313).**P. pyramidalis Borkh. (美国白楊, 黑楊)***Phyllosticta populina* Sacc. 山东(374).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**P. rotundifolia Griff. (喜馬拉雅白楊)***Melampsora rostrupii* Wagner (銹病) 云南(214).**P. simonii Carr. (河楊, 南京白楊, 小叶楊)***Coniothyrium populicola* Miura 河南(13).*Melampsora larici-populina* Kleb. (銹病) 河北(64).*Myxosporium rimosum* Fautr. 河南(13).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(208).*Uncinula mandshurica* Miura (白粉病) “东北”(371).*U. salicis* (DC.) Wint. (白粉病) 河南(13,213).*Loranthus yadoriki* Sieb. (樟寄生) 湖南(160).**P. suaveolens Fisch. (小叶楊)***Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(172).**P. szechuanica Schneid. (川楊)***Fomes fomentarius* (L.) Gill. (白色腐朽病) 甘肅(180).*F. igniarius* (L.) Kickx. (白色腐朽病) 甘肅(180).**P. tomentosa Carr. (毛白楊, 响楊)***Capnodium salicinum* Mont. (煤病) 河北(171).*Fusarium ciliatum* Lk. ——(135).*F. sarcochroum* (Desm.) Sacc. ——(135).*Melampsora magnusiana* Wagner (銹病) 陝西(7).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(116), 四川(150,226).*Uredo tholopsora* Cummins (銹病) 广西(246).**P. tremula L. (山楊)***Melampsora rostrupii* Wagner (銹病) 河北(171).**P. tremula L. var. davidiana Schneid. (山楊)***Fomes fomentarius* (L.) Gill. (白色腐朽病) 甘肅(180).*F. igniarius* (L.) Kickx. (白色腐朽病) 甘肅(180).

Populus tremula L. var. davidiana Schneid. (山楊)*Melampsora laricis* Hart. (銹病) 陝西(7).*M. magnusiana* Wagner (銹病) 黑龍江(273), 東北(273).*Trametes suaveolens* (L.) Fr. (白色心材腐朽病) 甘肅(180).**P. tremula L. var. villosa Weam. (毛山楊)***Melampsora rostrupii* Wagner (銹病) 河北(171).**P. yunnanensis Dode (三真楊)***Melampsora larici-populina* Kleb. (銹病) 雲南(214).**P. sp. (楊屬)***Capnodium salicinum* Mont. (煤病) 河北(374).*Cytospora chrysosperma* (Pers.) Fr. (*Valsa sordida* Nitschke) 遼寧(259), 河北(259, 374), 新疆(88), “西康”(57).*Fomes ignarius* (L.) Kickx. (白色腐朽病) “西康”(33, 34), 雲南(34), 河南(13).*Macrophoma tumefaciens* Shear (枝瘤病) 河南(13).*Marssonina populicola* Miura (葉斑病) 河南(13).*Melampsora magnusiana* Wagner (銹病) 陝西(7).*M. rostrupii* Wagner (銹病) 雲南(214).*Phyllosticta populea* Sacc. 河北(315).*Septoria populicola* Pk. (斑枯病) 河南(13).*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) “西康”(57), 雲南(213).*Uredo tholopsora* Cummins (銹病) 安徽(246).*Valsa populina* Fuck. (枝枯病) 河北(47).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(49).*Viscum album* Mistel. (槲寄生) 河南(13).**Portulaca oleracea L. (馬齒莧)***Albugo portulacae* (DC.) Kuntze (白銹病) 吉林(313), 遼寧(313), “東北”(287), 河北(47, 166), 四川(150, 193), 河南(13, 374), 江蘇(106, 231), 浙江(231).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣(350).**Potentilla chrysantha Trivir. (金花委陵菜)***Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (銹病) 新疆(67).**P. conferta (密花委陵菜)***Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (銹病) 河北(340).

Potentilla cryptotaemiae Max.*Phragmidium papillatum* Diet. (锈病) 辽宁(313).**P. discolor** Bge. (异色委陵菜)*Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (锈病) “东北”(273,290).**P. fragarioides** L.*Uredo nervicola* Tranzsch. (锈病) “东北”(375).**P. fragarioides** L. var. *sprengeliana* Max.*Pucciniastrum potentillae* Komar. (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272).*Uredo nervicola* Tranzsch. (锈病) “东北”(290).**P. kleiniana** W. et A. (蛇含)*Phragmidium brevipedicellatum* Hirat. (锈病) “东北”(272,290), 云南(214).*Septoria potentillica* Thuem. (斑枯病) 河南(13).**P. nivea** L. (白里金梅)*Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (锈病) 河北(218).**P. paradoxa** Nuttall (委陵菜)*Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (锈病) “东北”(273).**P. supina** L. (朝天委陵菜)*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau 辽宁(313).*Peronospora potentillae* de Bary (霜霉病) 辽宁(43a).*P. potentillae* de Bary var. *reptantis* Gaum. (霜霉病) 吉林(313), 辽宁(313), 东北(287), 河北(173).*Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313).**Pourthiaea benthamiana** Nakai*Gymnosporangium japonicum* Syd. (锈病) 台湾(290).**P. laevis** Koidz.*Gymnosporangium haraeae* Syd. (锈病) “东北”(290).**P. seoulensis** Nakai*Gymnosporangium haraeae* Syd. (锈病) 台湾(290).**P. villosa** Decne. (老叶儿树)*Gymnosporangium haraeae* Syd. (锈病) “东北”(290).

Pouzolzia zeylanica Burm. var. *alienata* Sasaki (雾水葛)

Cercospora mysorensis Thirum. et Chupp (叶斑病) 台湾 (360).

Mycosphaerella pouzolziae Saw. 台湾 (360).

Primula forbesii Fr.

Puccinia primulae Grev. (锈病) 云南 (212).

Primula sinensis Lindl. (藏报春)

花叶病 (Mosaic) 江苏 (127).

Principia utilis Royle (扁核木)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南 (213).

Prunus ansu Komar. (苦杏仁)

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 江苏 (231).

P. armeniaca L. (杏)

Alternaria tenuis Nees 四川 (150, 225).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川 (150).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 山东 (321), 江苏 (128).

Cladosporium carpophilum Thuem. (疮痂病) 四川 (150), 江苏 (128).

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 河北 (315), “西康” (57).

Fomes fulvus (Scop.) Gill. 辽宁 (259), 河北 (20, 259).

Fusicoccum pruni Potebnia 河南 (374).

Gloeosporium serotinum Ell. et Ev. (炭疽病) 四川 (150).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 四川 (150, 224).

Phomopsis amygdalina Canonaco 四川 (150).

Phyllosticta prunicola Sacc. 辽宁 (96).

Polystigma deformans Syd. (杏疗病) 辽宁 (96), 河北 (168, 222, 366), 山东 (10).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 河北 (116, 222), 四川 (150), 河南 (13), 江苏 (30, 32, 106, 128), 广西 (30, 32).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江 (8).

S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江 (8).

Taphrina mume Nishida (肿叶病) 河南 (13), 山东 (11).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 辽宁 (96).

Valsa japonica Miyabe et Hemmi (枝枯病) 黑龙江 (60).

Prunus armeniaca L. (杏)

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Dowson
(根头癌肿病) 江苏(128).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (細菌性穿孔病) 河北(321), 山东(321).

P. armeniaca L. var. ansu Max. (山杏)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(225).

Cladosporium carpophilum Thuem. (疮痂病) 四川(225).

Gloeosporium serotinum Ell. et Ev. (炭疽病) 四川(225).

Leucostoma persoonii (Nit.) Tagashi (*Valsa leucostoma* (Pers.) Fr.) 山东(374).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (輪紋病) 四川(225).

Phomopsis amygdalina Canonaco 四川(225).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 四川(225).

Septobasidium tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 台湾(351).

P. avium L. (欧洲甜樱桃)

Diaporthe eres Nisch. 河北(374).

P. brachypoda Batalin (短柄樱桃)

Taphrina pruni (Fuck.) Tul. (缩叶病) 云南(306).

P. campanulata Max. (福建山樱花)

Cercospora prunicola Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(358).

P. cerasus L. (欧洲酸樱桃)

Alternaria cerasi Potebnia (黑斑病) 辽宁(294, 313), “西康”(57).

Caeoma makinoi Kusano (锈病) 云南(306).

Cercospora circumscissa Sacc. (叶斑病) 辽宁(294), 江苏(128).

Coccomyces hiemalis Higg. (叶穿孔病) 贵州(196).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 辽宁(294), “东北”(313), 江苏(128, 231).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).

S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (細菌性穿孔病) 辽宁(294).

Prunus communis Fritsch (巴旦杏, 扁桃)

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary (白粉病) 台湾 (350).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 浙江(47), 广东(141).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 台湾(350).

S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 台湾(351).

P. davidiana Franch. (山桃, 山毛桃)

Fomes fulvus (Scop.) Gill. (白腐病) 河北(259).

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary (白粉病) 河北 (116, 172).

P. domestica Linn. (西洋李, 欧洲李, 洋李)

Cercospora circumscissa Sacc. (叶斑病) 四川(32), 江苏(32), 广东(32), 广西(32).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 江苏(30, 32), 广西(30, 32).

Septobasidium tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 台湾(351).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (黑斑病) 湖南(112).

P. donarum Sieb.

Fusicoccum persicae Ell. et Ev. 台湾(354).

Septobasidium tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 台湾(351).

P. glandulosa Thunb. (麦李)

Taphrina truncicola Kusano (缩叶病) ——(371).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 山东 (63, 66).

P. humulis Bge. (欧李)

Taphrina truncicola Kusano (缩叶病) 辽宁(313).

P. manshurica Kochne. (辽杏)

Caeoma makinoi Kusano (锈病) 吉林(294), 辽宁(294, 313), “东北”(313).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 辽宁(294).

Clasterosporium degenerans Syd. 辽宁(294, 313).

Coniothyrium pyrinum (Sacc.) Sheld. 辽宁(294, 313).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 辽宁(294, 313).

Prunus manshurica Kochne. (辽杏)

Taphrina mume Nishida (縮叶病) 辽宁(294,313),“西康”(57).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (銹病) 吉林(294,313),辽宁(294).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (細菌性穿孔病) 黑龙江(294),辽宁(294).

P. mume Sieb. et Zucc. (梅)

Alternaria tenuis Nees 四川(150,225).

Aspergillus luchuensis Inui 四川(150,225).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 四川(150),广东(233).

Cladosporium carpophilum Thuem. (疮痂病) 四川(150,225).

Clasterosporium degenerans Syd. 江苏(47).

Cylindrosporium padi Karst. (穿孔病) “华南”(342).

Gliocladium mumicola Wei 四川(150,225).

Gloeosporium amygdalinum Bri. (炭疽病) 四川(150,225).

G. serotinum Ell. et Ev. (炭疽病) 四川(225).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 四川(150),浙江(8).

S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8),台湾(351).

T. mume Nishida (縮叶病) 貴州(174),江苏(106),浙江(49).

P. mume Sieb. et Zucc. var. **formosana** Masam. (梅)

Cercospora circumscissa Sacc. (叶斑病) 台湾(358).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (銹病) 台湾(290).

P. padus L. (稠梨,夜合)

Cylindrosporium padi Karst. “西康”(57).

P. persica Stokes (桃)

Alternaria tenuis Nees 四川(150,225).

Aspergillus luchuensis Inui 四川(150,225).

A. versicolor (Vuill.) Tirobuschi 四川(150,225).

Prunus persica Stokes (桃)

- Cercospora circumscissa* Sacc. (穿孔病) 河北(222,321), “西康”(57), 四川(32,150), 云南(111,112,212), 江苏(29, 32,106,128), 福建(10,121), 广东(29, 32, 79, 199), 广西(32).
- Cercospora persicae* Sacc. (白霉病) 辽宁(294), “西康”(57), 江苏(47,106), 广东(79).
- Cladosporium carpophilum* Thuem. (疮痂病) 河北(321), “西康”(57), 四川(150,225), 山东(11), 江苏(128), 广东(80, 112,233), “华南”(342).
- Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh. “西康”(57), 安徽(47).
- Coniothyrium nakatae* Hara (圓星病) 山西(321), 山东(321).
- Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 四川(150).
- Cylindrosporium padi* Karst. “西康”(57), 福建(10,183).
- Fomes fulvus* (Scop.) Gill. 河北(20), 山东(321), 江苏(128).
- Fumago vagans* Pers. (煤病) 云南(111,112), 江苏(106), 广东(344), 广西(344).
- Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. —(135).
- F. cerasi* Roll. et Ferry —(135).
- F. lateritium* Nees (*Gibberella baccata* (Eallr.) Sacc.) —(135).
- Gloeosporium laeticolor* Berk. (炭疽病) 辽宁(294), 河北(116), 貴州(174), 江苏(128,186).
- G. serotinum* Ell. et Ev. (炭疽病) 四川(150,225), 江苏(231).
- Guignardia pruni-persicae* Saw. 台湾(358).
- Leucostoma persoonii* (Nit.) Togashi (*Valsa leucostoma* (Pers.) Fr.) (胴枯病) 河北(222, 321), 新疆(88), 山东(11).
- Leucotelium pruni-persicae* (Hori) Tranzsch. (銹病) “西康”(57), 四川(221), 云南(212), 貴州(245), 湖南(214), 安徽(245), 江苏(32,36,106,128,205), 广东(79).
- Macrophoma kawatsukai* Hara (*Physalospora piricola* Nose) (輪紋病) 四川(150,224,225).

Prunus persica Stokes (桃)

- Mycosphaerella pachyasca* Rost. 山东(321).
M. persicae (Saoc.) Higg. 四川(150).
Nothopatella chinensis Miyake 河北(315).
Phomopsis amygdalina Canonaco 四川(150,225).
Phyllosticta persicae Sacc. 河北(166,197).
Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary (白粉病) 河北(166,197),云南(213),广东(79),台湾(350).
Rkizopus artocarpus Rac. 四川(150,225).
R. nigricans Ehrb. (軟腐病) 辽宁(294,313),四川(150,225).
Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 四川(150,194,225),云南(111,212),山东(11),江苏(106,128),浙江(49,231).
Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8),台湾(350).
S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8),台湾(351).
Taphrina defromans (Berk.) Tul. (缩叶病) 辽宁(294,313),陕西(167),“西康”(57),四川(75,150),云南(111,112,212),贵州(174),山东(11),安徽(231),江苏(32,47,106,128,201),浙江(8,49).
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 四川(75,150),云南(111,112,212,214),湖南(112),江苏(32,36,201),江西(245),福建(10,113,183),广东(79,112,205,274,362),广西(245,274),台湾(290),“华南”(342).
Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(150,225).
Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 辽宁(138,294),河北(222),江苏(128).
Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (细菌性穿孔病) 辽宁(96,138,294),河北(138,222,321),山西(321),陕西(138),“西康”(57),四川(75,138),云南(112),湖北(138),湖南(112),河南(138),山东(11,138,321),江苏(128,138),浙江(138),江西(10),广东(112),广西(112).
Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164,165).
Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).
 流胶病 (Gummosis) 福建(113),“华南”(342).
 簇生病 (Rosette) 河北(321).
 黄化病 (Yelloosing) “华南”(342).

Prunus persica Stokes var. **vulgaris** Max. (桃)

Alternaria cerasi Potebnia 河南(374), 山东(374), 安徽(374).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 河南(13).

Cladosporium carpophilum Thuem. (疮痂病) 台湾(355).

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 河北(315).

Coniothyrium nakatae Hara 安徽(374).

Coryneum beyerinckii Oud. (穿孔病) 河南(13).

Fomes fulvus (Scop.) Gill. 河北(259, 374).

Gloeosporium laeticolor Berk. (炭疽病) 河南(13).

Leucostoma persoonii (Nit.) Togashi (*Valsa leucostoma* (Pers.) Fr.) 河南(374).

Leucotelium pruni-persicae (Hori) Tranzsch. (锈病) 台湾(290).

Macrophoma macrospora (McAlp.) Sacc. et Sacc. 河南(374).

Phyllosticta circumscissa Cke. (叶斑病) 河南(13).

Rhizopus nigricans Ehrb. (软腐病) 河南(13).

Taphrina deformans (Berk. Tul.) (缩叶病) 河南(13).

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 河南(13).

P. pseudocerasus Lindl. (樱桃)

Cercospora circumscissa Sacc. 辽宁(96), 河北(222), 四川(32, 75), 河南(13), 江苏(32, 106), 广东(32), 广西(32).

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 江苏(106).

Coniothyrium piricola Potebnia (斑点病) 辽宁(96).

Meliola kusanoi P. Henn. (煤病) 河北(166), 江苏(106).

Mycosphaerella cerasella Aderh. (穿孔性褐斑病) 河北(321), 山东(321).

Phyllosticta vulgaris Desm. var. *philadelphi* Sacc. 江苏(47).

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary (白粉病) 四川(150, 208).

Sclerotinia kusanoi P. Henn. (菌核病) 辽宁(96).

Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. (根头癌肿病) 河北(222).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (细菌性穿孔病) 辽宁(96), 河北(222).

Prunus salicina Lindl. (李)

Alternaria tenuis Nees 四川(150,225).

Aspergillus luchuensis Inui 四川(150,225).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 河北(222).

Coryneum beyerinckii Oud. 河南(13).

Gloeosporium serotinum Ell. et Ev. (炭疽病) 四川(150, 225).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (輪紋病) 四川(150,224,225).

Penicillium corylophilum Dierckx. (青霉病) 四川(150, 225).

Phomopsis amygdalina Canonaco 四川(225).

Podosphaera tridactyla (Wallr.) de Bary (白粉病) 浙江(208).

Polystigma rubrum (Pers.) DC. (紅点病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294,313), 辽宁(96,294), 四川(150), 云南(212), 貴州(174).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).

S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 貴州(174), 浙江(49), 广西(37).

Taphrina pruni (Fuck.) Tul. (縮叶病) 黑龙江(294), 貴州(174).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 四川(150), 广东(233).

Xanthomonas pruni (Smith) Dowson (細菌性穿孔病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(96,294), 河南(13), 山东(138, 321), 福建(10).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

P. salicina Lindl. var. **typica** Nakai (李)

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 台灣(290).

P. tomentosa Thunb. (梅桃, 梅李, 山櫻桃)

Cylindrosporium pruni-tomentosi Miura 吉林(294,313), 辽宁(313).

Taphrina pruni (Fuck.) Tul. (囊果病) 吉林(294,313), 辽宁(294,313), “西康”(57).

Prunus yedoensis Matsum. (东京樱花, 日本樱花)

Cercospora prunicola Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(358).

P. sp. (李属)

Botryodiplodia malorum (Berk.) Pet. et Syd. 山东(374).

Cercospora circumscissa Sacc. (穿孔病) 河北(51), 山东(51).

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. 湖北(316).

Fomes fulvus (Scop.) Gill. 云南(33).

Leucotelium pruni-persicae (Hori) Tranzsch. (锈病) 贵州(245), 湖南(231), 江苏(231).

Napicladium brunaudii Sacc. “热河”(317).

Phoma enteroleuca Sacc. ——(332).

Phyllosticta persicae Sacc. 河北(317).

Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc. 陕西(237), 湖南(315).

P. rubrum (Pers.) DC. (红点病) 河北(315), 陕西(237), “西康”(57), 云南(212).

Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) “西康”(57).

Stereum purpureum Pers. (银叶病) 河南(13).

Taphrina cerasi (Fuck.) Tul. (簇生病) 辽宁(313).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (锈病) 广西(245).

Pseudosasa uzawai Nakai.

Meliola phyllostachydis Yamam. (煤病) 台湾(382).

P. sp.

Meliola phyllostachydis Yamam. (煤病) 台湾(387).

Pseudostellaria heterophylla Pax (太子参)

Melampsorella caryophyllacearum Schroet. (锈病) 山西(340).

Psidium guayava L. (番石榴)

Aithaloderma clavatisporum Syd. (煤病) “华南”(342).

Cercospora sawadae Yamam. (叶斑病) 台湾(351, 377).

Microxyphium obtusulum Sacc. 广东(344).

Myxosporium psidii Saw. et Kurosawa 台湾(354).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Psidium guayava L. (番石榴)

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 广东(80).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 福建(10).

Psychotria rubra Poir. (九节木)

Cercospora psychotriae Saw. (叶斑病) 台湾(360).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Pterocarya stenoptera DC. (枫杨)

Melanconium oblongum Berk. 江苏(29, 32).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) “西康”(57), 四川(150, 213, 226, 231), 贵州(213), 河南(13), 安徽(219), 江苏(219).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. yadoriki Sieb. (樟寄生) “西康”(57).

Viscum album Mistel. (槲寄生) 河南(13).

Pteroceltis tartarinowii Max. (青檀)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河南(13), 安徽(219).

Pterospermum acerifolium Willd. (槭叶翅子树)

Nectria pterospermi Saw. 台湾(355).

Pueraria peduncularis Grah. (云南葛藤)

Uncinulopsis polychaeta (B. et C.) Wei (白粉病) 云南(213).

P. phaseoloides Benth. (三裂叶野葛)

Synchytrium minutum (Pat.) Gaum. 广东(370).

P. thunbergiana Benth. (葛)

Cephalosporium puerariae Saw. 台湾(360).

Cercospora pueraricola Yamam. (叶斑病) 云南(212), 贵州(215), 台湾(358, 376).

Guignardia puerariae Saw. 台湾(359).

Marssonina puerariae Saw. 台湾(360).

Meliola banosensis Syd. (煤病) 台湾(380).

P. thunbergiana Benth. (葛)

Mycosphaerella puerariae (Keissler) Petr. (= *M. puerariae* Saw.) 台湾(359).

Pueraria thunbergiana Benth. (葛)*Pellicularia sasakii* (Shiral) Ito 台湾(350).*Phakopsora pachyrhizi* Syd. (锈病) 台湾(264,280).*Phyllosticta puerariicola* Saw. 台湾(360).*Ramularia puerariae* Saw. 台湾(358).*Synchytrium minutum* (Pat.) Gaum. 辽宁(313), 东北(287), 江苏(47), 台湾(287,356,359).*Tubercularia puerariae* Saw. 台湾(360).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164,165).**P. thunbergiana** Benth. var. **typica** Honda (葛)*Phakopsora pachyrhizi* Syd. (锈病) 陕西(7), 贵州(245), 湖南(214), 江西(245), 台湾(289).**P. sp.** (葛属)*Meliola banosensis* Syd. (煤病) 台湾(387)*Mycosphaerella puerariae* (Keissler) Petr. 云南(305).**Pulsatilla cernua** Spreng.*Coleosporium pulsatillae* (Strauss.) Lev. (锈病) “东北”(289).*Tranzschelia pulsatillae* (Opiz.) Diet. (锈病) “东北”(290); 四川(150,214).**P. chinensis** (Bge.) Regel. (白头翁)*Coleosporium pulsatillae* (Strauss.) Lev. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313), “东北”(272).*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet. (锈病) 吉林(313).*T. pulsatillae* (Opiz.) Diet. (锈病) 黑龙江(313), 辽宁(313), “东北”(290), 河北(218), 山西(349).**P. dahurica** Spreng.*Coleosporium pulsatillae* (Strauss.) Lev. (锈病) “东北”(272).**P. koreana** Nakai*Tranzschelia pulsatillae* (Opiz.) Diet. (锈病) “东北”(272,290).**P. sp.** (白头翁属)*Aecidium pulsatillae* Tranzsch. (锈病) “东北”(290).

Punica granatum L. (石榴)

Aspergillus niger Tiegh. 四川(150), 河南(13), 江苏(122).

Cercospora punicae P. Henn. (叶斑病) “西康”(57), 四川(150), 云南(212, 215), 贵州(174), 湖南(112, 317), 河南(13), 江苏(128, 231), 广东(79), 台湾(357, 358).

Monochaetia pacyspora Bubak. 河南(13).

Penicillium purpurogenum Stoll (青霉病) 江苏(122).

Physalospora granati Tagashi 河南(374).

Zythia versioniana Sacc. (干腐病) 云南(212), 河南(13), 江苏(122, 128, 217), 福建(10).

Pseudomonas sp. 云南(111).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Pyracantha sp. (火把果属)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).

Pyrola rotundifolia L. var. incarnata DC. (鹿蹄草),

Chrysomyxa pyrolae (DC.) Rostr. (锈病) 黑龙江(313).

Pyrus betulifolia Bge. (棠梨)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 河北(67), 湖北(220), 河南(13), 江苏(220).

Pestalozzia guepini Desm. 江苏(103).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 云南(111).

P. bretschneideri Rehd. (白梨)

Alternaria gaisen Nagano 辽宁(96).

Armillaria mellea (Vahl.) Fr. (根腐病) 河北(222).

Coniothyrium piricola Potebnia 河北(222).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 河北(116).

Diplodia natalensis Ev. (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑色蒂腐病) 四川(224).

Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pirina* Aderh.) (黑星病) 辽宁(96), 河北(116, 222).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (炭疽病) 河北(222).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 辽宁(96).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 四川(150).

Pyrus bretschneideri Rehd. (白梨)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(219).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 河北(222).

Valsa ambiens Fr. (枝枯病) 河北(222).

Eriophyes piri Nal. (毛毡病) 河北(222).

P. calleryana Dcne. (豆梨)

Alternaria mali Roberts (大星病) “西康”(57).

Coniothyrium piricola Potebnia “西康”(57).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) “西康”(57), 浙江(220, 231), 广东(79).

Hendersonia piricola Sacc. “西康”(57), 广东(79).

Phyllosticta erratica Ell. et Ev. 广东(79).

P. pirina Sacc. 广东(79).

Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) (斑枯病) “西康”(57), 广东(79).

P. communis L. (西洋梨)

Alternaria bokurai Miura 辽宁(294).

Cercospora piricola Saw. (叶斑病) 台湾(350).

Coniothecium intricatum Peck 辽宁(294).

Coniothyrium piricola Potebnia 黑龙江(313), 辽宁(294), “西康”(57).

Diaporthe ambigna (Sacc.) Nitschke (枝枯病) 河北(32), 山东(11).

Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pirina* Aderh.) (黑星病) 黑龙江(294), 河北(222).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 吉林(294), 辽宁(294), 河北(222).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 四川(150).

Penicillium expansum Link (青霉病) 辽宁(294).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(294).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Pyrus communis L. (西洋梨)

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 河南(13), 山东(321).

Trichothecium roseum (Bull.) Link. 辽宁(294).

Valsa ambiens Fr. (枝枯病) 辽宁(294), 河北(222).

Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (火疫病) 河北(321), 广东(141).

Eriophyes piri Nal. (毛毡病) 黑龙江(294), 辽宁(294), “热河”(294).

P. communis L. var. bartlett (洋梨)

Clomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld.

(炭疽病) 江苏(122).

P. communis L. var. kieffer

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld.

(炭疽病) 江苏(122).

P. fauriei Schneid.

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) “东北”(290).

P. lindleyi Rehd. (岭南梨)

Cercospora piricola Saw. (叶斑病) 台湾(350).

Cytospora carphosperma Sacc. (枝枯病) “西康”(57).

Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pyrina* Aderh.) (黑星病) 台湾(358).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 辽宁(313), 山西(340), “西康”(57), 湖南(317).

Helicobasidium mompa Tanaka (紫纹羽病) 河北(374).

Ochropsora ariae (Fuck.) Syd. (= *O. sorbi* (Oud.) Diet.) 台湾(358, 368).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(350).

Septoria piri Miyake (斑枯病) 湖北(315).

P. pashia Buch.-Ham. (川梨, 糖刺梨)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 云南(213).

P. serotina Rehd. (沙梨)

Alternaria tenuis Nees 四川(150).

Coniothyrium piricola Potebnia “西康”(57).

Cytospora carphosperma Sacc. (腐烂病) “西康”(57).

Diplodia natalensis Ev. (*Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke.) (黑腐病) 四川(150).

Pyrus serotina Rehd. (沙梨).

Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pyrina* Aderh.) (黑星病) 辽宁(313), 四川(150), 台湾(358).

Gloeosporium album Osterw. (炭疽病) 四川(150).

Gymnosporantium haraeaeum Syd. (锈病) 辽宁(294, 313), “东北”(273), 河北(64, 66, 116), 山西(340), 贵州(196), 湖南(306), 江苏(220), 福建(121).

Hendersonia piricola Sacc. “西康”(57).

Leptothyrium pomi (M. et F.) Sacc. 河北(116).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (輪紋病) 四川(150), 福建(121).

Ochropsora ariae (Fuck.) Syd. (= *O. sorbi* (Oud.) Diet.) 台湾(358).

Pestalozzia traverseta Sacc. 四川(150).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(313), 河北(219), 四川(150), 云南(213), 湖南(219), 台湾(283, 256).

Phyllosticta pirina Sacc. 四川(150).

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 四川(150).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 辽宁(313).

Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) (斑枯病) 辽宁(313), “西康”(57), 四川(150).

Taphrina bullata (B. et Br.) Tul. 辽宁(313).

Valsa ambiens Fr. (枝枯病) 辽宁(313).

Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (火疫病) 广东(141).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. yadoriki Sieb. (樟寄生) 广西(160).

P. serotina Rehd. var. *culta* Rehd. (紫酥梨)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 河北(64).

P. sinensis Lindl. var. *culta* Mak. (和梨)

Alternaria bokurai Miura 辽宁(294).

Coniothecium intricatum Peck 辽宁(294).

Coniothyrium piricola Potebnia 辽宁(294).

Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pyrina* Aderh.) (黑星病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Pyrus sinensis Lindl. var. *culta* Mak. (和梨)

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 吉林(294), 辽宁(294).

Ochropsora ariae (Fuck.) Syd. (= *O. scrbi* (Oud.) Diet.) 台湾(272,289).

Penicillium expansum Link (青霉病) 辽宁(294).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 辽宁(294).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) (斑枯病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 辽宁(294).

Valsa ambiens Fr. (果腐病) 辽宁(294).

Eriophyes piri Nal. (毛毡病) 黑龙江(294), 辽宁(294), “热河”(294).

P. ussuriensis Max. (花盖梨, 野梨)

Alternaria gaisen Nagano (黑斑病) 江苏(122).

Aspergillus niger Tiegham 江苏(122).

Cercospora mali Ell. et Ev. (叶斑病) 湖南(316).

Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pirina* Aderh.) (黑星病) 辽宁(96), 河北(222).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 河北(222), 江苏(125).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 辽宁(64), 四川(150).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 江苏(18).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150).

Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) (斑枯病) “热河”(315), 四川(150), 江苏(18).

Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 江苏(18).

Trichothecium roseum (Bull.) Lk. (果腐病) 江苏(122).

Valsa ambiens Fr. (腐烂病) 河北(222), 江苏(18).

Eriophyes piri Nal. (毛毡病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(492).

Pyrus ussuriensis Max. var. (大梨)

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 云南(111).

Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 云南(111).

P. sp. (梨属)

Alternaria bokurai Miura 辽宁(313).

A. gaisen Nagano 辽宁(96), 河南(13), 江苏(128), 浙江(8), 广东(80).

Cercospora mali Ell. et Ev. (叶斑病) 西康(57).

C. piricola Saw. (叶斑病) 广东(233).

Colletotrichum piri Noack. f. *tiroliense* Bubak 河北(51), 河南(13).

Coniothecium intricatum Peck 辽宁(313).

Coniothyrium piricola Potebnia (白斑病) 辽宁(96), 河北(51, 321), 山东(51, 321), 安徽(51), 江苏(51).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 河北(116).

Cytospora carphosperma Sacc. “西康”(57).

Diaporthe ambigua (Sacc.) Nitschke 山东(11).

Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. (*Venturia pyrina* Aderh.) (黑星病) 辽宁(96), 河北(51, 321), 陕西(144), 甘肃(167), “西康”(57), 四川(75), 云南(112, 212), 贵州(174), 河南(13), 山东(11, 51, 321), 安徽(51), 江苏(51, 106), 广东(233).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) “西康”(57), 云南(112, 212), 山东(11), 江苏(128).

Gymnosporangium haraeaeum Syd. (锈病) 河北(222, 321), “西康”(57), 四川(73, 75, 194), 云南(212), 贵州(174), 湖南(112), 河南(13, 66), 山东(11), 江苏(128, 201, 220), 浙江(8, 49), 福建(10), 广东(233), 广西(37, 178).

Leptosphaeria pomona Sacc. 江苏(128).

Macrophoma kawatsukai Hara (*Physalospora piricola* Nose) (轮纹病) 四川(224), 山东(11, 15), 江苏(231), 福建(10).

Macrosporium pirorum Cke. 河北(51), 江苏(128).

Neofabraea malicorticis (Cord.) Jackson (潰瘍病) 江苏(128).

Pyrus sp. (梨属)

- Pestalozzia sorbi* Pat. 福建(220,231).
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 河北(209, 222), 河南(13), 山东(11,14).
Phyllosticta pirina Sacc. 河北(51), 云南(111,112), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).
Podosphaera oxyacantha (DC.) de Bary (白粉病) “西康”(57).
Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 河北(222), 江苏(128), 福建(10).
Rosellinia necatrix (Hart.) Berl. (白紋羽病) 山东(11).
Sclerotinia fructigena Aderh. et Ruhl. (褐腐病) “西康”(57), 云南(112,212), 河南(13).
S. laxa Aderh. et Ruhl. (褐腐病) 貴州(174).
Seplobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).
S. tanakae (Miyabe) Boed. et Steinm. (膏药病) 浙江(8).
Septoria piricola Desm. (*Mycosphaerella sentina* (Fr.) Schroet.) (斑枯病) 四川(75), 云南(112,212), 湖南(112), 河南(13), 广东(112).
Sphaeropsis malorum Pk. (*Physalospora obtusa* (Schw.) Cke.) (黑腐病) 江苏(128).
Stagonospora mali Delacr. 河北(316).
Taphrina bullata (B. et Br.) Tul. (肿叶病) 貴州(174), 河南(13).
Trichothecium roseum (Bull.) Link (果腐病) 辽宁(96), 河北(51,116), 河南(13), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).
Valsa ambiens Fr. 辽宁(96).
Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (火疫病) “西康”(57), 河南(13), “华东”(344), 江西(158).
Pseudomonas sp. 云南(111).
Eriophyes piri Nal. (毛毡病) 辽宁(96), 河北(321), 山东(11).
Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 福建(10).
- Quercus acutissima** Carr. (麻櫟)
- Cronartium quercum* Miyabe (锈病) 云南(214), 貴州(214).
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et de Not. 江苏(103).

Quercus acutissima Carr. (麻櫟)

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (基腐病) 江苏(19).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 四川(213, 226), 貴州(213).

Sphaerotheca lanestris Harkness (白粉病) 广西(208).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) “西康”(57).

Q. aliena Bl. (槲櫟, 婆罗櫟)

Gloeosporium quercinum West. (*Gnomonia quercina* Kleb.) (炭疽病) 河南(13).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) “热河”(317), 四川(150).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 貴州(213), 湖南(213).

Typhulochaeta japonica Ito et Hara (白粉病) 四川(150, 213, 226).

Q. baronii Skan. (檀子树)

Typhulochaeta japonica Ito et Hara (白粉病) 四川(213).

Q. delavayi Franch. (黄櫟)

Sphaerotheca lanestris Harkness (白粉病) 云南(213).

Q. dentata Thunb. (槲树)

Cronartium quercum Miyabe (泡锈病) “西康”(57), 江苏(201).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 江苏(106).

M. alni (Wallr.) Salm. var. *dentatae* (Liou) Tai (白粉病) 河北(61, 208).

Pestalozzia flagellata Earle 河南(13).

Phyllosticta quercus Sacc. et Speg. 河南(13).

Q. fabri Hance (白櫟, 法氏槲)

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 江苏(213), 湖南(219).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 湖南(208), 安徽(219), 江苏(106, 201, 231).

Uncinula septata Salm. (白粉病) 湖南(213, 219), 江苏(219), 广西(208).

Quercus glanduliferra Bl. (枹)

Cronartium quercum Miyabe (锈病) 四川(150), 浙江(8).

Marssonina martini (Sacc. et Ell.) Magn. (褐斑病) 江西(47).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 浙江(219), 广西(219).

Q. glauca Thunb. (青刚櫟, 櫟)

Meliola cyclobalanopsina Yamam. (煤病) 台湾(384).

M. taityuensis Yamam. (煤病) 台湾(384).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 江苏(219).

Sphaerotheca wrightii (Berk. et Curt.) Hoehn. (白粉病) 湖南(26, 32), 安徽(32), 江苏(26, 32, 219), 浙江(26, 32, 219), 福建(213), 台湾(283, 350).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. yadoriki Sieb. (樟寄生) 广西(160).

Q. longinux Hay. (长果櫟)

Meliola cyclobalanopsina Yamam. (煤病) 台湾(384).

Q. mongolica Fisch. et Turcz. (柞树, 蒙櫟, 蒙古櫟)

Gloeosporium quercum Miura (炭疽病) 辽宁(313).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) “东北”(282).

Q. pseudomyrsinaefolia Hay.

Meliola cyclobalanopsina Yamam. (煤病) 台湾(384).

Q. salicina var. *orgyalis*

Hadronema orbiculare Syd. 湖南(306).

Q. schottkyana Rehd. et Wils. (青崗櫟)

Fumago vagans Pers. (煤病) 四川(306).

Q. semicarpifolia Smith (高山櫟, 刺櫟)

Fomes fomentarius (L.) Gill. (白色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

Q. serrata Thunb. (枹树)

Cronartium quercum Miyabe (锈病) 浙江(8).

Leptothyrium quercinum (Lasch.) Sacc. (落叶病) 四川(150).

Marssonina martini (Sacc. et Ell.) Magn. (褐斑病) 四川(150).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 四川(150).

Quercus serrata Thunb. (枹树)

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 浙江(8).

Sphaerotheca lanestris Harkness (白粉病) 四川(150, 226).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) “西康”(57).

Q. suber L. (栓皮櫟, 軟木櫟)

Cronartium quercum Miyabe (锈病) 台湾(289).

Q. variabilis Bl. (栓皮櫟)

Cronartium quercum Miyabe (锈病) 台湾(280, 289).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 安徽(219), 江苏(219).

Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 江苏(201).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Uncinula septata Salm. (白粉病) 江苏(219).

Q. sp. (櫟属)

Armillaria mellea (Vahl.) Fr. (根腐病) “西康”(57).

Coccodiscus quercicola P. Henn. 广东(340).

Cronartium quercum Miyabe (锈病) “西康”(32), 四川(32, 150), 贵州(245), 湖北(316), 安徽(231), 江苏(32, 36, 106), 浙江(32, 36), 江西(231), 广西(231, 245).

Cytospora microspora (Corda) Rabh. 河北(317).

Endothia gyrosa (Schw.) Fr. 江苏(22, 32).

E. radicalis (Schw.) de Not. “西康”(32), 湖南(32), 安徽(32), 江苏(22, 32), 广东(32).

Fomes fomentarius (L.) Gill. (白色腐朽病) 云南(33).

Irenina quercina Hansf. (煤病) 安徽(254).

Macrophoma fusispora Bubak 河南(13).

Marssonina martini (Sacc. et Ell.) Magn. (褐斑病) “热河”(317).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) “西康”(57), 湖南(317), 河南(13).

M. alphetoides Griff. et Maubl. (白粉病) “东北”(283), 台湾(283).

Microstroma album (Desm.) Sacc. var. *japonicum* P. Henn. 湖南(316).

Quercus sp. (櫟屬)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) “西康”(57),
四川(194),江苏(208).

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (白色斑駁病) 黑龍江
(60).

P. sulfureus (Bull.) Fr. (褐色心材腐朽病) 河南(13).

Typhulochaeta japonica Ito et Hara (白粉病) 四川
(213).

Balanophora sp. (蛇菰) 河南(13).

Radermachera sinica (Hance) Hemsl. (菜豆樹)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Ranunculus acris L. (回回蒜)

Peronospora ficariae (Eds.) Tul. (霜霉病) 江苏(220),
浙江(220).

R. arcuans Chien

Puccinia magnusiana Koern. (銹病) 江苏(32,36).

R. cantoniensis DC. (小回回蒜)

Peronospora ranunculi Gaum. (霜霉病) 四川(150).

Puccinia magnusiana Koern. (銹病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川
(150).

R. japonicus Thunb. (毛茛)

Ovularia decipiens Sacc. “东北”(313).

Phoma albomaculata Miura 吉林(313).

Puccinia magnusiana Koern. (銹病) 山西(340).

Ramularia aequivoca (Ces.) Sacc. 辽宁(313).

R. ranunculi (Schroet.) Peck 辽宁(313).

Septoria ficariae Desm. (斑枯病) 辽宁(313).

Rapanea linearis (Lour.) Moore

Balansina stellata Arnaud 广东(340).

Raphanus sativus L. (蘿卜, 萊菔)

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白銹病) 辽宁(294), “热
河”(294), 河北(116), 四川(75, 150, 193, 194), 云南(111,
112, 212), 貴州(196), 湖南(112), 浙江(8), 福建(10, 183).

A. macrospora (Togashi) Ito (白銹病) “东北”(287), 台灣
(287).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. (黑斑病) 內蒙(372),
河南(13), 台灣(355).

Raphanus sativus L. (萝卜, 莱菔)

A. brassicae (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc. (黑斑病)
黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 四川(221), 湖南(112).

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A. herculea* (Ell. et Curt.) Ell.) (黑斑病) 云南(112), 湖南(112), 广东(112).

Cercospora albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc. (白斑病)
辽宁(294), 热河(294), 四川(91), 湖南(112), 河南(13), 广东(112).

Colletotrichum higginsianum Sacc. (炭疽病) 辽宁(294).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) 黑龙江(43a, 294), 吉林(43a, 294), 辽宁(43a, 294), “热河”(294), 河北(173), 四川(75, 150, 194), 云南(112, 212), 湖南(112), 河南(13), 山东(14), 江苏(128, 220), 浙江(8), 福建(10), 广东(233), 广西(178).

Ramularia armoraciae Fuck. 江苏(128).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 江西(158), 广西(178), 台湾(350).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (软腐病) 河北(116), 河南(13).

E. carotovora (Townsend.) Holl. (软腐病) 河南(13), 广东(233).

Pseudomonas maculicola (McCul.) Stev. (细菌性叶斑病)
黑龙江(294), 辽宁(294), 河北(138), “西康”(57), 湖南(112), 广西(112).

Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson (黑腐病) 黑龙江(294), 辽宁(294), “西康”(57), 河南(13).

Brassica virus 2 花叶病 广东(120a).

Cucumis virus 1 (花叶病) 广东(120a).

花叶病 (Mosaic) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 热河(294).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根线虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 山东(95).

R. sativus L. var. longipinnatus Bailey (中国萝卜)

Brassica virus 1 (“孤丁”病) “各地”(185a).

Raphanus sativus L. var. **macropodus** Mak. (蘿卜)

Albugo macrospora (Togashi) Ito (白锈病) “东北”(287, 292), 台湾(287, 292).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc var. *macrospora* Sacc. (黑斑病) 河北(373).

Peronospora parasitica (Pers.) Fr. (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

R. sativus L. var. (蘿卜)

花叶病 (Mosaic) 江苏(127).

Raphiolepis indica Lindl. (石斑木)

Aecidium raphiolepidis Syd. (锈病) 广东(362).

R. indica Lindl. var. **tashiroi** Hay.

Irene raphiolepis Yamam. (煤病) 台湾(383).

Reinwardtia trigyna Planch. (石海椒)

Leveillula taurica (Lev.) Arnaud (白粉病) 云南(213).

Rhamnella martini Levl.

Puccinia coronata Corda (锈病) 贵州(306).

R. obovata Schneid.

Puccinia coronata Corda. (锈病) 江苏(231, 364).

R. sp. (猫乳属)

Puccinia coronata Corda (锈病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(32, 36).

Rhamnus crenatus Sieb. et Zucc. (长叶冻绿, 水冻绿树)

Puccinia coronata Corda (锈病) 江苏(231), 江西(231), 广东(364).

R. davuricus Pall. (鼠李)

Coniothyrium dumeei Br. et Cav. 辽宁(313).

Microsphaera alni (Wallr.) Salm. (白粉病) 辽宁(313).

Puccinia poae-pratensis Miura (锈病) 黑龙江(313), 东北(313).

R. formosana Matsum. (台湾鼠李)

Montagnellina rhamni Saw. 台湾(360).

R. globosus Bge. (山绿柴)

Puccinia coronata Corda (锈病) 河北(63, 64, 66), 陕西(237).

R. japonicus Max. (日本鼠李)

Puccinia coronata Corda (锈病) 江苏(231), 浙江(231).

R. kulingensis Schneid.

Puccinia coronata Corda (锈病) 江西(231).

- Rhamnus leptophylla** Schneid. (蜡子树, 細叶鼠李)
Puccinia coronata Corda (锈病) 四川(150,214).
- R. nepalensis** Wall.
Cercospora bacilligera (Berk. et Br.) Fres. (叶斑病)
 台湾(357,378).
- R. parvifolia** Bge. (小叶鼠李)
Puccinia coronata Corda (锈病) 河北(63,64).
- R. utilis** Decne. (冻绿, 鼠李)
Puccinia coronata Corda (锈病) 河南(66).
- R. sp.** (鼠李属)
Aecidium alaterni Maire (锈病) “热河”(317).
Coniothyrium rhamni Miyake 河北(315), 西康(57).
Puccinia coronata Corda (锈病) 陕西(47), 云南(214),
 湖北(231), 河南(13), 安徽(32,36), 江苏(32,36), 浙江
 (32,36), 江西(32,36), 广西(246).
Septoria frangulae Guep. (斑枯病) 江苏(47).
- Rheum franzenbachii** Muent. (大黄菜)
Tilletia rhei Zundel (腥黑粉病) 山西(153,393).
- R. officinale** Bail. (大黄)
Phyllosticta rhei Ell. et Ev. 江西(47).
- R. rhaponticum** L. (食用大黄)
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 江苏
 (128).
- Rhodea japonica** Roth. (万年青)
Colletotrichum montemartini Togn. var. *rhodeae* Trav.
 (炭疽病) 安徽(29,32,374), 江苏(29,32).
Sphaerulina rhodeae P. Henn. et Shirai 安徽(231), 江苏
 (47), 浙江(8,49).
- Rhododendron adenogynum** Diels
Lophodermium rhododendri Ces. —(306).
- R. argyrophyllum** Franch. var. *omeiense* Rehd. et Wils.
Pestalozzia rhododendri (D. Sacc.) Guba (輪紋病) 四川
 (150).
- R. cucullatum** H.-M.
Coniothyrium olivaceum Bon. var. *phyllogenum* Sacc.
 四川(306).
- R. dauricum** L. (野杜鹃花)
Chrysomyxa rhododendri de Bary (锈病) 辽宁(313)
 “东北”(272).

Rhododendron decorum Franch.*Chrysomyxa rhododendri* de Bary (锈病) 云南(214).*Hormiscium handelii* Bubak 云南(306).**R. delavayi** Franch.*Hormiscium handelii* Bubak 云南(306).**R. faberi** Hemsl.*Chrysomyxa rhododendri* de Bary (锈病) 四川(150, 214).**R. farrerae** Tate (华丽杜鹃)*Melasmia rhododendri* P. Henn. et Shirai (*Rhytisma shiraiana* Hemmi et Kurata) (黑痣病) 广东(362).**R. micranthum** Turcz. (照山白)*Chrysomyxa rhododendri* de Bary (锈病) 山东(66).**R. morii** Hay.*Chrysomyxa expansa* Diet. (锈病) 台湾(279, 289).**R. nankotaisanense** Hay.*Chrysomyxa succinea* (Sacc.) Tranzsch. (锈病) 台湾(289).**R. oldhami** Max.*Chrysomyxa rhododendri* de Bary (锈病) 台湾(289).*Irenina rhododendri* Yamam. (煤病) 台湾(382).**R. pseudo-chrysanthum** Hay. (假金花杜鹃)*Chrysomyxa expansa* Diet. (锈病) 台湾(279, 289).*Exobasidium hemisphaericum* Shirai (餅病) 台湾(355).**R. racemesum** Franch.*Exobasidium hemisphaericum* Shirai (餅病) 云南(306).**R. seniayinii** Max. (福建杜鹃)*Melasmia rhododendri* P. Henn. et Shirai (*Rhytisma shiraiana* Hemmi et Kurata) (黑痣病) 湖南(306).**R. simsii** Planch. (杜鹃花)*Exobasidium hemisphaericum* Shirai (餅病) “西康”(57).*Melasmia rhododendri* P. Henn. et Shirai (*Rhytisma shiraiana* Hemmi et Kurata) (黑痣病) 湖南(306).*Rhytisma rhododendri* Fr. (黑痣病) 河南(13), 江苏(103).**R. trichocladum** Franch. (毛枝杜鹃)*Chrysomyxa dietelii*-Syd. (锈病) 云南(214).

Rhododendron wilsonii Hemsl et Wils.

Exobasidium rhododendri Cramer (餅病) 四川(150).

R. sp. (杜鵑屬)

Chrysomyxa expansa Diet. (銹病) “西康”(33), 云南(33).

Exobasidium japonicum Shirai (餅病) 云南(306), 湖南(177, 316).

E. pentasporium Shirai (餅病) 江西(47, 177).

E. rhododendri Cramer (餅病) 江西(47, 177).

Hendersonia bicolor Pat. 云南(333).

Lophodermium rhododendri Ces. 云南(333).

Schizothyrium rhododendri Pat. 云南(333).

Torula rhododendri Ces. 云南(336).

Valsa subclypeata C. Peck. 河北(315).

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. (桃金娘)

Cladosporium rhodomyrti Saw. 台湾(360).

Guignardia rhodomyrti Saw. 台湾(360).

Helminthosporium rhodomyrti Syd. 广东(370).

Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Rhus chinensis Mill. var. **roxburghii** Rehd. et Wils. (滨盐肤木)

Exospora rhois-javanicae Saw. 台湾(359).

Meliola brachyodonta Syd. (煤病) 台湾(380).

R. delavayi Franch. var. **quinquejuga** Rehd. et Wils. (川山漆)

Pileolaria shiraiana (Diet. et Syd.) Ito (銹病) 云南(214).

R. hypoleuca

Pileolaria dieteliana Syd. (銹病) 广东(363).

R. intermedia Hay.

Pileolaria toxicodendri (Berk. et Rav.) Arthur (銹病) 台湾(277, 290).

R. potanini Max. (青麸楊)

Pileolaria klugkistiana (Diet.) Diet. (銹病) 陝西(218).

R. punjabensis Steward var. **nucipersica** (L.) Schneid.

Pileolaria klugkistiana (Diet.) Diet. (銹病) 貴州(245).

R. semilata Murr. (盐肤木)

Mycosphaerella fushinoki Miura “东北”(313), 河南(13).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150, 226).

Rhus semilata Murr. (盐肤木)

Pileolaria klugkistiana (Diet.) Diet. (锈病) 陕西(7,218),

江苏(205),江西(32,36),台湾(290,356,359).

Tubercularia phyllophila Syd. 台湾(350).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 江苏(219),
浙江(219).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

R. succedanea L. (木蜡树,野漆树)

Pileolaria shiraiana (Diet. et Syd.) Ito (锈病) 台湾(274).

广东(290,356).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 台湾(356).

R. sylvestris Sieb. et Zucc. (野漆树)

Pileolaria shiraiana (Diet. et Syd.) Ito (锈病) 浙江
(220).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

R. trichocarpa Miq. (毛漆树,山漆)

Uncinula sinensis Tai et Wei (白粉病) 四川(150,226).

R. verniciflua Stokes (漆树)

Coniothyrium olivaceum Bon. 河南(13).

Pileolaria shiraiana (Diet. et Syd.) Ito (锈病) 浙江(231).

Uncinula verniciferae P. Henn. (白粉病) 安徽(219),江
苏(219),浙江(219).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

R. sp. (漆树属)

Pileolaria klugkistiana (Diet.) Diet. (锈病) 贵州(245),
安徽(245),江西(245).

P. shiraiana (Diet. et Syd.) Ito (锈病) 贵州(231,245),
湖南(32,36,316),安徽(32,36,245),江苏(32,36,47),江
西(245),广西(32,245).

Ribes coeleste Jancz. (台湾茶藨子)

Cronartium ribicola Fisch. et Waldh. (锈病) 陕西(340).

R. diacantha Pall.

Melampsora ribesii-purpureae Kleb. (锈病)“东北”

R. fasciculatum Sieb. et Zucc. (蔓茶藨)

Puccinia caricis Relentisch (锈病) 江苏(32,36).

R. formosana Hay.

Cronartium ribicola Fisch. et Waldh. (锈病) 台湾(289).

Ribes grossularia L. (圓醋栗鵝莓)

Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk. et Curt. (白粉病)
“东北”(283).

R. grossularioides Max. (醋栗, 鵝莓)

Puccinia pringsheimiana Kleb. (銹病) 黑龙江(60).

R. manshuricum Kom.

Cronartium ribicola Fisch. et Waldh. (銹病) 黑龙江
(272).

R. rubrum L. (紅醋栗)

Phyllosticta grossulariae Sacc. “东北”(294).

Septoria ribis Desm. (斑枯病) 黑龙江(294).

R. sp. (茶藨子屬)

Cronartium ribicola Fisch. et Waldh. (銹病) 陝西(7).

Melampsora ribesii-purpureae Kleb. (銹病) “东北”

Ricinus communis L. (蓖麻)

Alternaria ricini (Yoshii et Rakimoto) Hansford (黑斑病)
黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345),
河北(299, 374), “西康”(57), 四川(150), 河南(13), 山东
(299, 374).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(325, 350).

Cercospora ricinella Sacc. et Berl. (叶斑病) 吉林(294,
313), 辽宁(294), “热河”(345), 河北(116, 315), “西康”
(57), 四川(75, 150), 云南(212, 215), 湖南(112), 河南(13),
安徽(47), 江苏(106, 128), 福建(10), 台湾(325), “华南”
(342).

Colletotrichum erumpens Sacc. (炭疽病) 江苏(32), 福建
(32).

C. ricini Bubak et Frag. (炭疽病) 四川(150).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(325).

Diplodia ricini Sacc. et Roum. 河南(13), 江苏(29, 32).

Fusarium sambucinum Fuck. (萎蔫病) 吉林(294), 辽宁
(294), “热河”(294, 345), 河北(299), 台湾(325).

Gloeosporium ricini Maubl. (*Glomerella ricini* (Maubl.)
Hemmi et Matuo) (炭疽病) 云南(111).

Macrasporium ricini Saw. 台湾(358).

Melampsora ricini Pass. (銹病) 云南(112, 212, 214), 台湾
(289, 325).

Microstroma minimum Sacc. 广东(344).

Myrothecium roridum (Tode) Fr. 四川(150, 229).

Ricinus communis L. (蓖麻)

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 台湾(325).
Phyllosticta ricini Rostr. 辽宁(294), 云南(112), 湖南(112).

Phytophthora formosana Saw. (疫病) 台湾(358).

P. parasitica Dastr. (疫病) 台湾(325).

P. ricini Saw. (疫病) 台湾(358).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(325, 350).

Sphaceloma ricini Jenkins et Cheo (疮痂病) 云南(112, 119, 212).

Pseudomonas sp. 云南(111).

Xanthomonas ricinicola (Ell.) Dowson 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345), 河北(299), 山西(299), “西康”(57), 河南(13), 山东(138, 299), 台湾(325).

X. solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) 台湾(325).

Robinia pseudo-acacia L. (洋槐, 刺槐)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 辽宁(313).

Haplosporella ailanthi Ell. et Ev. 河北(20).

H. robiniae (Ell. et Barth.) Pet. et Syd. 河北(374).

Microsphaera baeumleri P. Magn. (白粉病) 四川(150).

M. robiniae Tai (白粉病) 甘肃(213).

Phyllosticta robiniella Miura 辽宁(313).

Polyporus robiniophilus (Murr.) Lloyd (白色心材腐朽病) 河北(20, 24, 32).

Rorippa globosa (Turcz.) Thellg. (圓果蔊菜)

Peronospora nasturtii-montani Gaum. (霜霉病) 江苏(220).

R. montana (Wall.) Small (蔊菜)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

R. sinapis (Burm. f.) O. E. Schultz.

Cercospora nasturtii Pass. (叶斑病) 云南(215).

Rosa acicularis Lindl.

Teloconia kamtschatkae (Anders.) Hirat. (锈病) 河北(218).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Rosa banksiae Ait. (木香)

Caeoma warburgianum P. Henn. (锈病) 云南(214).

R. bracteata Wendl. var. **typica** Lindl.

Caeoma rosae-bracteatae Saw. (锈病) 台湾(359).

R. brunonii Lindl.

Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins (疮痂病) 四川(296).

R. centifolia L.

Cercospora rosicola Pass. (叶斑病) 台湾(377).

Oidium leucoconium Desm. (白粉病) 台湾(356).

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. (白粉病) 云南(213).

R. chinensis Jacq. (月季花)

Cercospora rosicola Pass. (叶斑病) 河南(13).

Diplocarpon rosae Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.)
(黑斑病) 四川(91,221).

Mycosphaerella rosigena (Ell. et Ev.) Lindau 四川(150).

R. chinensis Jacq. subsp. **indica** Koehne (月季)

Kuehneola japonica (Diet.) Diet. (锈病) 台湾(290).

R. cymosa Tratt. (小果蔷薇)

Gerwasia rosae Tai (锈病) 湖南(214).

R. davidii Crep.

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. (锈病)
河北(218).

R. davurica Pall. (达烏里蔷薇)

Phragmidium montivagum Arthur (锈病) 辽宁(313).

P. rosae-davuricae Miura (锈病) “东北”(313).

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. (白粉病) 吉林(313).

Teloconia kamtschatkae (Anders.) Hirat. 黑龙江(313),
吉林(313), “东北”(313).

R. glomerata Rehd. et Wils. (团花蔷薇)

Phragmidium handelii Petr. (锈病) 云南(340).

R. indica L. var. **formosana** Hay.

Oidium rosae-indicae Saw. (白粉病) 台湾(356).

R. laevigata Michx. (金樱子)

Diplocarpon rosae Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.)
(黑斑病) 河北(315).

Kuehneola japonica (Diet.) Diet. (锈病) 台湾(279,290).

Marssonina rosae-laevigatae Saw. (褐斑病) 台湾(358).

Phragmidium rosae-multiflorae Diet. (锈病) 台湾(290,
359).

Rosa laevigata Michx. (金櫻子)*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**R. lucens** Rolfe.*Caeoma warburgianum* P. Henn. (銹病) 云南(214).**R. marretii** Levl*Teloconia kamtschatkae* (Anders.) Hirat. (銹病) “东北”(290).**R. microcarpa** Lindl. (小果薔薇, 山木香)*Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schlecht. (銹病) 江苏(231).*Sphaerotheca humuli* (DC.) Burr. (白粉病) 四川(150).**R. multiflora** Thunb. (薔薇)*Cercospora rosae* (Fuck.) Hoehn. (叶斑病) 辽宁(313).*C. rosicola* Pass. (叶斑病) “西康”(57).*Diplocarpon rosae* Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.) (黑斑病) 江苏(106), 浙江(49).*Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schlecht. (銹病) “热河”(317), “西康”(57).*P. rosae-multiflorae* Diet. (銹病) 陝西(218), 新疆(67), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36, 205), 浙江(32, 36, 47), 江西(32, 36).*Sphaerotheca pannosa* (Wallr.) Lev. (白粉病) 云南(213), 江苏(106), 浙江(49).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).**R. odorata** Sweet (香水月季)*Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schlecht. (銹病) 云南(214).*P. tuberculatum* Mueller (銹病) 云南(212).**R. omeiensis** Rolfe (峨眉薔薇)*Phragmidium rosae-rugosae* Kasai (銹病) 云南(212, 214).**R. polyantha** Sieb. et Zucc. var. **genuina** Nakai (多花薔薇)*Phragmidium rosae-multiflorae* Diet. (銹病) 台湾(263).**R. roxburghii** Franch. (蠟絲花)*Gerwasia rosae* Tai (銹病) 貴州(245).*Hendersonia sarmentorum* West 貴州(306).*Irenina rosae* Hansford (煤病) 貴州(254).

Rosa rugosa Thunb. (玫瑰)

Diplocarpon rosae Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.) (黑斑病) “西康”(57).

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. (锈病) 河北(63), 陕西(218), 江苏(32, 36, 106, 201, 205).

P. rosae-rugosae Kasai (锈病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(171), “西康”(57).

Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins (疮痂病) 云南(119).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 江苏(231).

S. humuli (DC.) Burr. (白粉病) 河南(13), 江苏(208).

S. pannosa (Wallr.) Lev. (白粉病) 吉林(313), 四川(150), 江苏(47, 213).

Teloconia kamtschatkae (Anders.) Hirat. 台湾

R. sempervirens L. var. *scandens* Nich. (红枝蔷薇, 钝叶红枝蔷薇)

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. (锈病) 四川(150).

R. spinosissima L. var. *mandshurica* Yabe

Phragmidium rosae-multiflorae Diet. (锈病) “东北”(290).

R. taiwanensis Nak. (台湾蔷薇)

Kuehneola japonica (Diet.) Diet. (锈病) 台湾(279, 290).

Mycosphaerella rosae Saw. 台湾(360).

R. transmorrissonensis Hay.

Phragmidium hashikakai Hirat. (锈病) 台湾(290).

R. xanthina Lindl. (黄刺玫)

Coryneum rosaecola Miura 辽宁(313).

Diplocarpon rosae Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.) (黑斑病) 河北(116).

Monochaetia seridiodes (Sacc.) Sacc. 河南(13).

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. (锈病) 新疆(67).

R. sp. (蔷薇属)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 江苏(29, 32).

Cercospora rosae (Fuck.) Hoehn. (叶斑病) “华北”(258), 山东(374).

C. rosicola Pass. (叶斑病) “华南”(342).

Clithris rosae (Teng) Tehon 湖南(21, 32), 浙江(21, 32), 广西(32).

Rosa sp. (薔薇屬)

Coryneum rosaecola Miura “西康”(57).

Diplocarpon rosae Wolf (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.) (黑斑病) 云南(212), 安徽(374), 江苏(32, 48, 189), 浙江(49), 福建(10).

Gerwasia rosae Tai (銹病) 安徽(245), 广西(245).

Mycosphaerella rosigena (Ell. et Ev.) Lindau 云南(212), 河南(47).

Pestalozzia compta var. *ramicola* Berl. et Brev. (輪斑病) 江苏(103).

Phragmidium montivagum Arthur (銹病) “东北”(263).

P. mucronatum (Pers.) Schlecht. (銹病) 甘肃(214), 貴州(245), 湖南(306), 江苏(47), “华南”(342).

P. rosae-davuricae Miura (銹病) 安徽(245).

P. rosae-multiflorae Diet. (銹病) “东北”(263), 广东(274).

P. rosae-rugosae Kasai (銹病) “东北”(263), 云南(212, 214).

P. tuberculatum Mueller (銹病) 四川(150); 云南(112, 212).

Phyllosticta rosarum Pass. 河南(13).

Puccinia rose Barrn. (銹病) 福建(10).

Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins (疮痂病) 四川(119), 云南(119, 212), 台湾(119).

Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. (白粉病) “西康”(57), 云南(112, 212), 浙江(8).

Teloconia kamtschatkae (Anders.) Hirat. (銹病) “东北”(263), 河北(62).

Uncinula simulans Salm. (白粉病) 貴州(219), 浙江(208).

Valsa coronata (Hoffm.) Fr. 江苏(22, 32).

Roscoeia intermedia Gagn. (象牙參)

Puccinia roscoae Barcl. (銹病) 云南(214).

Rottboellia japonica Honda (牛鞭草)

Lophodermium rottboelliae Saw. 台湾(360).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 河北(315).

Puccinia cacao McAlp. (銹病) 四川(150, 214), 云南(214), 山东(374), 安徽(47).

Rottboellia japonica Honda (牛鞭草)

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.
(黃化矮縮病) 台灣(287).

Sphacelotheca rottboelliae (Syd. et Butl.) Mundk. (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 湖北(153), 安徽(47).

R. sp. (羅氏草屬)

Puccinia cacao McAlp. (茜草) 江苏(32, 36), 广西(246).

Rourea volubilis

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. 台灣(387).

Rubia cordifolia L. (茜草)

Aecidium rubiae Diet. (銹病) 辽宁(272), “东北”(290), 河北(66).

Coleosporium rubicola Cummins (銹病) 貴州(245).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 台灣(354).

Phacidium repandum (Alb. et Schw.) Rehm. 台灣(355).

Phyllosticta rubiae Miura 吉林(313).

Pseudopeziza komarovi Gaez 黑龍江(313).

Puccinia collettiana Barcl. (銹病) 河北(171).

Thekopsora rubiae Kom. (銹病) “东北”(272), 河北(64, 218, 317).

R. cordifolia L. f. *pratensis* Max.

Thekopsora rubiae Kom. (銹病) 辽宁(313).

R. sylvatica Nakai (山茜草)

Thekopsora rubiae Kom. (銹病) 黑龍江(272).

R. sp. (茜草屬)

Pseudopeziza komarovi Gaez. 安徽(231).

Rubus adenotrichopodus Hay. (腺毛柄懸鈎子)

Phyllosticta rubi-adenotrichopodi Saw. 台灣(358).

R. amplifolius Levl. et Van. (大葉懸鈎子)

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (銹病) 貴州(245).

R. calycinoides Hay.

Hamaspora acutissima Syd. (銹病) 台灣(280, 290).

R. cochinchinensis Tratt.

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (銹病) 广东(274), “华南”(274).

R. conduplicatus Duthie

Acrothecium rubi Saw. 台灣(358).

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 台灣(382).

Rubus conduplicatus Duthie

Phragmidium griseum Diet. (锈病) 台湾 (263, 279, 290, 359).

Septoria rubi West var. *brevispora* Sacc. (斑枯病) 台湾 (360).

R. crataegifolius Bge. (蓬蘽, 山楂叶悬钩子)

Phragmidium griseum Diet. (锈病) 辽宁 (313), 河北 (63).

P. sinicum Tai et Cheo (锈病) 河北 (218).

R. ellipticus Smith var. *obcordatus* (Fr.) Focke

Hamaspora benguetensis Syd. (锈病) 云南 (214).

R. euphlebophyllus Hay.

Meliola formosensis Yamam. (煤病) 台湾 (382).

Phragmidium rubi-fraxinifolii Syd. (锈病) 台湾 (290).

R. floribundo-paniculatus Hay.

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 台湾 (382).

Meliola formosensis Yamam. (煤病) 台湾 (382).

R. formosensis Kuntze (台湾悬钩子)

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (锈病) 台湾 (276, 356).

Hamaspora acutissima Syd. (锈病) 台湾 (280, 290).

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 台湾 (382).

Meliola formosensis Yamam. (煤病) 台湾 (382).

R. fraxinifolius Poir. (枹叶悬钩子)

Phragmidium rubi-fraxinifolii Syd. (锈病) 台湾 (263, 290, 359).

R. fraxinifolius Poir. var. *yushunii* Suzuki et Yamam.

Phragmidium rubi-fraxinifolii Syd (锈病) 台湾 (290).

R. glanduloso-calycinus Hay. (腺萼悬钩子)

Phragmidium formosanum Hirat. f. (锈病) 台湾 (263, 280, 290).

R. hirsuto-pungens Hay. (刺毛悬钩子)

Phragmidium formosanum Hirat. f. (锈病) 台湾 (263, 280).

R. hupehensis Oliv. (木莓)

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (锈病) 四川 (214).

R. idaeus L. (绒毛悬钩子, 复盆子)

Phragmidium pauciloculare (Diet.) Syd. (锈病) 湖南 (218).

P. shensianum Tai et Cheo (锈病) 陕西 (218).

Rubus kawakamii Hay.

Hamasporea taiwaniana Hirat. (锈病) 台湾(280,290).

R. laciniato-stipulatus Hay.

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (锈病) 台湾(270,290).

Hamasporea acutissima Syd. (锈病) 台湾(290).

Uredo rubi-lasiniato-stipulati Saw. (锈病) 台湾(259).

R. lambertianus Ser. (高粱泡)

Hamasporea hashiokai Hirat. f. (锈病) 浙江(36), 台湾(359).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(164,165).

R. lambertianus Ser. subsp. **xanthoneurus** Focke

Hamasporea hashiokai Hirat. f. (锈病) 台湾(278,290).

R. mingetsensis Hay.

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 台湾(382).

Meliola formosensis Yamam. (煤病) 台湾(382).

Phragmidium griseum Diet. (锈病) 台湾(271,290).

R. morifolius Sieb. (熊莓)

Phragmidium griseum Diet. (锈病) “热河”(317).

Septoria rubi West. (*Mycosphaerella rubi* (West.) Roark.)
(斑枯病) “热河”(317).

R. nagasawanus Koidz.

Guignardia rubi Saw. (黑腐病) 台湾(358).

R. nantoensis Hay.

Hamasporea acutissima Syd. (锈病) 台湾(280,290,359).

R. parkeri Hance (烏蘼子)

Hamasporea sinica Tai et Cheo (锈病) 貴州(214).

R. parvifolius L. (草楊莓子, 小叶悬钩子, 薊田薊)

Phragmidium pauciloculare (Diet.) Syd. (锈病) 云南(214),
湖南(214), 山东(66), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 广西
(274), 台湾(263,280,359).

P. taipaihanense Wang (锈病) 陝西(7).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

R. parvipungens Hay.

Phragmidium formosanum Hirat. f. (锈病) 台湾(280,290).

R. pectinellus Max. var. **triloba** Koiz.

Hamasporea acutissima Syd. (锈病) 台湾(359).

H. benguetensis Syd. (锈病) 台湾(278).

Rubus phoenicolasius Max. (多腺悬钩子)*Hamasporea sinica* Tai et Cheo (锈病) 湖南(214).*Phragmidium nambuanum* Diet. (锈病) 陕西(7).**R. pinnatisepelus** Hemsl. (羽裂苧悬钩子)*Hamasporea sinica* Tai et Cheo (锈病) 湖南(218).**R. pungens** Camb. (刺悬钩子)*Phragmidium sikangense* Petr. (锈病) “西康”(340).*P. yamadanum* Hirat. f. (锈病) 陕西(7).**R. rarissimus** Hay.*Phragmidium arisanense* Hirat. f. et Hashioka (锈病) 台湾
(263, 279, 290, 359).**R. reflexus** Ker.*Gerwasia chinensis* (Diet.) Hirat. f. (锈病) 广东(218).*G. rubi* Racib. (锈病) 广东(248).**R. rosaefolius** Sm. (空心蕪, 蔷薇莓)*Phragmidium pauciloculare* (Diet.) Syd. (锈病) 湖南(214).**R. saxatilis** L. (石生悬钩子)*Gymnoconia peckiana* (Howe) Trott. (锈病) 黑龙江(313),
“东北”(290).**R. setchuensis** Bur. et Franck. (川莓)*Gerwasia chinensis* (Diet.) Hirat. f. (锈病) 四川(150,
214), 贵州(245).*Hamasporea acutissima* Syd. (锈病) 贵州(245).**R. shimadai** Hay.*Gerwasia chinensis* (Diet.) Hirat. f. (锈病) 台湾(290).**R. shinkoensis** Hay.*Meliola formosensis* Yamam. (煤病) 台湾(382).**R. subornatus** Focke*Phragmidium pauciloculare* (Diet.) Syd. (锈病) 云南(214).**R. swinhoei** Hance*Meliola formosensis* Yamam. (煤病) 台湾(382).*Uredo rubi-swinhoei* Saw. (锈病) 台湾(359).**R. swinhoei** Hance var. *hupehensis* Oliver*Gerwasia chinensis* (Diet.) Hirat. f. (锈病) 四川(150,
214).

Rubus taiwanianus Matsum.

Hamaspora hashiokai Hirat. f. (锈病) 台湾(359).

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 台湾(382).

Phragmidium rubi-fraxinifolii Syd. (锈病) 台湾(290, 359).

R. thunbergii Sieb. et Zucc. (蓬蘽)

Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind. “西康”(57).

Phragmidium rubi-thunbergii Kusano (锈病) 安徽(32, 36, 245), 浙江(32, 36).

R. trianthus Focke (三花悬钩子)

Hamaspora sinica Tai et Cheo (锈病) 四川(150).

R. triphyllus Thunb. (薊田薊)

Phragmidium pauciloculare (Diet.) Syd. (锈病) 辽宁(313), 台湾(290).

R. sp. (悬钩子属)

Aschersonia tamurai P. Henn. 广西(231).

Caeoma cheoanum Cummins (锈病) 广西(246).

Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f. (锈病) “西康”(32), 湖南(214), 广东(32, 36), 广西(32, 245).

Hamaspora acutissima Syd. (锈病) 贵州(245), 湖南(32), 江西(245), 广东(32, 36), 广西(231, 245, 274).

H. sinica Tai et Cheo (锈病) 四川(214), 湖南(214), 广西(209, 245).

Hendersonia vulgaris Desm. 湖北(316).

Irene calostroma (Desm.) Hoehn. (煤病) 广西(254), 台湾(387).

Meliola formosensis Yamam. (煤病) 台湾(387).

Phragmidium griseum Diet. (锈病) “东北”(263), 安徽(245).

P. nambuanum Diet. (锈病) 贵州(245).

P. okianum Hara (锈病) 黑龙江(255, 313).

P. pauciloculare (Diet.) Syd. (锈病) “东北”(263), 四川(150, 214), 安徽(218), 江苏(47), —(263).

P. rubi-thunbergii Kusano (锈病) 贵州(245).

P. violaceum (Schultz.) Wint. (锈病) 云南(333).

Rhytidhysterium prosopidis Peck 贵州(231).

Septoria rubi West. (*Mycosphaerella rubi* (West.) Roark.) (斑枯病) 河南(13).

花叶病(Mosaic) 江苏(127).

Ruellia repens L. (芦莉草)

Puccinia ruelliae (Berk. et Br.) Lagerh. (锈病) 广东(274), 台湾(290,359).

Rumex acetosa L. (酸模)

Phyllosticta rumicicola Miura 黑龙江(313), 吉林(313).

Puccinia acetosae Koern. (锈病) 台湾(290).

Ramularia decipiens Ell. et Ev. 黑龙江(313).

R. aquaticus L.

Ustilago warmingii Rostr. (黑粉病) 黑龙江(153, 313), “东北”(288).

R. crispus L.

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 山东(219).

Phyllosticta rumicicola Miura 吉林(313).

Puccinia punctiformis Diet. et Holw. (锈病) 四川(150, 214).

Ramularia rumicis-crispi Saw. 台湾(355,358).

R. dentata Capd. (齿果酸模)

Phyllosticta rumicicola Miura 四川(150).

Puccinia acetosae Koern. (锈病) 云南(214).

Ramularia decipiens Ell. et Ev. 四川(150).

R. hydrolapathum Hudson

Mycosphaerella rumicis (Desm.) Grove 河北(315).

R. nepalensis Spreng.

Puccinia punctiformis Diet. et Holw. (锈病) 云南(214).

R. sp. (酸模属)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 辽宁(313), “西康”(57).

Puccinia acetosae Koern. (锈病) 安徽(246).

P. punctiformis Diet. et Holw. (锈病) “东北”(273).

Ramularia rumicis-crispi Saw. 山东(374), 安徽(374).

Uromyces rumicis (Schum.) Wint. (锈病) 江苏(32,36).

Ustilago rumicis (Berk.) Clint. (黑粉病) 江苏(32).

Cuscuta chichymum L. (菟丝子) “西康”(57).

Saccharum arundinaceum Retz. (斑茅, 大密)

Phyllachora sacchari P. Henn. (黑痣病) 四川(150).

Puccinia kuehnii (Krueger) Butl. (锈病) 四川(150), 江苏(364).

Sphacelotheca sacchari (Rab.) Cif. (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 贵州(306), 江苏(153), 浙江(27, 32, 153), 福建(27, 32, 114, 153), 广东(27, 32, 153), 广西(153), 一(392).

Saccharum narenga (Nees) Hack. (河八王)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).*Puccinia miscanthi* Miura (锈病) 江苏(247).*Ustilaginoidea sacchari-narengae* Saw. (麴病) 台湾(350).**S. officinarum** L. (甘蔗)*Caldariomyces fasciculatus* Yamam. 台湾(357).*Ceratocystis adiposa* (Butl.) Moreau 四川(194), 广西(37).*Cercospora kopkei* Krueger (= *C. longipes* Butl.) (赤斑病) 广东(3, 112), 台湾(56, 310).*C. taiwanensis* Matsum. et Yamam. (叶斑病) 台湾(56, 310).*C. vaginae* Krueger (叶斑病) “西康”(57), 四川(75, 150), 台湾(56, 351), “华南”(307, 342).*Coleroa sacchari* (Sacc.) Breda de Haan 台湾(359).*Colletotrichum falcatum* Went (*Physalospora tucumanensis* Speg.) (赤腐病, 炭疽病) “西康”(57), 四川(150), 湖南(112), 福建(10, 113, 121, 183), 广东(3, 76, 78, 112, 199), 广西(30, 32, 37), 台湾(56, 350), “华南”(307, 342).*Coniothyrium sacchari* (Mass.) Pril. et Delacr. “西康”(57), 四川(150), 福建(10), 广东(78), 台湾(56), “华南”(307, 342).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 台湾(56, 350), “华南”(307).*Cytospora sacchari* Butl. 广东(3), 台湾(56).*Fumago vagans* Pers. 台湾(56, 357, 379).*Fusarium moniliforme* Sheld. var. *subglutinans* Wr. et Rink. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr. var. *subglutinans* Edwards) 广东(3, 112), 台湾(56).*Gnomonia iliau* Lyon “华南”(307).*Helminthosporium sacchari* (Breda et Haan) Butl. (眼斑病) 四川(75), 湖南(113), 福建(10), 广东(112).*H. stenospilum* Drechsler (*Cochliobolus stenospilus* (Carpenter) Matsum. et Yamam.) (条斑病) 台湾(56, 310, 311, 357), “华南”(307).*Hendersonia sacchari* Speg. 云南(112), 广西(30, 32).*Leptosphaeria sacchari* Breda de Haan (鞘枯病) 四川(150), 云南(112, 212), 广东(3, 78), 广西(30, 32, 37), 台湾(56, 355), “华南”(307).

Saccharum officinarum L. (甘蔗)

- Marasmius plicatus* Wakker 台湾(350).
M. sacchari Wakker (立枯病) 广东(3), 台湾(56, 357).
Meliola arundinis Pat. (煤病) 湖南(112), 福建(10).
Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Pellicularia sasakii (Shirai) Ito (立枯病) 广东(3), 台湾(56, 347, 350).
Phyllachora sacchari-spontanei Syd. (黑痣病) 云南(112).
Puccinia kuehnii (Krueger) Butl. (锈病) 台湾(56, 347, 290, 359).
Sclerospora miscanthi Miyake (霜霉病) 台湾(287).
S. sacchari Miyake (霜霉病) 台湾(56, 287, 318, 350).
Sphacelotheca sacchari (Rab.) Cif. (黑粉病) 福建(183), 台湾(56), “华南”(342).
Thielaviopsis paradoxa (de Seynes) Hoehn. (*Ceratocystis paradoxa* (Dode) Moreau) 广东(78), 台湾(56, 351), “华南”(307).
Triposporiopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Ustilago scitaminea Syd. (黑粉病) 四川(153), 云南(214), 湖南(112), 福建(10, 153), 广东(32, 78, 104, 112, 153), 广西(32, 37, 153), 台湾(153, 358), “华南”(307).
Venturia sacchari (Breda de Haan) Sacc. 台湾(358).
Xanthomonas rubrilineans (Lee et al.) Starr. et Burkh. 广东(78, 112), “华南”(307).
Saccharium virus 1 (花叶病) “西康”(57), 福建(127, 183), 广东(78, 82), “华南”(307).
 缺 Mn 广东(78).

S. sinense Roxb. (竹蔗)

- Colletotrichum falcatum* Went. (*Physalospora tucumanensis* Speg.) (赤腐病) 福建(183).
Leptosphaeria sacchari Breda de Haan 四川(150).
Sphacelotheca sacchari (Rab.) Cif. (黑粉病) 福建(183), 广东(233).
Ustilago scitaminea Syd. (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 福建(153), 广东(153), 广西(153), 台湾(153).
 花叶病(Mosaic) 福建(183).

Saccharum spontaneum L. (甜根子草)*Cercospora vaginiae* Krueger (叶斑病) 台湾(351).*Puccinia kuehnii* (Krueger) Butl. (锈病) 云南(214).**S. sp.** (甘蔗属)*Puccinia kuehnii* (Krueger) Butl. (锈病) 江苏(32, 36), 广西(32, 246, 247).*P. miscanthi* Miura (锈病) 江苏(214).*Sphacelotheca sacchari* (Rab.) Cif. (黑粉病) 四川(153), 江苏(153, 241), 浙江(153), 福建(153), 广东(153), 广西(153).**Sageretia pycnophylla** Schneid. (对结刺, 对结木)*Aecidium sageretiae* P. Henn. (锈病) 江苏(231), 浙江(231).**S. sp.** (对节刺属)*Aecidium sageretiae* P. Henn. (锈病) 安徽(32, 36), 江苏(32, 36).**Sagittaria sagittifolia** L. (慈姑)*Cercospora sagittariae* E. et K. (叶斑病) “西康”(57), 云南(112, 212, 215).*Doassansiopsis horiana* (P. Henn.) Shen (黑粉病) 四川(149, 150, 153), 云南(111, 112, 212), 贵州(174), 浙江(32, 104, 153), 广西(32, 37, 153).*Ramularia sagittariae* Bres. 河北(316), 广东(112).*Pseudomonas* sp. 云南(111).**S. trifolia** L. (茨菰, 野慈姑)*Doassansia opaca* Setch. (黑粉病) 台湾(152, 153, 359).**S. sp.** (慈姑属)*Doassansiopsis horiana* (P. Henn.) Shen (黑粉病) 浙江(104).**Salix babylonica** L. (水柳, 垂柳)*Apiosporium salicium* (Pers.) Kuntze “西康”(57).*Cercospora salicina* Ell. et Ev. (叶斑病) 四川(150), 台湾(377).*Fumago vagans* Pers. 江苏(47).*Melampsora allii-fragilis* Kleb. “西康”(57).*M. coleosporioides* Diet. 河北(316), 四川(150), 江苏(32, 36), 台湾(289), “各地”(47).*Rhytisma salicinum* Fr. (黑痣病) “西康”(57).

Salix babylonica L. (水柳, 垂柳)

Uncinula salicis (DC.) Wint. “西康”(57), 四川(150), 河南(13), 安徽(219).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(164, 165).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

L. yadoriki Sieb. (樟寄生) 西康(57).

S. bockii Seem. (秋华柳)

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 西康(57).

S. caprea L. var. *sinica* Hao

Melampsora larici-capraearum Kleb. (锈病) 陕西(7).

S. capularis Rehd. (高山柳)

Melampsora salicis-capularis Wang (锈病) 陕西(7).

S. cavaleriei Levl.

Melampsora salicis-cavaleriei Tai (锈病) 云南(214).

S. cinerea L. (灰叶柳)

Uncinula salicis (DC.) Wint. (白粉病) “东北”(282).

S. daphnoides Vill.

Melampsora hartigii Thuem. (锈病) 江苏(106).

Uncinula salicis (DC.) Wint. (白粉病) 辽宁(313).

S. delavayana H.-M.

Melampsora larici-epitea Kleb. (锈病) 云南(214).

S. glandulosa Seem. var. *warburgi* Koidz.

Cercospora salicina Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(360).

Melampsora salici-warburgii Saw. (锈病) 台湾(271, 289).

Pestalozzia salicis Saw. (輪紋病) 台湾(360).

S. gracilistyla Miq. (水楊)

Uncinula salici-gracilistylae Homma (白粉病) 吉林(282).

S. gymnolepis Levl. et Vant.

Uncinula salicis (DC.) Wint. (白粉病) “东北”(371).

S. heteromera H.-M. (异数柳)

Melampsora coleosporioides Diet. (锈病) 云南(214).

S. lasiogyne Seem. (毛果楊)

Apiosporium salicium (Pers.) Kuntze 吉林(313).

S. longiflora Anders. (长花楊)

Melampsora larici-epitea Kleb. (锈病) 云南(214).

M. yezoensis Miyabe et Matsum. (锈病) 貴州(245).

Salix matsudana Koidz. (沙柳, 旱柳)*Melampsora coleosporioides* Diet. (锈病) 河北(64, 171).*M. ribesii-purpureae* Kleb. (锈病) 陕西(7).*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) 河北(172, 209).*Trametes suaveolens* (L.) Fr. (白色心材腐朽病) 甘肃(180).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**S. matsudana** Koidz. var.*Melampsora coleosporioides* Diet. (锈病) 河北(64).**S. mesneyi** Hance (粤柳)*Melampsora coleosporioides* Diet. (锈病) 江西(245).**S. phanera** Schneid. (长叶柳)*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) 四川(150, 226).**S. psilostigma** Anders.*Melampsora larici-epitea* Kleb. (锈病) 云南(214).**S. purpurea** L. (杞柳)*Melampsora ribesii-purpureae* Kleb. (锈病) 河北(64).**S. purpurea** L. subvar. *angustifolia* Koidz. (行李柳)*Melampsora larici-epitea* Kleb. (锈病) 台湾(355).**S. spathulifolia** Seem.*Melampsora larici-capraearum* Kleb. (锈病) 陕西(7).**S. spodiophylla** H.-M.*Melampsora ribesii-purpureae* Kleb. (锈病) 陕西(7).**S. viminalis** L. (清铜柳)*Melampsora larici-epitea* Kleb. (锈病) 黑龙江(272).*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) “东北”(371).**S. wallichiana** Anders. (皂柳, 瓦氏柳)*Uncinula salicis* (DC.) Wint. (白粉病) 云南(213).**S. wilsonii** Seem. (柴柳、河柳)*Melampsora farinosa* Schroet. (锈病) 湖南(306).*Cuscuta japonica* Choisy (菟丝子) 浙江(164, 165).**S. sp.** (柳属)*Apiosporium slaicium* (Pers.) Kuntze 新疆(88), 河南(13).*Armillaria mellea* (Vahl.) Fr. (根腐病) 甘肃(35).*Capnodium salicinum* Mont. (煤病) 新疆(88).*Cladosporium herbarum* (Pers.) Link (黑霉病) 陕西(231).*Cytospora chrysosperma* (Pers.) Fr. (*Valsa sordida* Nitsch.) (腐烂病) 吉林(313), 辽宁(259), 河北(259), “西康”(57), 新疆(88).

Salix sp. (柳属)

Diplodia salicina Lev. 江苏(29,32).

Discella carbonacea (Fr.) Berk. et B. 江苏(29,32).

Discula microsperma (Berk. et Br.) Sacc. 河北(317).

Erinella tomentella Penz. et Sacc. 云南(306).

Fomes igniarius (L.) Kickx. (白色腐朽病) 甘肃(180), “西康”(33,34), 云南(34).

Macrophoma salicina (Sacc.) Berk. et Vogl. 江苏(29,32).

Melampsora coleosporioides Diet. (锈病) 云南(214).

M. hartigii Thuem. (锈病) 河北(166,197).

M. larici-epitea Kleb. (锈病) 贵州(245), 安徽(245).

M. salicis-albae Kleb. (锈病) 四川(150), 云南(214).

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (白色斑駁病) 河南(13).

Rhytisma salicinum Fr. (黑痣病) 吉林(313), 云南(333), 河南(13).

Sphaerella (Mycosphaerella) salicina Ell. et Ev. 江苏(22, 32).

Sphaeropsis salicicola Pass. 江苏(29,32).

Trametes hispida Pass. (白色心材腐朽病) 河北(20).

T. suaveolens (L.) Fr. (白色心材腐朽病) 陝西(236).

Uncinula salicis (DC.) Wint. (白粉病) 辽宁(313), 陝西(213), “西康”(57), 四川(150).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(49).

C. major Choisy (菟絲子) 河南(13).

C. sp. (菟絲子) 广西(177).

Salvia sp. (鼠尾草属)

Puccinia salvia Ung. (锈病) 云南(336).

Sambucus adnata Wall. (接骨木)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

S. japonica Thunb. (日本接骨木)

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lev. (白粉病) 江苏(213,219).

S. javanica Bl. (蒴藋)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 四川(150,226).

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lev. (白粉病) 四川(150,213,226).

Sambucus racemosa L. (接骨木)

Puccinia bolleyana Sacc. (銹病) 辽宁(313), 河北(317),
—(218).

S. sieboldiana Bl. (籃篩朴, 席氏接骨木)

Puccinia bolleyana Sacc. (銹病) 河北(64).

Sanchezia nobilis Hook. f.

Chaetoscorias vulgare Yamam. 台灣(386).

Sanguisorba canadensis L.

Xenodochus carbonarium Schlecht. (銹病) 山东(63).

S. officinalis L. (地榆)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 安徽
(231), 浙江(231).

S. humuli (DC.) Burr. (白粉病) 黑龙江(313), 吉林(313),
辽宁(313), “热河”(317), “西康”(57), 安徽(219), 浙江(231).

Xenodochus carbonarius Schlecht. (白粉病) 黑龙江(231,
271, 313), 吉林(313), 辽宁(313), “东北”(290), 河北(63,
317).

S. sp. (地榆屬)

Sphaerotheca humuli (DC.) Burr. (白粉病) 浙江(8).

Sanicula europaea L. (變豆菜)

Puccinia saniculae Grev. (銹病) 貴州(246).

Sapindus mukorossi Gaertn. (无患子)

Cercospora sapindicola Tai (叶斑病) 四川(150, 215).

Isariopsis sapindi Saw. (角斑病) 台灣(358).

Microthyrium paraguayense Speg. 江苏(47).

Phyllosticta sapindicola Saw. 四川(150), 台灣(360).

Sapium sebiferum Roxb. (烏臼)

Cercospora micromera Syd. (叶斑病) 台灣(359).

Helminthosporium sapii Miyake 湖南(315).

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 台灣(356).

Sasa albo-marginata Mak. et Shib. (山白竹)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

S. sp. (箬竹屬)

Leptostroma macrospora Teng 福建(29, 32).

Sassafras tzumu Hemsl. (檫樹)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).

Saururus chinensis (Lour.) Bail. (三白草)

Cercospora saururi Ell. et Ev. 台灣(360).

Uromyces saururi P. Henn. (銹病) 江苏(32, 36), 台灣
(360).

Saururus loureiri Decne. (三白草)*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(165).**Saussurea affinis** Spreng. (泥胡菜)*Bremia lactucae* Regel. (霜霉病) 湖北(47).*B. saussureae* Saw. (霜霉病) 四川(150), 浙江(8).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(165).**S. pulchella** DC. (美丽风毛柳)*Coleosporium saussureae* Thuem. (锈病) “东北”(272).**S. sp.** (风毛菊属)*Albugo tragopogonis* (Pers.) Gray (白锈病) 河北(316).*Coleosporium saussureae* Thuem. (锈病) 辽宁(313), 贵州(245), 安徽(245), 广西(245).*Puccinia kwangsiensis* Cummins (锈病) 广西(246).*P. saussureae-ussuriensis* Liou et Wang (锈病) 湖南(214).*Cuscuta japonica* Choisy (菟絲子) 浙江(164).**Scabiosa superba** Gruening (山萝卜)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河北(209).**S. sp.** (山萝卜属)*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) “热河”(317).**Schefflera octophylla** Harms. (鹅掌柴, 鸭田树, 八叶五加)*Meliola leptoclada* Syd. (煤病) 广东(362).*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**Schima kankaoensis** Hay.*Meliola schimicola* Yamam. (煤病) 台湾(381).**Schizonepeta lavendulacea** (L.) Brip.*Puccinia schizonepetae* Tranzsch. (锈病) 黑龙江(313), “东北”(290).**Scilla chinensis** Benth. (绵枣儿)*Ustilago vaillantii* Tul. (黑粉病) 浙江(32, 104, 153, 220).**Scirpus lacustris** L. (水葱, 蒲蓆草)*Puccinia obtecta* Peck. (锈病) 江苏(47).*P. scirpi* DC. (锈病) 吉林(313), 辽宁(313).

Scirpus triqueter L. (蘆草)*Puccinia obtecta* Peck (銹病) 辽宁(313).*P. scirpi-triqueteris* Saw. (銹病) 台灣(359).**S. sp.** (蘆草屬)*Puccinia scirpi-terrsatani* Hirat. f. (銹病) 貴州(246).**Scolopia chinensis** Clos (華薊柊)*Uredo scolopiae* Syd. (銹病) 廣東(274).**S. crenata** Clos (薊柊)*Uredo scolopiae* Syd. (銹病) 台灣(290).**S. oldhami** Hance (薊柊)*Phyllachora scolopiae* Saw. (黑痣病) 台灣(359).**S. sp.** (薊柊屬)*Uredo scolopiae* Syd. (銹病) 廣東(274).**Scorzonera albicaulis** Bge. (細葉雅蔥)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(172, 209), 安徽(219).**S. austriaca** L. (鴉蔥)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(172).*Puccinia scorzonerae* (Schum.) Kocky. (銹病) 河北(62).**S. mongolica** Max. (蒙古鴉蔥)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).**S. sp.** (鴉蔥屬)*Puccinia scorzonerae* (Schum.) Jocky (銹病) 河北(316).**Scutellaria baikalensis** Georgi (黃芩)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).**S. sp.** (黃芩屬)*Aecidium scutellariae-indicæ* Diet. (銹病) 江蘇(32, 36).**Secale cereale** L. (黑麥)*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麥角病) 黑龍江(294); 河北(373), 新疆(88).*Fusarium culmorum* (Smith) Sacc. ——(135).*F. graminearum* Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 黑龍江(294), ——(135).*F. nivale* (Fr.) Ces. ——(135).*Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (條銹病) 四川(91).*P. graminis* Pers. (稈銹病) 黑龍江(294), 吉林(294).

Secale cereale L. (黑麦)

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (叶锈病) 吉林(294), 内蒙(373), 四川(150).

Anquina tritici (Steinb.) Filip. et Stekh. (线虫病) 甘肃(167).

Securinea suffruticosa (Pall.) Rehd. (一叶萩)

Microsphaera securinegae Tai et Wei (白粉病) 江苏(219), 安徽(219), (283).

Nothoravenelia japonica Diet. (锈病) “东北”(272, 369), 河北(64, 316), 山东(66), 江苏(231), 浙江(220).

Sedum aizoon L. (土三七, 景天)

Aecidium shansiense Petr. (锈病) 山西(340).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河北(209).

Puccinia diplachnicola Diet. (锈病) “东北”(290).

S. kamtschaticum Fisch. et Mey. (费菜)

Puccinia stipae-sibiricae Ito (锈病) 辽宁(313), “东北”(313).

S. selskianum Regel et Maack

Puccinia diplachnicola Diet. (锈病) “东北”(290).

S. spinosum (L.) Willd.

Puccinia australis Koern. (锈病) 辽宁(313).

S. sp. (景天属)

Macrosporium commune Rabh. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) 河北(317).

Puccinia australis Koern. (锈病) 河北(317), 河南(13).

Semiaquilegia adoxoides (DC.) Mak. (小乌头, 天葵)

Aecidium semiaquilegiae Diet. (锈病) 江苏(32, 36).

Sesamum indicum L. (芝麻, 胡麻)

Ascochyta sesami Miura (褐斑病) 吉林(294), 西康(57).

Cercospora sesami Zimm. (叶斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 热河(294, 345), 河北(374), 西康(57), 云南(212), 湖南(112), 广西(30, 32, 37), 台湾(350).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(356).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 湖南(112);

Fusarium vasinfectum Atk. var. *sesami* Zap. (枯萎病) —(135).

Helminthosporium sesami Miyake (叶枯病) 黑龙江(294), 西康(57), 山东(374).

Sesamum indicum L. (芝麻, 胡麻)

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖腐病) 台湾 (351).

Macrosporium sesami Kawamura 黑龙江(294), 辽宁(294), “热河”(294).

Phoma sesami Saw. 台湾(351).

Pseudomonas sesami Malkoff. (細菌性斑点病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294), 河北(138), 西康(57), 云南(138), 湖北(138), 湖南(112, 138), 河南(138), 山东(138), 江苏(138), 浙江(138).

P. sp. 貴州(196).

Xanthomonas ricinicola (Ell.) Dowson “热河”(345).

X. solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) “西康”(57), 江西(158).

S. orientale L. (芝麻, 胡麻)

Ascochyta sesami Miura (褐斑病) 吉林(313), 河南(13).

Cercospora sesami Zimm. (叶斑病) 河北(51, 116, 321), “西康”(57), 四川(150), 云南(215), 湖北(315), 河南(13, 176), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51, 128), 福建(10), 广西(215), “华南”(342).

Dothiorella philippinensis Pat. 湖北(364), 江苏(231).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 山西(319), 江苏(128, 219).

Fusarium vasinfectum Atk. (枯萎病) 河北(321), 山西(319).

F. vasinfectum Atk. var. *sesami* Zap. (枯萎病) 河南(13, 176).

Helminthosporium sesami Miyake (叶枯病) “西康”(57), 湖北(315), 河南(176).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (莖腐病) 河南(176).

Phoma sesami Saw. 河南(176).

Pseudomonas sesami Malkoff (細菌性斑点病) 河北(321), 河南(13, 176).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) 河南(13).

花叶病 (Mosaic) 河南(176).

Seseli buchtormense Koch

Septoria buchtormensis Petr. (斑枯病) 山西(340).

S. condensatum Reichb. f.

Puccinia angelicae Fuck. (锈病) 山西(340).

Setaria forbesiana

Puccinia setariae-forbesianae Tai (锈病) 云南(214).

S. glauca Beauv.

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 台湾(357).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 黑龙江(313).

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet. (白髮病) 河北(315), “西康”(57), 浙江(205).

Uromyces setariae-italicae Yosh. (锈病) “华南”(342).

Ustilago neglecta Niessl. (黑粉病) 辽宁(313), “东北”(288), 河北(313), 江苏(32, 104), 浙江(32), 广东(32), 台湾(152, 288).

S. italica Beauv. (粟, 谷子, 小米)

Alternaria tenuis Nees (黑斑病) 吉林(294, 313), “西康”(57).

Cercospora setariae Atk. (叶斑病) “西康”(57), 河南(13).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link (黑霉病) “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 四川(150), 台湾(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. concolor Reink. ——(135).

F. culmorum (Smith) Sacc. ——(135).

F. diversisporum Sherb. ——(135).

F. equiseti (Corda) Sacc. ——(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) ——(135).

F. heterosporium Nees ——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ——(135).

F. nivale (Fr.) Ces. ——(135).

F. nivale (Fr.) Ces. var. *setariae* Yu et Lou ——(135, 139).

Setaria italica Beauv. (粟,谷子,小米)

F. orthoceras App. et Wr. var. *longius* (Sherb.) Wr.
——(135).

F. poae (Pk.) Wr. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. var. *caudatum* Wr. ——(135).

F. scirpi Lamb. et Fautr. var. *compactum* Wr. ——
(135).

F. sporotrichioides Sherb. ——(135).

Helminthosporium setariae Saw. (*Cochliobolus setariae*
(Ito et Kurib.) Drechsler) (粟斑点病) 黑龙江(294),
辽宁(294),内蒙(168,321),“热河”(294,345),河北(116,168,
321,374),山西(321),“西康”(57),云南(212),湖南(112),
河南(13,374),山东(168,321),江苏(128),浙江(49),福建
(10),台湾(350).

Hypochnus setariae Saw. 台湾(350).

Ophiobolus setariae (Saw.) Ito et Kurib. “热河”(345), 河
北(374).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 河北(321, 374), 山西
(321), 台湾(347, 350).

Piricularia grisea (Cke.) Sacc. (粟瘟病) 台湾(350).

P. oryzae Bri. et Cav. (粟瘟病) 台湾(350).

P. setariae Nishikado (粟瘟病) 黑龙江(294), 辽宁(294),
“热河”(345), 河北(168, 321, 374), 四川(150), 云南(212),
河南(13), 山东(321).

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet. (白髮病) 黑龙
江(60, 294), 吉林(43a, 294, 313), 辽宁(43a, 294, 313), “东北”
(287), 内蒙(168, 321, 372), “热河”(294, 345), 河北(51,
116, 166, 168, 197, 205, 374), 山西(1, 168, 205, 319, 321,
372), 陕西(168), “华北”(341), 新疆(88), 四川(75, 150),
云南(212), 贵州(174), 河南(13, 168, 205), 山东(14, 51, 101,
168, 321, 374), 江苏(128), 浙江(49), 福建(10), 广东(76,
141), 台湾(287), “华南”(342).

Uromyces setariae-italicae Yoshino (锈病) 黑龙江(60),
吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), “东北”(272), “热河”(294,
345), 河北(51, 64, 116, 168, 171, 321), 山西(168), “西康”
(57), 四川(75, 150), 湖南(112), 河南(13), 山东(51, 64,
321), 安徽(51), 江苏(51, 106, 128), 华东(341), 福建(10),
广东(370), “华南”(342).

Setaria italica Beauv. (粟,谷子,小米)

Ustilago crameri Koern. (粟黑穗病) 黑龙江(60, 153, 294), 吉林(153, 294, 313), 辽宁(153, 294), 内蒙(168, 372, 373), “热河”(153, 294, 345), 河北(20, 32, 47, 51, 104, 116, 153, 166, 168, 171, 197, 198, 316, 374), 山西(1, 153, 168, 319, 321, 372), 陕西(168), 新疆(88), “西康”(57, 153), 四川(75, 149, 150, 153), 河南(13, 153, 168), 山东(14, 32, 51, 104, 153, 168, 321), 江苏(106, 128), “华东”(341), 台湾(152, 153).

Bacterium sp. 河南(13).

Pseudomonas setariae (Okabe) Savulescu 吉林(138, 294), 河北(138), 台湾(329).

Anguillulina sp. (綫虫病) 河北(166, 197).

Heterodera schachtii A Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a), 山西(139a), 河南(139a), 山东(139a).

倒青病 山东(51), 河北(51).

毛穗病 河北(166, 168).

S. italica Beauv. var. **germanica** Trin. (粟)

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet. (白髮病) 内蒙(373), 河北(373), 山西(373).

Ustilago crameri Koern. (粒黑穗病) “东北”(288), 台湾(288).

S. lutescens (Wiegel) F. E. Hubb. (金狗尾草, 黄狗尾草)

Ephelis japonica P. Henn. (“一柱香”病) 四川(150).

Neovossia setariae (Ling) Yu et Lou (= *Tilletia setariae* Ling) (腥黑穗病) 四川(149, 150, 153).

Uromyces setariae-italicae Yoshino (锈病) 四川(150).

Ustilago neglecta Niessl. (黑粉病) 辽宁(153), 河北(153), 四川(153), 江苏(153), 浙江(153), 广东(153), 台湾(153).

紅叶病(病毒病害) 河北(139a).

S. lutescens (Wiegel) F.E. Hubb. var. **genuina** Honda (黄狗尾草)

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet. (白髮病) “东北”(287), 台湾(287).

Uromyces setariae-italicae Yoshino (锈病) 广东(274), 台湾(290).

Setaria palmifolia (Koenig) Stapf (棕叶狗尾草)*Phyllachora evansii* Syd. (黑痣病) 广东(340).**S. plicata** (Lam.) Cke. (皱叶狗尾草)*Cercospora fusimaculans* Atk. (叶斑病) 台湾(360).*Helminthosporium panici* Saw. 台湾(358).*Phyllachora vanderystii* Theiss. et Syd. (黑痣病) 台湾(359).*Uredo panici-plicati* Saw. (锈病) 台湾(359).**S. viridis** Beauv. (狗尾草, 莠)*Ephelis japonica* P. Henn. (“一柱香”病) 四川(150).*Piricularia grisea* (Cke.) Sacc. (粟瘟病) 四川(150).*P. setariae* Nishikado (瘟病) 河北(374).*Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. (白髮病) 吉林(313), 辽宁(43a), “东北”(287), 河北(116, 374), 山西(319), 江苏(205), 台湾(287).*Uromyces setariae-italicae* Yoshino (锈病) 吉林(313), “东北”(373), 河北(116), “西康”(57), 湖北(47), 山东(47), 江苏(106).*Ustilago crameri* Koern. (粒黑穗病) “东北”(288), 河北(116), “西康”(57), 湖南(315), 台湾(288).*U. neglecta* Niessl. (黑粉病) 辽宁(153), 河北(153), 四川(153), 江苏(106), 浙江(153), 广东(153), 台湾(153).

紅叶病 (病毒病害) 河北(139a).

S. viridis Beauv. var. **purpurascens** Max.*Piricularia setariae* Nishikado (粟瘟病) “东北”(371).**S. sp.** (狗尾草属)*Helminthosporium setariae* Saw. (*Cochliobolus setariae* (Ito et Kurib.) Drechsler) (粟斑点病) 河南(13).*Piricularia grisea* (Cke.) Sacc. (粟瘟病) 河南(13).*Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. (白髮病) 河南(13).*Uromyces leptodermus* Syd. (锈病) 貴州(246), 广西(246).**Sida acuta** Burm. f. (黄花捻)*Meliola sidae* Rehm. (煤病) 台湾(380).**S. humilis** Willd. (金干花)*Puccinia heterospora* Berk. et Curt. (锈病) 台湾(290).**S. sp.** (黄花捻属)*Puccinia heterospora* Berk. et Curt. (锈病) 广东(274).

Siegesbeckia orientalis L. (豨签)*Erysiphe cichoracearum* DC. (白粉病) 河北(209).*Plasmopara halstedii* (Farlow) Bert. et de Toni (霜霉病) 台湾(290).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).*Septoria siegesbeckiae* Saw. (斑枯病) 台湾(359).*Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Poll. (白粉病) 辽宁(313), 河北(172, 315), 浙江(219).*Uromyces suzukii* Saw. (锈病) 台湾(290, 359).**Silene aprica** Turcz. var. *firma* Wils.*Septoria lychnidis* Desm. (斑枯病) 辽宁(313).**S. fortunei** Vis. (蝇子草)*Uromyces inaequalitus* Lasch. (锈病) 陕西(218), 安徽(32, 36).**S. kiiruninsularis** Masamune*Uromyces inaequalitus* Lasch. (锈病) 台湾(278).**S. repens** Pater.*Ascochyta dianthi* (A. et S.) Lib. (褐斑病) 黑龙江(313).**S. tatarinowii** Regel*Ustilago violacea* (Pers.) Fuck. (黑粉病) 黑龙江(153), 河北(153, 198), “西康”(153).**S. tenuis** Willd. var. *rubescens* Franch.*Ustilago violacea* (Pers.) Fuck. (黑粉病) 黑龙江(153), 河北(153), “西康”(153), 四川(306).**S. sp.** (麦瓶草属)*Puccinia behenis* Oth. (锈病) 陕西(237).**Siler divaricatum** Benth. et Hook f. (防风)*Puccinia sileris* Voss. (锈病) 东北(290, 313), 安徽(65).**Sinocalamus affinis** (Rendle) McClure (慈竹)*Fusarium bambusicola* Hara 四川(150).*Melanconium shiraianum* Syd. 四川(150).*Munkiella shiraiana* Miyake et Hara 四川(150).*Phoma arundinacea* Sacc. 四川(150).*Phyllachora sinensis* Sacc. (黑痣病) 四川(150).*Phyllosticta take* Miyake et Hara 四川(150).**Sisymbrium officinale** Scop.*Albugo candida* (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

- Smilacina formosana** Hay. (台湾鹿药)
Puccinia smilacinae Syd. (锈病) 台湾(290).
- S. oleracea** Hook f. et Thoms. (鹿药)
Rhabdospora smilacinicola Keissl. 云南(305).
- S. yunnanensis** (Franch.) H.-M. (鹿药)
Leptothyrium polygonati Tassi 四川(306).
- Smilax china** L. (菝葜)
Aecidium smilacis Schw. (锈病) 湖北(6), 江苏(214), 江西(6).
A. smilacis-chinae Saw. (锈病) 台湾(359).
Leptothyrium smilacis-chinae Teng 江苏(29, 32).
Puccinia ferruginea Lev. (锈病) 四川(150), 湖北(220), 江苏(36, 220), 浙江(36, 62, 220), 江西(6), 福建(36), 广东(274), 台湾(290, 355).
P. smilacis-sieboldii Hirat. (锈病) 江西(6), 台湾(290).
- S. davidiana** DC.
Puccinia ferruginea Lev. (锈病) 江西(6).
- S. gaudichaudiana** Kunth
Puccinia citrina Syd. (锈病) ——(369).
- S. glabra** Roxb. (光菝葜)
Puccinia citrina Syd. (锈病) 台湾(290).
- S. glauca-china** Warb.
Puccinia ferruginea Lev. (锈病) 江西(6).
- S. herbacea** L. (牛尾菜)
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 四川(150).
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx. 江西(47).
- S. japonica** A. Gray (日本菝葜)
Puccinia smilacinae Syd. (锈病) 台湾(368).
- S. longipes** Warb. (长叶菝葜)
Puccinia ferruginea Lev. (锈病) 云南(214), 贵州(214).
- S. menispermoides** A. DC. (防己叶菝葜)
Puccinia henryana Syd. (锈病) 湖北(369).
- S. randaiensis** Hay.
Blastospora itoana Togashi et Onuma 台湾(290).
- S. sempervirens** Wang (常绿菝葜)
Puccinia smilacis-sempervirentis Wang (锈病) 江西(6).
- S. stenopetala** Gray (狭叶菝葜)
Meliola smilacis Stev. (煤病) 台湾(380).
Puccinia citrina Syd. (锈病) 台湾(290, 359, 368).

Smilax trachyclada Hay.

Meliola smilacis Stev. (煤病) 台湾(380).

S. sp. (菝葜属)

Aecidium smilacis Schw. (锈病) 江苏(32,36), 浙江(32,36), 广西(32).

Meliola smilacis Stev. (煤病) 台湾(387).

Pestalozzia guepini Desm. (輪斑病) 江苏(102).

Puccinia citrina Syd. (锈病) 广东(32,36).

P. ferruginea Lev. (锈病) 湖南(32), 江苏(32,201), 浙江(32,36), 福建(32), 广西(32).

P. henryana Syd. (锈病) 湖南(32), 浙江(32,36).

P. smilacis-sieboldii Hirat. (锈病) 云南(214), 湖南(32,36,214), 江苏(32,36), 广西(32).

Solanum dulcamara L. (千年不烂心, 蜀羊泉)

Septoria dulcamarae Desm. (斑枯病) 辽宁(313).

S. melongena L. (茄)

Alternaria dauci (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (早疫病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294,345), 河北(373), 山西(321,373), “西康”(57), 四川(150), 湖北(47), 河南(13,47), 山东(47), 江苏(128), 福建(10,113).

Ascochyta melongenae Padmanabhan (褐斑病) 四川(150), 安徽(374), 台湾(358).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Cercospora melongenae Welles. (叶斑病) 黑龙江(60,294), 辽宁(294), 甘肃(215), “西康”(57), 四川(150), 云南(111,112,212,215), 湖南(112), 河南(13), 广东(233), 台湾(358).

Choanephora cucurbitarum (B. et R.) Thaxter (花腐病) 河南(13).

C. manshurica (Saito et Nagatomo) Tai (花腐病) 四川(150).

Cladosporium fulvum Cke. (黑霉病) 内蒙(372), 山西(373), “西康”(57), 河南(13).

Colletotrichum nigrum Ell. et Halst. (炭疽病) 四川(150), 广东(199), 广西(37).

Solanum melongena L. (茄)

- Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 广东 (141), 台湾 (350).
- Diplodina destructiva* (Plowr.) Petr. 内蒙 (372), 河北 (373).
- Fusarium anguioides* Sherb. — (135).
- F. moniliforme* Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) — (135).
- F. semitectum* Berk. et Rav. — (135).
- Gloeosporium melongenae* Ell. et Halst. (炭疽病) 四川 (150), 江苏 (128), 福建 (10).
- Myrothecium roridum* (Tode) Fr. 四川 (150, 229).
- Pellicularia filamentosa* (Pat.) Rogers (立枯病) 吉林 (294), “东北” (371), “热河” (345), 河南 (13), 江苏 (128), 福建 (10).
- Phaeosphaerella melongenae* Saw. 台湾 (358).
- Phomopsis vexans* (Sacc. et Syd.) Harter (*Diaporthe vexans* Gratz.) (褐纹病) 黑龙江 (294), 吉林 (294), 辽宁 (294), 内蒙 (372), “热河” (294), 河北 (116, 163, 321, 373), 四川 (75, 91, 150, 221), 云南 (111, 112, 212), 湖北 (315), 湖南 (112), 河南 (13, 47), 山东 (321, 374), 江苏 (29, 32, 106, 128, 201, 231, 284), 福建 (10, 113), 广东 (186, 199, 370), 广西 (37, 112), 台湾 (358), “华南” (342).
- Phyllosticta melongenae* Saw. 台湾 (358).
- Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary (晚疫病) 台湾 (287).
- P. melongenae* Saw. (果腐病) 陕西 (16), 河南 (13), 江苏 (128), 台湾 (287, 348).
- Pythium aphanidermatum* (Eds.) Fitz. (猝倒病) 台湾 (358).
- P. deBaryanum* Hesse (猝倒病) 吉林 (294), “热河” (345).
- Rhabdospora melongenae* Hanzawa 河北 (116).
- Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).
- Septoria lycopersici* Speg. (斑枯病) 吉林 (294), “热河” (294), 江苏 (128).
- S. melongenae* Saw. (斑枯病) 四川 (150), 台湾 (358).

Solanum melongena L.

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 台湾 (350).

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthod (黄萎病) 陕西(16).

V. dahliae Kleb. (黄萎病) 辽宁(175), 新疆(88).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson (青枯病) 黑龙江(294), “西康”(57), 江苏(138), “华南”(342).

Nicotiana virus 1 (花叶病) “西康”(57).

花叶病 (Mosaic) 福建(10), 广东(82).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95), 广东(100).

S. nigrum L. (龙葵)

Cercospora atro-marginalis Atk. (叶斑病) 河北(315), 四川(150), 云南(215), 湖北(47), 台湾(354).

C. melongenae Welles (叶斑病) “西康”(57), 河南(13).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台湾(350).

Verticillium dahliae Kleb. (黄萎病) 吉林(175).

S. tuberosum L. (馬鈴薯)

Alternaria dauci (Kuehn.) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves) (早疫病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(372), “热河”(294, 345), 河北(10, 166, 197, 372, 373), 山西(1, 168), 新疆(88), “西康”(57), 四川(150), 云南(212), 贵州(174), 河南(13), 江苏(47, 128), “华东”(341), 江西(47), 福建(10).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 江苏(128), 台湾(350).

Cercospora concors (Casp.) Sacc. (叶斑病) 河南(13, 215).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 江苏(128), 广东(141), 台湾(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. coeruleum (Lib.) Sacc. (干腐病) ——(135).

F. oxysporum Schl. 河南(13), 江苏(128), ——(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. 河北(51), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51).

F. solani (Mart.) App. et Wr. *eumartii* (Carp.) Wr. ——(135).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 吉林(294), “热河”(345), “西康”(57), 河南(13), 江苏(128), 广东(141).

Solanum tuberosum L. (馬鈴薯)

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (晚疫病) 黑龍江(294), 吉林(294, 313), 內蒙(372, 373), “熱河”(294, 345), 河北(166, 315, 372, 373), 山西(5), 甘肅(44), 新疆(88), “西康”(57), 四川(73, 150, 194), 雲南(111, 112, 212), 河南(13), 江蘇(106, 128), 江西(158), 福建(10), 台灣(287).

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 江蘇(128), 台灣(350).

Spondylocadium atrovirens Harz. 台灣(350).

Spongospora subterranea (Wallr.) John. (粉痂病) 福建(140c), 廣東(140c).

Trichothecium roseum (Bull.) Link 四川(221).

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthod (黃萎病) 四川(221).

Actinomyces scabies (Thaxt.) Gussow (= *Oospora scabies* Thaxt.) 廣東(233).

Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth.) Skaptason et Burkh. (環腐病) 遼寧(138).

Erwinia aroideae (Townsend.) Holl. (軟腐病) 黑龍江(294), “西康”(57).

E. atroseptica (Hall.) Jennison (黑腳病) 湖北(138), 江蘇(138), 江西(138).

E. carotovora (Jones) Holl. (軟腐病) 河南(13).

Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman et Henrici 黑龍江(294), 吉林(294), 遼寧(294), 河北(51), 四川(150), 河南(13), 山東(51), 安徽(51), 江蘇(51, 128), “華東”(341), 福建(10), 廣東(141, 186).

Xanthomonas solanacearum (Smith) Dowson “西康”(57), 江蘇(128).

Solanum virus 1 (輕性花葉病) “西康”(57).

Solanum virus 2 (丫花葉病) “西康”(57).

Solanum virus 3 (脈間花葉病) “西康”(57).

Solanum virus 4 “西康”(57).

Solanum virus 9 (阿古巴花葉病) “西康”(57).

Solanum virus 12 (紆塊莖病) 陝西(250), 甘肅(250), 青海(250), 江蘇(127).

Solanum tuberosum L. (馬鈴薯)

Solanum virus 14 (捲叶病) 陝西(250), 甘肅(44, 250), 青海(250), 四川(250), 雲南(250), 貴州(250), 湖北(250), 湖南(13, 250), 江蘇(127), 福建(10).

Solanum virus 15 甘肅(44), 貴州(250), 江蘇(127).

皺縮花叶病 (Complex of *Solanum virus* 2 and *Solanum virus* 1) 陝西(250), 甘肅(250), 青海(250), 四川(250), 貴州(250), 福建(10).

花叶病 (Mosaic) 內蒙(321), 山西(321), 甘肅(44), 河南(13), 山東(182), 江蘇(128), “華東”(341), 福建(10), 廣東(82, 141), “各地”(127).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山東(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山東(95).

Pratylenchus pratensis (de Man) Filipjev. (綫虫病) 四川(74).

Solidago virgaurea L. (一枝黃花)

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray (白銹病) “東北”(287), 台灣(287).

Bremia lactucae Regel (霜霉病) 江蘇(47).

Cercospora virgaureae (Thuem.) L. (白斑病) 台灣(359).

Coleosporium solidaginis (Schw.) Thuem. (銹病) 台灣(298).

Uromyces rudbeckiae Arthur et Holway (銹病) 吉林(238), “東北”(290), 台灣(290, 356).

U. solidaginis (Sommf.) Niessl. (銹病) 吉林(313).

S. sp. (一枝黃花屬)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 浙江(219).

Sonchus arvensis L. (莕薺菜)

Bremia lactucae Regel. (霜霉病) 廣東(112).

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 遼寧(313), 河北(219).

Oidium sonchi-arvensis Saw. (白粉病) 台灣(354).

Puccinia sonchi Rob. (銹病) “西康”(57), 湖南(112), 廣東(112), 廣西(112).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台灣(350).

Sonchus arvensis L. (苣荳屬)

Septoria modonia Sacc. var. *brevispora* Saw. (斑枯病)
台灣(358).

S. sonchina Thuem. (斑枯病) 吉林(313), 辽宁(313).

Uredo sonchi-arvensis Saw. (銹病) 台灣(359).

S. arvensis L. var. *uliginosus* Trautv. (野苦蕒)

Bremia sonchicola (Schlecht.) Saw. (霜霉病) 辽宁(43a),
台灣(287).

Puccinia sonchi Rob. (銹病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北
(64).

Septoria sonchina Thuem. (斑枯病) 吉林(313), 辽宁
(313).

Sonchus brachyotus DC.

Puccinia sonchi Rob. (銹病) 黑龙江(272), “东北”(272)
湖南(340).

Sophora angustifolia Sieb. et Zucc. (狹葉槐)

Uromyces sophorae-flavescentis Kusano (銹病) “东北”
(290).

S. flavescentis Ait. (苦參)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. (菌核病) 四川
(150).

Uromyces sophorae-flavescentis Kusano (銹病) “东北”
(290), 河北(63), 山东(63).

S. flavescentis Ait. var. *angustifolia* Kitagawa (狹葉苦參)

Uromyces sophorae-flavescentis Kusano (銹病) “东北”
(272).

S. flavescentis Ait. var. *galegoides* Hemsl. (紅花苦參)

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(165).

S. japonica L. (槐樹)

Cystospora sophorae Bres. (腐爛病) 江苏(29, 32).

Eutypella deusta Ell. et Ev. 河北(20).

Fracchiæa heterogenea Sacc. 河北(20).

Haplosporella ailanthi Ell. et Ev. 河北(20).

Macrophoma sophorae Miyake (干斑病) 河北(315), 山东
(201).

M. sophoricola Teng 江苏(32).

Phomopsis sophorae Trav. 江苏(29, 32).

Sophora japonica L. (槐樹)*Polyporus hispidus* (Bull.) Fr. 河北(20).*Trichothecium roseum* (Bull.) Link (腐敗病) 河北(20).*Uncinula sinensis* Tai et Wei (白粉病) 貴州(219), 河南(13, 213).*Uromyces truncicola* P. Henn. et Shirai (銹病) “西康”(57), 四川(150), 山東(67), 安徽(231), 江蘇(32, 36, 106, 201), 浙江(8, 49).*Loranthus parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 廣西(160).**S. viciifolia** Hance (馬蹄針, 狼牙刺, 白刺花, 苦刺花)*Aecidium anningense* Tai (銹病) 雲南(214).*Uromyces sophorae-viciifoliae* Tai (銹病) 雲南(214).**S. sp.** (槐屬)*Diplodia sophorae* Speg. et Sacc. 雲南(333).*Uromyces truncicola* P. Henn. et Shirai (銹病) 安徽(246).**Sorbaria kirilowii** Regel (吉氏珍珠梅)*Cercospora gotoana* Togashi “東北”(313).**Sorbus alnifolia** K. Koch. (花楸, 水榆)*Gymnosporangium nipponicum* Yamada (銹病) 貴州(214).*Monochaetia mali* (Ell. et Ev.) Sacc. 吉林(313).**S. valbrayi***Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart. (銹病) 雲南(214).**S. sp.** (花楸屬)*Pestalozzia sorbi* Pat. (輪斑病) 雲南(333).*Sclerotinia ariae* Schellen (菌核病) 湖南(32, 190).**Sorghum halepense** Pers. var. **muticum** Honda (頓穎阿拉伯高粱)*Puccinia purpurea* Cke. (銹病) 台灣(271).**S. nitidum** (Vahl.) Pers. (光高粱)*Sphacelotheca taiana* (Syd.) Ling (黑粉病) 江蘇(153).**S. vulgare** Pers. (蜀黍, 高粱)*Cercospora andropogonis* Ou (葉斑病) 四川(194).

Sorghum vulgare Pers. (蜀黍,高粱)

C. sorghi Ell. et Ev. (叶斑病) 辽宁(294), 内蒙(373), “热河”(294, 345), 河北(51, 116, 168, 321, 373, 374), 山西(373), “西康”(57), 四川(150), 云南(112, 212), 贵州(174, 196), 湖南(112), 河南(13, 374), 山东(168, 321, 374), 安徽(51, 374), 江苏(30, 32, 51, 128), 福建(10), 广西(30, 32, 112).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), “西康”(57).

Colletotrichum graminicolum (Ces.) Wils. (炭疽病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), 河北(116, 374), 山西(168, 319, 321), “西康”(57), 四川(32, 75, 150, 194), 云南(112, 212), 湖北(231), 湖南(32, 112), 河南(231), 山东(32, 168, 231, 374), 安徽(30, 32, 341), 江苏(30, 32, 106, 128), 浙江(49), 福建(10), 广东(199), 广西(32, 178), 台湾(350, 357), “华南”(342).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. —(135).

F. culmorum (Smith) Sacc. —(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).

Helminthosporium caryopsidum Sacc. (颖霉病) 广西(30, 32), “华南”(342).

H. turcicum Pass. (大斑病) 黑龙江(294), 吉林(294), 辽宁(294), “热河”(294, 345), 河北(51, 168, 315), 山西(168), “西康”(57), 云南(112, 212), 湖北(315), 湖南(112), 河南(13), 山东(51, 182), 安徽(51), 江苏(51, 128), 福建(10), 台湾(350).

Mycosphaerella cerea Sacc. 河北(317), “西康”(57), 河南(13).

Phyllachora sorghi Hoehn. (黑痣病) 广东(112).

Phyllosticta sorghina Sacc. 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294, 313), 四川(150), 云南(111, 112, 212), 湖南(112), 河南(13), 广西(112).

Puccinia nisanthi Miura (锈病) 江苏(214).

P. purpurea Cke. (锈病) “西康”(57), 台湾(247, 290, 359).

Sorghum vulgare Pers. (蜀黍,高粱)

Pythium deBaryanum Hesse (猝倒病) 吉林(294,313).

Ramulispora sorghi (Ell. et Ev.) Olive et le Febure
(= *Titaeospora andropogonis* (Miura) Tai) 黑龙江(294),
吉林(294),辽宁(294),“热河”(294,345),河北(116,168),
山西(168),云南(112,212),贵州(196),湖南(112),河南
(13),江苏(128,205),福建(10),广东(205,231).

Sclerospora sorghi (Kulk.) West. et Upp. (白髮病) 河南
(13).

Septoria obtusa Heald et Wolf (斑枯病) 四川(150).

S. pertusa Heald et Wolf (斑枯病) “华东”(341).

S. posekensis Sacc. (斑枯病) 河北(51).

Sphacelotheca cruenta (Kuehn.) Potter (散黑穗病) 黑龙
江(60,153,294),吉林(153,294),辽宁(153,294),“东北”
(32,104,198),内蒙(58,168,321,372),“热河”(153,294,
345),河北(51,116,153,168,198,373,374),山西(1,153,
168,319,321,372,373),新疆(88,153),“西康”(57),四川
(75),云南(112,149,153,212),湖北(32,104,153),河南
(13,149,153,168),山东(14,51,101,168,198,321),安徽
(32,51,104,153),江苏(32,51,104,128,153,201),“华东”
(341),台湾(152,153,287).

S. reilianum (Kuehn.) Clint. (絲黑穗病) 黑龙江(60,
135,294),吉林(153,294,313),辽宁(153,294),“东北”
(32,104),内蒙(58,153,168,321,372),“热河”(153,294,
345),河北(32,47,51,104,116,153,168,198,374),山西
(1,32,104,153,168,198,321,372),新疆(88),“西康”(57,
149,153),四川(32,75,150,153,194),云南(111,112,212),
贵州(149,153,174,393),湖南(112),河南(13,149,153,
168),山东(51,101,168,198,321),安徽(51),江苏(32,51,
104,106,128,153,198,201),浙江(47,153),“华东”(341),
台湾(152,153,355).

S. sorghi (Link) Clint. (堅黑穗病) 黑龙江(60),吉林
(153,294),辽宁(153,294),“东北”(198),内蒙(153,168,
321,372,373),河北(20,32,104,116,153,166,197,198,
373),山西(1,153,168,319,372,373),新疆(88),“西康”
(57),云南(111),河南(13,32,104,153,374),山东(14,
198,321),江苏(128),台湾(152,153,351).

Sorghum vulgare Pers. (蜀黍,高粱)

Ustilago kenjiana Ito (黑粉病) 吉林(153), “东北”(286, 288).

Vermicularia graminicola West. (炭疽病) 河北(315), 湖北(315).

Bacillus sorghi Burr. 河北(197), 湖南(112).

Pseudomonas andropogoni (Smith) Stapp 河北(138), 山西(138, 319), 河南(13, 138), 山东(138), 江苏(138).

P. syringae van Hall 云南(111, 112), 湖南(112).

Xanthomonas holcicola (Ell.) Starr. 河北(138), 湖北(138), 河南(138), 山东(138), 江苏(138).

Zea virus 1 “西康”(57).

Heterodera schachtii A. Schmidt (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

Sorghum vulgare Pers. subsp. **japonicus** Hack. (日本蜀黍)

Sphacelotheca sorghi (Link) Clint. (坚黑穗病) 吉林(313).

S. sp. (蜀黍属)

Cladosporium herbarum (Pers.) Link 吉林(313).

Spathoglottis pubescens Lindl. (黄花独蒜)

Coleosporium arundinae Syd. (锈病) 云南(214).

Spinacia oleracea L. (菠薐,菠菜)

Ascochyta chenopodii (Karst.) Rostr. (褐斑病) 河北(316), 江苏(128).

Cercospora beticola Sacc. (叶斑病) “华北”(258), 四川(150, 194, 215), 广西(37).

Cladosporium macrocarpum Preuss. 四川(75), 湖南(112).

Colletotrichum spinaciae Ell. et Halst. (炭疽病) 黑龙江(294), 台湾(350).

Fusarium moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) ——(135).

F. orthoceras App. et Wr. ——(135).

F. redolehs Wr. ——(135).

Peronospora effusa (Grev.) Ces. (霜霉病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽宁(43a, 294, 313), “东北”(287), 内蒙(372), 河北(166, 173, 231, 373), 山西(319), 新疆(88), “西康”(57), 四川(75, 150, 194, 221), 云南(111, 112, 212), 贵州(174), 湖南(112), 河南(13), 江苏(47, 106, 128, 201, 220), 浙江(8), “华东”(341), 福建(10, 183), 广东(112), 广西(178), 台湾(287).

Spinacia oleracea L. (菠薐, 菠菜)

Phyllosticta chenopodii Sacc. 四川 (150), 湖南 (112), 广东 (112).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾 (350).

Cucumis virus 1 (花叶病) “西康” (57).

花叶病 (Mosaic) 湖北 (127), 湖南 (127), 安徽 (127), 江苏 (127), 浙江 (127), 江西 (127).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 广东 (100).

Spiraea blumei Don. (珍珠梅, 补氏繡綫菊)

Cladosporium nodulosum Corda (黑霉病) 陕西 (237).

Diplodia spiraeina Sacc. 江苏 (29, 32).

S. pubescens Turcz. (土庄花)

Coniothyrium spiraeae Miyake “热河” (317).

Podosphaera oxyacanthae (DC.) de Bary (白粉病) “热河” (315).

S. thunbergii Sieb. (珍珠花, 雪柳)

Cercospora spiraeae Thuem. (叶斑病) 江苏 (29, 32).

Spodiopogon cotulifer (Thunb.) Hack. (油芒)

Meliola panici Earle (煤病) 浙江 (364).

Puccinia miyoshiana Diet. (锈病) 四川 (150), 江苏 (231), 浙江 (364).

S. sibiricus Trin. (大油芒)

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. (麦角病) 黑龙江 (313).

Puccinia miyoshiana Diet. (锈病) 东北 (272), 河北 (63, 247), 陕西 (7), 湖南 (32, 36, 247), 山东 (66), 安徽 (231, 247), 江苏 (32, 36), 江西 (231, 247, 364).

紅叶病 (病毒病害) 河北 (139a).

S. sp. (油芒属)

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 遼宁 (313).

Spondias axillaris Roxb. (酸枣)

Nyssopsora cedrelae (Hori) Tranzsch. (锈病) 湖南 (214).

Loranthus yadoriki Sieb. (樟寄生) 广西 (160).

S. sp. (檳榔青属)

Coniosporium spondiadis Keissler 云南 (304).

Sporobolus elongatus R. Br.

Cerebella paspali Cke. et Mass. “华南”(342).

Epichloe cinerea Berk. et Br. (香柱病) 广东(362).

Helminthosporium ravenelii Curt. (穗霉病) 广东(370), 台湾(350,356), “华南”(342).

Uromyces tenuicutis McAlp. (锈病) 台湾(290,359).

S. indicus (L.) R. Br.

Epichloe cinerea Berk. et Br. (香柱病) 四川(150).

Helminthosporium ravenelii Curt. (穗霉病) 四川(150), 湖北(315), 湖南(315).

Puccinia arundinellae-setosae Tai (锈病) 四川(150,214).

Uromyces tenuicutis McAlp. (锈病) 四川(150,214), 云南(214).

Ustilago sporoboli-indici Ling (黑粉病) 四川(149, 150, 153).

S. sp. (鼠尾粟属)

Epichloe cinerea Berk. et Br. (香柱病) 广西(231).

E. sporoboli Teng (香柱病) 云南(27,32), 广东(27,32), 广西(32).

Helminthosporium ravenelii Curt. (穗霉病) 浙江(28,32), 广东(28,32), 广西(32).

Staphylea bumalda DC. (省沽油)

Aecidium staphyleae Miura (锈病) 遼宁(313), “东北”(290).

Mycosphaerella staphyleae Miura 遼宁(313).

Statice aurea L. (蒼蝇架)

Uromyces limonii (DC.) Lev. (锈病) “东北”(273,290).

S. bicolor Bge. (二色匙叶草)

Uromyces limonii (DC.) Lev. (锈病) “东北”(290,313).

S. japonica Sieb. et Zucc. (日本匙叶草)

Uromyces limonii (DC.) Lev. (锈病) 河北(171).

S. sinensis Girard (匙叶草)

Uromyces limonii (DC.) Lev. (锈病) “东北”(290), 山东(63,66).

Stauntonia hexaphylla Decne. (六叶野木瓜)

Puccinia stauntoniae Tranzsch. et Diet. (锈病) 台湾(271, 290).

Stellaria aquatica Scop. (牛繁縷)*Isariopsis alborosella* (Desm.) Sacc. (角斑病) “华北”(313).*Peronospora stellariae-aquaticae* Saw. (霜霉病) 浙江(8), 台湾(292).**S. media** (L.) Cyrill. (繁縷)*Peronospora alsinearum* Casp. (霜霉病) ——(47).*P. media* Gaum. (霜霉病) 四川(150).*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).**S. sp.** (繁縷属)*Septoria paraphysoidis* Speg. (斑枯病) 遼宁(313), 河南(13).*Uromyces leptaleus* Syd. (锈病) 安徽(246).**Stellera chamaejasme** L. (狼毒)*Melampsora stellerae* Teich (锈病) 山西(340).**Stephanandra chinensis** Hance (华野珠兰)*Sphaerotheca japonica* (Salm.) Homma (白粉病) 江西(47, 208).**Stephania cepharantha** Hay (头花千金藤)*Aspergillus carbonarius* (Bain.) Thom. 台湾(360).*Phyllosticta stephaniae* Saw. 台湾(359).*Rhizopus nigricans* Ehrb. (軟腐病) 台湾(359).**S. hernandifolia** Walp. (千金藤)*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).**S. rotunda** Lour. (圓叶千金藤)*Microsphaera pseudolonicerae* (Salm.) Blumer (白粉病) 浙江(219), 江西(219).**S. sasakii** Hay.*Phyllosticta kotoensis* Saw. 台湾(360).**S. sphaerantha** Hay. (球花千金藤)*Aspergillus carbonarius* (Bain.) Thom. 台湾(360).*Rhizopus nigricans* Ehrb. (軟腐病) 台湾(359).**S. sp.** (千金藤属)*Septoria abortiva* (Ell. et Kell.) Tehon et Daniels (斑枯病) 江苏(29, 32).**Stewartia sinensis** Rehd. et Wils. (紫萼)*Phyllosticta stewartiae* Syd. 江西(364).

Stipa effusa Nakai*Puccinia stipae-sibiricae* Ito (锈病) “东北”(290).**S. extremiorientalis Hara (远东针茅)***Puccinia stipae-sibiricae* Ito (锈病) “东北”(273).**S. splendens Trin. (芨芨草)***Puccinia stipina* Tranzsch. (锈病) 河北(63, 67).**Stizolobium capitatum (Sweet) Kuntze (头花黎豆)***Uromyces mucunae* Rebenh. (锈病) 台湾(279, 290, 359).**Stranvaesia niitakayamensis Hay.***Irene stranvaesiicola* Yamam. (煤病) 台湾(381).**Streptopus ajanensis Tiling***Septoria streptopii* Miura (斑枯病) 遼宁(313).**Strobilanthes dryadum Benoist***Puccinia polliniae* Barcl. (锈病) 云南(214).**S. flaccidifolius Nees (馬藍)***Aecidium strobilanthicola* Saw. (锈病) 台湾(359).*Puccinia diclipterae* Syd. (锈病) 台湾(290).*Uromyces diclipterae* Syd. (锈病) 台湾(357).**S. flexicaulis Hay.***Puccinia strobilanthis-flexicaulis* Hirat. et Muray. (锈病)
台湾(280, 290).**Styrax benzoin Dry. (安息香)***Irene styracicola* Yamam. var. *minor* Hansf. (煤病) 貴州
(254).*Meliola kweichowensis* Hansf. (煤病) 貴州(254).**S. formosanum Mats. (台湾安息香)***Irene styracicola* Yamam. (煤病) 台湾(383).*Pucciniastrum styracinum* Hirat. (锈病) 台湾(269, 276,
289).**S. suberifolius Hook et Arn. (紅皮)***Meliola styracis* Yamam. (煤病) 台湾(385).**Sueda glauca Bge. (硷蓬)***Peronospora effusa* (Grev.) Ces. (霜霉病) 河北(173).**Swertia arisanensis Hay. (阿里山紫荆)***Uredo swertiicola* Hirat. (锈病) 台湾(290).**S. sp. (獐牙菜属)***Puccinia swertiae* Wint. (锈病) 云南(214).*Septoria swertiae* Pat. (斑枯病) 云南(333).

Symplocos decora Hance*Plenotrichum peterae* Petr. 广西(340).**S. eriobotryaefolia** Hay. (枇杷叶山矾)*Meliola symploci* Yamam. (煤病) 台湾(381).**S. ernesti** Dunn*Phaeomonostichella symploci* (Keissler) Petr. 湖南(306).**S. lucida** Sieb. et Zucc. (光叶山矾)*Meliola symplocacearum* Yamam. (煤病) 台湾(383).**S. paniculata** (Thunb.) Miq. (山矾, 山指甲)*Cercospora symploci* Saw. (叶斑病) 台湾(358).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 台湾(350).*Phleospora symploci* Saw. 台湾(360).*Phyllactinia corylea* (Pers.) Karst. (白粉病) 安徽(219).*Septoria sydowi* P. Henn. (斑枯病) 遼宁(313).**S. setchuenensis** Brand (四川山矾)*Meliola symplocicola* Yamam. var. *chinensis* Hansf. (煤病)
貴州(254).**S. theophrastaefolia** Sieb. et Zucc.*Meliola symplocicola* Yamam. (煤病) 台湾(383).**S. wilsoni** Brand*Phaeomonostichella symploci* (Keissler) Petr. 湖南(303).**S. sp.** (山矾属)*Dermatodothis javanica* Racib. 广东(32, 187).**Synaedrys amygdalifolia** (Skan) Koidz.*Irene lithocarpicola* Yamam. (煤病) 台湾(385).**S. amygdalifolia** (Skan) Koidz. f. *castanopsisifolia* (Hay.) Kudo*Irene castanopsisifoliae* Yamam. (煤病) 台湾(385).*Meliola subpellucida* Yamam. (煤病) 台湾(384).**S. brevicaudata** Koidz.*Meliola lithocarpina* Yamam. (煤病) 台湾(384).*M. ramulicola* Yamam. (煤病) 台湾(384).**S. formosana** (Hay.) Koidz. f. *dodoneaefolia* (Hay.) Kudo*Irene lithocarpicola* Yamam. (煤病) 台湾(385).**S. kawakamii** Koidz.*Meliola kawakamii* Yamam. (煤病) 台湾(384).**S. kodaihoensis** Kudo*Meliola kodaihoensis* Yamam. (煤病) 台湾(384).

Synaedrys konishii (Hay.) Koidz.*Irene konishii* Yamam. (煤病) 台湾(385).**S. lepidocarpa** Koidz.*Meliola kiraiensis* Yamam. (煤病) 台湾(384).**S. rhambocarpa** (Hay.) Kudo f. **suishoensis** (Kan. et Yamam.)*Kudo Irene lithocarpicola* Yamam. (煤病) 台湾(385).**S. shinsuiensis** (Hay. et Kan.) Kudo*Irene sinsuiensis* Yamam. (煤病) 台湾(385).**S. sp.***Irene lithocarpicola* Yamam. (煤病) 台湾(387).**Syntherisma formosana** Honda*Melampsora syntherismae* Saw. (锈病) 台湾(360).*Puccinia oahuensis* Ell. et Ev. (锈病) 台湾(279, 290).**S. ischaemum** Nash*Puccinia oahuensis* Ell. et Ev. (锈病) 台湾(279, 290).**S. sanguinalis** Dulac (馬唐)*Puccinia oahuensis* Ell. et Ev. 台湾(279, 290).**S. sanguinalis** Dulac var. **ciliaris** Honda*Balansia andropogonis* Syd. 台湾(360).*Claviceps syntherismae* Saw. (麦角病) 台湾(360).*Phyllachora syntherismae* Saw. (黑痣病) 台湾(360).*Puccinia levis* (Sacc. et Bizz.) Magn. (锈病) 台湾(290).*P. oahuensis* Ell. et Ev. (锈病) 台湾(279, 290).*Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras.
(黄化萎縮病) 台湾(287).*Tilletia pulcherrima* Ell. et Gall. (黑粉病) “东北”(371).**Synurus deltoides** (Ait.) Nakai (山牛蒡)*Puccinia tosoensis* Tokunaga et Kawai (锈病) “东北”
(290).**S. hondae** Kitagawa*Puccinia tosoensis* Tokunaga et Kawai (锈病) 安徽(65).**Syzygium samarangense** (Bl.) Merr. et Perry*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. (煤病)
台湾(387).**Tabernaemontana coronaria** R. Br.*Corticium salmonicolor* Berk. et Br. (赤衣病) 台湾(350).**Tagetes patula** L. (細叶万寿菊, 万寿菊)*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾
(350).

Tainia shimadai Hay.

Uredo tainiae Hirat. (锈病) 台湾(290).

Taraxacum albidum Dah. (大蒲公英)

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(172).

T. dens-leonis Desf.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

T. formosanum Kitam. (台湾蒲公英)

Protomyces pachydermus Thuem. 台湾(357).

Septoria miuraei Trott. (斑枯病) 台湾(359).

T. heterolepis Nakai et H. Koidz.

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 黑龙江(272), “东北”(292, 290).

T. mongolicum H.-M. (蒲公英, 蒙古蒲公英)

Bremia lactucae Regel f. *taraxaci* (Ito et Tokunaga) Ling et M. C. Tai (霜霉病) 四川(150).

Protomyces pachydermus Thuem. 四川(150).

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 吉林(313), 辽宁(313), 河北(340), 安徽(246).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 黑龙江(313), 辽宁(313), 河北(208, 315), 江苏(219).

T. officinale Web. (蒲公英)

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272), “西康”(57).

Septoria taraxacicola Miura (斑枯病) 吉林(313), “西康”(57), 河南(13).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(172, 209, 213), 江苏(201).

T. officinale Web. var. *genuinum* Koch.

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) “东北”(290).

T. sinensis H.-M.

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) 河北(218).

T. sinicum Kitagawa

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (锈病) “东北”(290).

Taraxacum sp. (蒲公英屬)

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. (= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.) (銹病) 陝西(218).

Taxus chinensis Rehd. (紅豆杉, 紫杉)

Macrophoma taxi (Berk.) Berl. et Vogl. 江苏(29, 32).

Phoma taxi (Berk.) Sacc. 江苏(103).

Tectona grandis L. (柚木)

Cercospora tectoniae Stev. (叶斑病) 台湾(357).

Cladosporium tectonae Saw. 台湾(358).

Olivea tectonae Thirum. 台湾(290, 355).

Tephrosia candida DC. (白花灰毛豆)

Ravenelia tephrosiicola Hirat. f. (銹病) 台湾(269, 290).

T. purpurea Pers. (灰叶, 紅花灰叶)

Uredo tephrosiae Rabenh. (銹病) 台湾(290, 359).

Terminalia catappa L. (杭仁树, 巴古梯斯树)

Cercospora catappae P. Henn. (叶斑病) 台湾(358, 376).

Tetragonia expansa Murr. (番杏)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Tetrapanax papyrifera C. Koch. (通草, 通脫木)

Aecidium fatsiae Syd. (銹病) 台湾(280, 290, 367).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Phaeoisariopsis tetrapanaxis Saw. 台湾(359).

Thalictrum alpinum L.

Macrosporium commune Rath. (*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh.) 云南(306).

T. aquilegifolium L.

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 黑龙江(313).

T. delavayi Franch.

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

T. minus L. (秋唐松草)

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 黑龙江(313), “东北”(313), 河北(64), 河南(13).

Tranzschelia thalictri (Chev.) Diet. (銹病) 河北(62, 218).

T. minus L. var. *elatum* LeCoyer (秋唐松草)

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (銹病) 河南(66).

T. przewalskii Max.

Aecidium urceolatum Cke. (銹病) 四川(340).

Thalictrum reticulatum Franch.*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 云南(213).**T. thunbergii** A. DC.*Puccinia rubigo-vera* (DC.) Wint. (锈病) “东北”(290).**T. sp.** (唐松草属)*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 河南(213).*Tranzschelia thalictri* (Chev.) Diet. (锈病) “热河”(317).**Thea biflora** Hay. (二花茶)*Gloeosporium theae-sinensis* Miyake (炭疽病) 江苏(47).**T. drupifera** Pierre (大茶)*Cephaleuros virescens* Kunze (藻斑病) 广西(108).**T. sinensis** L. (茶)*Capnodaria theae* Hara 福建(9, 10, 45).*Capnodium footii* Berk. et Desm. 福建(10, 45), 台湾(348, 350).*Cercospora theae* (Cav.) Breda de Haan “西康”(57), 四川(150), 广东(112), 台湾(348, 350).*Cercospora theae* Petch 云南(112), 福建(10).*Clasterosporium camelliae* Mass. “西康”(57).*Colletotrichum camelliae* Mass. (炭疽病) “西康”(57), 四川(150), 云南(112), 湖南(112), 浙江(54, 87), 福建(9, 10), 台湾(348, 350).*Corticium centrifugum* (Lev.) Bres. 浙江(87), 台湾(348, 350).*Cryptomyces theae* Saw. 台湾(350).*Exobasidium reticulatum* Ito et Saw. (网状饼病) “西康”(57), 台湾(291, 348, 350).*E. vexans* Mass. (饼病) 福建(10), 台湾(348, 350).*Fusarium javanicum* Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.) 台湾(354).*Fusicladium theae* Hara 福建(9, 10).*Gloeosporium theae-sinensis* Miyake (炭疽病) “西康”(57), 云南(111), 浙江(8, 54, 87), 福建(9, 10, 121), 台湾(345, 350).*Guignardia camelliae* (Cke.) Butl. 福建(22, 32).*G. theae* (Rac.) Bernard 台湾(348, 350).*Hendersonia theae* Hara 福建(9, 10).

Thea sinensis L. (茶)

- Macrophoma abensis* Hara 福建(9,10).
Meliola camelliae (Catt.) Sacc. (煤病) 湖南(112), 福建(9, 10, 45).
Mycosphaerella ikedai Hara 福建(9).
M. theae Hara 福建(9,10).
Neocapnodium tanakae (Shirai et Hara) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Neottiospora theae Saw. 台湾(348,350).
Pestalotzia palmorum Cke. (輪斑病) 福建(9, 10), 台湾(348,350).
P. puttemansii P. Henn. (輪斑病) 四川(75).
P. theae Saw. (輪斑病) 四川(150), 貴州(196), 浙江(87, 102), 福建(9,10,121), 台湾(348,350).
Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Phoma camelliae Cke. 台湾(348).
P. chinensis Sims. 台湾(350).
Phragmodiaporthe aculeata (Petch) Wehmeyer 福建(9, 10).
Phyllosticta theae Spesch. 四川(150), 貴州(196).
P. theicola Petch 浙江(8,87).
P. theaefolia Hara 四川(150), 云南(111,112), 浙江(8, 87), 福建(9,10,121).
Rosellinia necatrix (Hart.) Berl. (白紋羽病) 浙江(87), 福建(10).
Scorias capitata Saw. (煤病) 福建(9,10), 台湾(348,350).
Septobasidium acaciae Saw. (膏藥病) 台湾(348).
S. bogoriense Pat. (膏藥病) 浙江(8).
Septoria theaeicola Hara “西康”(57), 福建(9,10).
Triposporopsis spinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Zukalia nantoensis Saw. 福建(9,10,45), 台湾(348,350).
Z. theae Saw. 台湾(349,350).
Bacillus theae Hori et Bokura 云南(112), 福建(9,10).

Thea sinensis L. (茶)

Cephaleuros virescens Kunze (藻斑病) 浙江(54), 福建(9, 10, 121), 广东(80), 广西(108).

Cuscuta japonica Choisy (菟絲子) 浙江(87).

黑色叶脉病 (Black speck) 福建(9, 10).

疮痂病 (Scab) 福建(9, 10).

銀化病 (Silver leaf) 福建(9, 10).

T. sinensis L. var. *assamica* Pierre (普洱茶)

Pestalozzia theae Saw, (輪斑病) 台湾(350).

T. yunnanensis Pitard (云南茶)

Exobasidium gracile (Shirai) Syd. (茶餅病) 云南(306)..

Themeda gigantea (Cav.) Hack. (大菅)

Sorosporium anthistiriae (Cobb) Ling (黑粉病) 河北(153), 四川(153), 湖北(153), 湖南(153), 河南(153), 江苏(153), 浙江(153), 福建(153).

T. triandra Forsk. (菅, 黄背草)

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. (麦角病) 四川(150).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. (黑痣病) 河北(20), 河南(13).

Puccinia versicolor Diet. et Holw. (锈病) 四川(150, 214).

Sorosporium anthistiriae (Cobb) Ling (黑粉病) 河北(20, 32, 104), 四川(149, 150, 153), 湖北(153), 湖南(32, 104, 153, 306), 河南(153), 江苏(32, 104), 浙江(32, 153), 福建(153).

Sphacelotheca anthistiriae (Petch) Ling (黑粉病) 河南(153), 江苏(198).

S. anthistiriae (Petch) Ling var. *punctata* Ling (黑粉病) 四川(153), 江苏(153).

Thladiantha formosana Hay.

Cercospora thladianthae Saw. (叶斑病) 台湾(356).

Phyllosticta thladianthae Saw. 台湾(358).

Thlaspi arvense L. (蔊菜, 遏蓝菜)

Peronospora thlaspeo-arvensis Gaum. (霜霉病) 黑龙江(43a), 江苏(220)

T. japonicum Boiss.

Albugo candida (Pers.) Kuntze (白锈病) “东北”(287), 台湾(287).

- Thuja orientalis** L. (扁柏, 侧柏)
Cladosporium herbarum (Link) Fr. (黑霉病) 四川(150).
- Thyrocarpus sampsonii** Hance
Peronospora thyrocarpii Ling et M. C. Tai (霜霉病) 四川(150, 155).
- Tilia amurensis** Rupr. (阿穆尔椴树)
Phyllosticta vogelii (Syd.) Diedicke 遼宁(313).
Pucciniastrum tiliae (Miyabe) Hirat. (锈病) 吉林(268, 313).
- T. chinensis** Max. (华椴树, 中国椴)
Cercospora microspora Sacc. (叶斑病) 陝西(237).
- T. cordata** Mill. (心叶椴)
Coniothyrium tiliae Miyake “热河”(317).
- T. mandshurica** Rupr. et Max. (糠椴, 遼椴)
Pucciniastrum tiliae (Miyabe) Hirat. (锈病) ——(268).
- T. tuan** Szysz. (椴)
Pucciniastrum tiliae (Miyabe) Hirat. (锈病) 貴州(245).
- T. sp.** (椴属)
Septoria tiliae West. (斑枯病) 河南(13).
- Toddalia asiatica** Lam. (飞龙掌血)
Didymopsorella lemanensis (Doidge) Hirat. f. 台湾(290).
- Tofieldia yunnanensis** Franch.
Vermicularia tofieldiae Pat. 云南(306).
- Torilis anthriscus** Gmel. (窃衣)
Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).
- Tovaria japonica** Baker (岩菖蒲)
Macrophoma cruenta (Fr.) Ferriaris 辽宁(313).
- Trachycarpus excelsa** Wendl. (棕櫚, 樓欄)
Leptosphaeria trachycarpi Hara 四川(150).
- Trema orientalis** Bl. (山黃麻, 里白椶)
Cercospora tremae Saw. 台湾(360).
Phaeodiscula tremae Saw. 台湾(360).
Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).
Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 江西(219).
Pucciniospora tremae Saw. 台湾(355).
Spondylocladium tremae Saw. 台湾(355).
Triposporiopsis sinigera (Hoehn.) Yamam. (煤病) 台湾(387).

Trema orientalis Bl. (山黃麻, 里白梗)

Wageria tremae Saw. 台灣(360).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广东(160).

Tricyrtis formosana Baker (油点草)

Colletotrichum tricyrtii Teng (炭疽病) 台灣(360).

T. sp. (油点草属)

Colletotrichum tricyrtii Teng (炭疽病) 江苏(29, 32), 浙江(29, 32).

Trifolium fragiferum L. (草莓車軸草)

Uromyces trifolii (Hedw. f.) Lev. (銹病) 新疆(67).

T. hybridum L. (雜种車軸草)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (= *S. trifolium* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).

Stemphylium sarcinaeforme (Cav.) Wiltsh. (黑斑病) 江苏(68).

T. incarnatum L. (絳車軸草)

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).

Stemphylium sarcinaeforme (Cav.) Wiltsh. (黑斑病) 江苏(68).

T. lupinaster L. (野火球)

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 吉林(294).

Uromyces minor Schroet. (銹病) “东北”(272, 290).

T. pratense L. (紅三叶, 紅車軸草, 紅和兰翹搖, 紅荷兰翹搖)

Cercospora zebrina Pass. (叶斑病) 吉林(294).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 新疆(88).

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).

Stemphylium sarcinaeforme (Cav.) Wiltsh. (黑斑病) 江苏(68).

T. repens L. (荷兰翹搖, 白車軸草, 白三叶)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. (立枯病) 台灣(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. —(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) —(135).

Trifolium repens L. (荷兰翹搖, 白車軸草, 白三叶)*F. oxysporum* Schlecht. — (135).*Sclerotinia ciborioides* (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).*Stemphylium sarcinaeforme* (Cav.) Wiltsh. (黑斑病) 江苏(68).*Uromyces flectens* Lagh. (锈病) 新疆(67).*U. striatus* Schroet. (锈病) 云南(214).

花叶病(Mosaic) 江苏(127).

T. sp. (三叶草属)*Brachysporium trifolii* Kauff. 四川(150).*Erysiphe polygoni* DC. (白粉病) 江苏(231).

花叶病(Mosaic) 江苏(127).

Trigonella sp. (香豆属)*Sclerotinia ciborioides* (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (菌核病) 江苏(68).**Trigonotis peduncularis** Benth. (附地菜)*Aecidium eritrichii* P. Henn. (锈病) “东北”(272).*Peronospora trigonotidis* Ito et Tak. (霜霉病) 黑龙江(43a), 辽宁(43a), 四川(150).**Tripogon filiformis** Nees*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck. (黑痣病) 云南(306).**Trisetum bifidum** Ohwi (二裂三毛草)*Puccinia triseti* Erikss. (锈病) “东北”(290).**T. flavescens** (L.) Beauv. (黄三毛草)*Puccinia triseti* Erikss. (锈病) 黑龙江(313).**T. macranthum** (Hack.) Keng (大花三花草)*Puccinia triseti* Erikss. (锈病) 四川(150).**Triticum aestivum** L. (小麦)*Botrytis cinerea* Pers. (灰霉病) 四川(150).*Cladosporium herbarum* (Pers.) Link 黑龙江(294), 内蒙(372), 河北(373), 四川(85), 云南(156), 贵州(53), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128), 浙江(54).*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. (麦角病) 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).*Colletotrichum graminicolum* (Ces.) Wils. (炭疽病) 河南(13).

Triticum aestivum L. (小麦)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 福建(10).

C. gramineum Ikata et Matsuma 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).

Epicoccum tritici P. Henn. 四川(85, 150), 云南(156, 212), 贵州(53), 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42), 福建(10).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 黑龙江(60), 吉林(294, 313), 河北(83, 231), 陕西(83, 213, 231), 新疆(88), 四川(75, 85, 150, 194, 226), 云南(111, 112, 156, 212, 213), 贵州(53, 174), 湖北(84, 231), 河南(13, 83, 84), 山东(42, 83, 84, 231), 安徽(42, 83, 84), 江苏(42, 47, 83, 84, 128, 201, 202, 218, 341), 浙江(42, 54, 341), 福建(10), 广东(141, 231), 广西(37, 178), 台湾(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. culmorum (Smith) Sacc. ——(135).

F. equiseti (Corda) Sacc. ——(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw) Petch) (赤霉病) 黑龙江(294), 吉林(294), “西康”(57), 四川(73, 75, 85, 150), 云南(156, 212), 贵州(53, 174), 湖北(47, 84), 河南(13, 83), 山东(42), 安徽(42, 47, 83, 84), 江苏(42, 47, 128, 341), 浙江(42, 47, 84, 341), 福建(10, 121), 广西(178), ——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.) 四川(150), ——(135).

F. nivale (Fr.) Ces. ——(135).

F. poae (Pk.) Wr. ——(135).

F. redolens Wr. ——(135).

Gibellina cerealis Pass. (稈枯病) 河北(140), 山西(140), 河南(13).

Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke(*Cochliobolus sativus* (Ito et Kurib.) Drechsler) (根腐病) 黑龙江(169, 294), 吉林(294), 河北(168), 四川(85, 150), 云南(156), 贵州(53, 174), 山东(42, 182), 安徽(42), 江苏(42, 182), 浙江(42), 福建(10).

H. tritici-vulgaris Nishikado (黄斑病) 浙江(8).

Ophiobolus graminis Sacc. (全蚀病) 四川(91), 云南(156).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 四川(150), 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).

Triticum aestivum L. (小麦)

- Puccinia glumarum* (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 吉林(294), 内蒙(168), 河北(83, 116, 166, 168, 197, 231, 316), 陕西(7, 83, 101b, 167, 231), 甘肃(101b), 青海(101b), 新疆(88), 四川(73, 75, 85, 150, 194), 云南(111, 112, 156, 212), 贵州(53, 174), 湖南(112), 河南(13, 83, 84, 231), 山东(42, 83, 84, 101, 182, 231, 341), 安徽(42, 83, 84, 231), 江苏(42, 83, 84, 106, 128, 201, 202, 231, 341), 浙江(8, 42, 47, 49, 54, 84), 福建(10, 121), 广东(141), 广西(178).
- P. graminis* Pers. (稈锈病) 黑龙江(60, 169, 294), 吉林(294), 辽宁(294), 内蒙(168, 372), 河北(83, 166, 168, 197, 373), 陕西(83, 237), 甘肃(167), 新疆(88), 四川(75, 85, 150), 云南(111, 112, 156, 212), 贵州(53, 174), 湖北(84, 341), 河南(13, 83, 84), 山东(42, 84), 安徽(42, 83, 84), 江苏(42, 83, 128, 20, 202, 341), 浙江(8, 42, 49, 54, 84, 341), 福建(10), 广东(141, 233), 广西(37, 178), 台湾(290).
- P. rubigo-vera* (DC.) Wint. (叶锈病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294), 内蒙(168, 272), 河北(83, 168, 231, 316), 山西(319), 陕西(83), 新疆(88), 四川(73, 75, 88, 150, 194), 云南(111, 112, 156, 212), 贵州(53, 174), 湖北(84), 湖南(112), 河南(13, 83, 84), 山东(14, 42, 83, 84, 231), 安徽(42, 83, 84, 231), 江苏(42, 83, 84, 128, 201, 202, 231, 341), 浙江(8, 42, 49, 54, 84, 231, 341), 福建(10), 广西(37, 178).
- Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化萎缩病) 山东(42), 安徽(42), 江苏(42), 浙江(42).
- Septoria nodorum* Berk. (颖斑枯病) 黑龙江(294), 辽宁(294), 内蒙(372, 373), 四川(85, 150), 云南(156), 贵州(53, 174), 湖北(84), 河南(84), 山东(42), 安徽(42, 84), 江苏(42), 浙江(42, 84), 福建(10).
- S. tritici* Desm. (叶斑枯病) 黑龙江(294), 吉林(294), 云南(156), 湖北(84), 河南(231), 山东(42, 182), 安徽(42, 231), 江苏(42, 125, 128), 浙江(42, 84).
- Tilletia caries* (DC.) Tul. (网腥黑穗病) 黑龙江(153, 294, 313), 吉林(153, 294, 313), 内蒙(58, 168), 河北(153, 168), 山西(153), 陕西(153), 甘肃(153, 167), 青海(153), “西康”(153), 四川(75, 85, 149, 150, 153), 云南(153, 156, 212), 贵州(53, 174), 河南(13, 149, 153), 山东(70, 101), 安徽(84), 江苏(104, 128, 153, 220), 浙江(8, 49, 153, 220), 江西(158), 福建(10).

Triticum aestivum L. (小麦)

Tilletia foetida (Wallr.) Liro (光腥黑穗病) 黑龙江(60,104, 153,220,294),吉林(153,294),内蒙(168,372),河北(153, 168,220),山西(84,153),陕西(153),甘肃(153,167),新疆 (88),“西康”(153),四川(75,85,149,150,153),云南(153, 156),贵州(53,174),河南(13),山东(70),江苏(104,128, 153,220),浙江(49),江西(158),福建(10).

Typhula itoana Imai (雪腐病) 新疆(88).

Urocystis agropyri (Preuss) Schroet. (= *U. tritici* Koern.) (稈黑粉病) 黑龙江(153,294),内蒙(168),河北(83,116, 153,168,231,315),山西(84,231),陕西(83,153,167,231), 甘肃(231),新疆(88),四川(73,75,85,149,150,153),云南 (112,156,212),贵州(53,174,231),湖北(84,153,231),河南 (13,83,84,153,231,341),山东(14,42,83,84,101,153, 182,198,231,341),安徽(42,83,84,231,341),江苏(42,83, 84,106,128,153,201,202,231,341),浙江(8,42,49,54, 153,231,341),江西(158),福建(10).

Ustilago nuda (Jens.) Rostr. (散黑穗病) 黑龙江(60,153, 294,313),吉林(153,294,313),辽宁(153,294),内蒙(83, 168,373),“热河”(153),河北(83,116,153,166,168,197, 231),山西(84,153),陕西(83),新疆(88,153),“西康” (153),四川(73,75,84,149,150,153,194),云南(112,153, 156,212),贵州(53,174),湖北(84),湖南(112),河南(13, 83,84,149,153,231),山东(14,42,83,84,156,182,231),安 徽(42,83,84,153,231),江苏(42,83,84,106,128,153,201, 202,231,341),浙江(8,42,49,54,84,153,231,341),江西 (47,153),福建(10,121,153),广东(141,153,199,233),广 西(37,153,178),台湾(152,153).

Bacterium sp. 福建(10).

Corynebacterium tritici (Hutchinson) Burkh. (蜜穗病) 河 北(116,118,138,168),贵州(53,118),山东(42,101),安徽 (42),江苏(42,101),浙江(42).

Pseudomonas atrofaciens (McCulloch) Stev. 山东(42),安 徽(42),江苏(42,138),浙江(42).

Xanthomonas translucens (Jones, John. et Reddy) Dowson (黑穎病) 黑龙江(294),吉林(294),河北(138),河南(13).

Triticum sativum L. (小麦)

Anguillulino tritici (Steinh.) G. et B. (粒綫虫病) 黑龙江(294), 内蒙(168), 河北(51, 52, 116, 118, 166, 168, 197). 山西(52), 陝西(52, 167), 甘肅(52, 167), 青海(52), 新疆(52), “西康”(52), 四川(52, 75), 貴州(52, 53, 118), 湖北(52, 84), 湖南(52), 河南(13, 52, 84), 山东(42, 51, 52, 101, 182), 安徽(42, 51, 52, 84, 341), 江苏(42, 51, 52, 84, 128, 202, 341), 浙江(42, 49, 53, 54, 84), 江西(52), 福建(10, 52), 广东(52), 广西(52).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫虫病) 山东(95).

Meloidogyne sp. (根結綫虫病) 山东(95).

黄腹病(Yellow berry, 非侵染性病害) 福建(10).

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 河北(172), “西康”(57).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) “西康”(57), 福建(121), 台湾(350).

Puccinia graminis Pers. (稈锈病) “西康”(57).

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (叶锈病) “西康”(57).

Tilletia caries (DC.) Tul. (网腥黑穗病) “西康”(57).

T. turgidum (蓝麦, 佛手小麦)

Claviceps purpureae (Fr.) Tul. (麦角病) 内蒙(372).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) 内蒙(372), 云南(156).

Puccinia rubigo-vera (DC.) Wint. (叶锈病) 内蒙(372).

Tilletia caries (DC.) Tul. (网腥黑穗病) 云南(156).

Urocystis agropyri (Preuss.) Schroet. (= *U. tritici* Koern.) (稈黑粉病) 云南(156).

Ustilago nuda (Jens.) Rostr. (散黑穗病) 云南(156).

T. vulgare Vill. (小麦)

Erysiphe graminis DC. (白粉病) 广东(141), 台湾(354).

Fusarium graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) (赤霉病) “西康”(57).

Helminthosporium gramineum Rabh. (*Pyrenophora graminea* (Host. et Noack.) Ito et Kurib.) (条紋病) “西康”(57).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 广东(141).

Piricularia oryzae Bri. et Cav (瘟病) 台湾(350).

Triticum vulgare Vill. (小麦)

Puccinia glumarum (Schw.) Erikss. et Henn. (条锈病) 河北(62), “西康”(32, 57), 四川(32), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 江西(32, 36), 广东(141).

P. graminis Pers. (稈锈病) 黑龙江(272), 河北(62), 新疆(67), “西康”(57), 江苏(32, 36), 广东(141).

P. rubigo-vera (DC.) Wint. (叶锈病) “东北”(290), 内蒙(373), “西康”(32), 四川(32), 江苏(32, 36), 广西(32), 台湾(290).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum., Shaw et Naras. (黄化萎缩病) 台湾(287).

Septoria nodorum Berk. (颖斑枯病) 台湾(350).

S. tritici Desm. (叶斑枯病) “西康”(57).

Tilletia caries (DC.) Tul. (网腥黑穗病) “东北”(288), 内蒙(32, 104, 198), 江苏(32, 104, 198), 浙江(32, 104, 198).

T. foetida (Wallr.) Liro (光腥黑穗病), 黑龙江(32, 104, 198), 河北(20, 32, 104, 198), 江苏(32, 104, 198).

Urocystis agropyri (Preuss.) Schroet. (= *U. tritici* Koern.) (稈黑粉病) “西康”(57), 四川(32), 山东(32, 104, 198), 江苏(32, 104).

Ustilago nuda (Jens.) Rostr. (散黑穗病) 河北(20, 32, 104, 198), “西康”(32, 57), 四川(32), 河南(32, 104), 山东(32, 104), 江苏(32, 104), 浙江(32, 104), 福建(32, 104), 广东(32, 104, 141), 广西(32).

T. vulgare Vill. var. (小麦)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 广东(141).

Triumfetta bartramia L. (藕头婆)

Cercospora triumfettae Saw. 台湾(360).

Trollius chinensis Bge. (金莲花)

Septoria trollii Sacc. et Wint. (叶斑枯病) “东北”(313).

Tropaeolum majus L. (旱金莲)

Leveillula taurica (Lev.) Arn. (白粉病) 云南(213).

花叶病 (Mosaic) 四川(127).

Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast. (云南铁杉)

Chrysomyxa tsugae-yunnanensis Teng (锈病) “西康”(33).

Fomes annosus (Fr.) Cke. (赤腐病) “西康”(31).

F. pini (Thore) Karst. (红色腐朽病) “西康”(34), 云南(34).

Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast. (云南鉄杉)*F. pinicola* (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) “西康”(31).*F. robustus* Karst. (沟腐病) “西康”(31).*Polyporus schweinitzii* Fr. (紅色腐心病) “西康”(31).*P. sulfureus* (Bull.) Fr. (褐色心材腐朽病) “西康”(31).**T. sp.** (鉄杉属)*Fomes pinicola* (Sw.) Cke. (褐色腐朽病) 台湾(355).**Tulipa edulis** Baker (山慈姑)*Uromyces erythronii* (DC.) Passer (锈病) 江苏(32,36).*Ustilago heufleri* Fuck. (黑粉病) 江苏(32,104,153,220).**Tupistra sp.***Vermicularia liliacearum* West. 云南(306).**Turpinia formosana** Nakai (台湾山香园)*Irenina turpiniae* Yamam. (煤病) 台湾(383).**Typha capensis** Rohrb. (香蒲)*Septoria typhae* Saw. (斑枯病) 台湾(360).**Ulmus davidiana** Planch. (黑榆)*Stegophora aemula* Syd. 河北(366).**U. japonica** Sarg. (榆)*Phyllosticta ulmicola* Sacc. 辽宁(313).*Septoria ulmi* Hara (斑枯病) 黑龙江(313).*S. yokohawai* Hara (斑枯病) 黑龙江(313).**U. macrocarpa** Hañce (黄榆, 大果榆)*Phyllosticta ulmicola* Sacc. 吉林(313).**U. parvifolia** Jacq. (榔榆)*Gnomonia oharana* Nishikado et Matsum. 江苏(205).*G. ulmea* (Sacc.) Thuem. 陝西(237).*Uncinula clandestina* (Biv.) Schroet. (白粉病) 湖北(47),
江苏(219).*Loranthus maclurei* Merr. (榔榆寄生) 广西(160).*L. parasiticus* (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).*L. yadoriki* Sieb. (樟寄生) 广西(160).**U. pumila** L. (白榆)*Apiosporum salicium* (Pers.) Kunze 吉林(313).*Cercospora sphaeriaeformis* Cke. (= *C. ulmi* Syd.) 江苏
(364).*Gnomonia oharana* Nishikado et Matsum. 江苏(205).*G. ulmea* (Sacc.) Thuem. 江苏(231).

Ulmus pumila L. (白榆)*Melasmia ulmicola* Berk. et Curt. “东北”(313).*Phyllosticta ulmicola* Sacc. 辽宁(313).*Septoria ulmi* Hara (斑枯病) 黑龙江(60), 吉林(313), 辽宁(313).*Systemma ulmi* (Schleich.) Theiss. et Syd. “东北”(313).*Uncinula clandestina* (Biv.) Schroet. (白粉病) 吉林(313), 辽宁(313).*U. kenjiana* Homma (白粉病) 吉林(313), 河北(116, 172, 209), 河南(13, 213).**U. suberosa** (榆)*Phyllosticta bellunensis* Mart. 黑龙江(60).**U. sp.** (榆属)*Melasmia ulmicola* Berk. et Curt. 湖南(316).*Polyporus squamosus* (Huds.) Fr. (白色斑駁病) 黑龙江(60).*Rehmiella ulmicola* Miyake 湖南(315).*Septoria ulmi* Hara (斑枯病) 河南(13).*Uncinula clandestina* (Biv.) Schroet. (白粉病) 新疆(88).*U. clintoni* Peck (白粉病) 江苏(106).*U. kenjiana* Homma (白粉病) 河北(208), 江苏(219).**Uraria macrostachya** Wall.*Cercospora urariae* Saw. (叶斑病) 台湾(360).**Urena lobata** L. (野棉花)*Phaeosaccardinula javanica* (Zimm.) Yamam. (煤病) 台湾(387).**U. lobata** L. var. *tomentosa* Miq. (毛梵天花)*Aecidium urenae* Saw. (锈病) 台湾(360).*Irenopsis coronata* (Speg.) Stev. var. *triumfetae* (Stev.) Stev. (煤病) 台湾(380).*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).**Urtica angustifolia** L. var. *abbreviata* Wedd. (小丛麻)*Puccinia caricis* Relentisch (锈病) 黑龙江(313).*P. fusispora* Syd. (锈病) “东北”(290).**Valeriana dubia** Bge.*Uromyces valerianae* (Schum.) Fuck. (锈病) 黑龙江(313).

Valeriana flaccidissima Max.

Uromyces valerianae-wallichii Arthur et Cummins (锈病)
台湾(290).

Vanieria sp.

Uncinula clintonii Peck (白粉病) 广西(231).

Veratrum dolichopetalum Loesn. f. (长瓣藜蘆)

Puccinia veratri Duby (锈病) 黑龙江(272), “东北”(290).

V. nigrum L. (藜蘆)

Puccinia pachycephala Diet. (锈病) 河北(67), 山西(340),
江苏(218), 江西(218).

Uromyces veratri (DC.) Schroet. (锈病) 黑龙江(313).

V. taliense Loesn. f. (藜蘆)

Puccinia veratricola Tai (锈病) 云南(214).

V. sp. (藜蘆属)

Puccinia pachycephala Diet. (锈病) 湖南(214).

Verbena officinalis L. (馬鞭草)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Veronia patula Merr. (咸虾花)

Phakopsora elephantopodis Hirat. f. (锈病) 广东(274), 广西(274).

Uredo veroniicola Petch (锈病) 台湾(359).

Veronica anagallis L. (水苦蕒)

Peronospora aquatica Gaum. (霜霉病) 四川(150).

Veronicastrum virginicum (L.) Farwell (草本威灵仙)

Erysiphe cichoracearum DC. (白粉病) 河北(317).

Viburnum cylindricum Buch.-Ham. (水紅木)

Cercospora viburni-cylindrici Tai (叶斑病) 云南(215).

V. luzonicum Rolf. var. **formosanum** Rehd.

Irenina viburni (Syd.) Stev. (煤病) 台湾(380).

V. odoratissimum Ker. (珊瑚树)

Irenina viburni (Syd.) Stev. (煤病) 广东(231, 370).

V. opulus L.

Cercospora tineae Sacc. (叶斑病) 河北(317).

V. propinquum Hemsl. (兴山繡球)

Irenina viburni (Syd.) Stev. (煤病) 台湾(380).

V. sp. (莢蒾属)

Irene viburni (H. et P. Syd.) Stev. (煤病) 台湾(387).

Placosphaeria viburni P. Henn. 湖南(316).

Vicia amoena Fisch. (山野豌豆, 宿根巢菜)

Cylindrosporium vicii Miura 吉林(313).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 辽宁(313).

Septoria viciae West. (斑枯病) 黑龙江(313).

V. amoena Fisch. var. *oblongifolia* Regel (蘆豆苗)

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) “东北”(290).

V. cracca L. (野落秋, 广布野豌豆, 野落秋草藤)

Ascochyta viciae Lib. (褐斑病) 四川(150).

Microsphaera baeumleri Magn. (白粉病) 辽宁(282), 四川(150).

Peronospora viciae de Bary (霜霉病) 四川(150).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150).

Uromyces craccae L. (锈病) 河北(218).

U. fabae (Pers.) de Bary (锈病) “东北”(273).

U. viciae-craccae Const. (锈病) 四川(150).

V. cracca L. var. *japonica* Miq. (草藤)

Microsphaera baumleri Magn. (白粉病) 河北(171).

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) “东北”(290).

V. dasycarpa Tenore (毛果巢菜)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

V. ervilla Willd.

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

V. faba L. (蚕豆)

Ascochyta fabae Speg. (褐斑病) 江苏(128), 福建(10).

A. phaseolorum Sacc. (褐斑病) 河北(166, 197).

A. pisi Lib. (褐斑病) 江苏(133).

A. viciae Lib. (褐斑病) 四川(150).

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 云南(212), 河南(13), 江苏(128), 浙江(8, 54), 福建(10).

B. fabae Sardina 黑龙江(294), 河北(129), 四川(150), 云南(112, 212), 贵州(174), 湖南(112), 江苏(128, 133, 231), 福建(10), “各地”(129).

Cercospora cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) 江苏(106).

C. zonata Wint. (叶斑病) 黑龙江(294), 四川(150, 221), 河南(13), 江苏(128, 133, 215), 浙江(231), 福建(10), 广西(30, 32, 112), “东南”(131).

Vicia faba L. (蚕豆)

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) 江苏(126).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 云南(212), 江苏(128), 台湾(350).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 新疆(88), 云南(212, 213).

Fusarium anguioides Sherb. —(135).

F. arthrosporioides Sherb. —(135).

F. avenaceum (Fr.) Sacc. —(135).

F. avenaceum (Fr.) Sacc. var. *fabae* Yu (根干腐病) 云南(112, 137, 212).

F. concolor Reink. —(135)

F. equiseti (Corda) Sacc. var. *bullatum* (Sherb.) Wr. —(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch) —(135).

F. graminum Corda. —(135).

F. merismoides Corda. —(135).

F. orthoceras App. et Wr. —(135).

F. oxysporium Schlecht. f. *fabae* Yu et Fang (枯萎病) 云南(138), —(135).

F. redolens Wr. —(135).

F. solani (Mart.) App. et Wr. f. *fabae* Yu et Fang 云南(138), —(135).

F. vasinfectum Aik. (枯萎病) —(135).

Mycosphaerella polygoni (DC.) Saw. 黑龙江(294), 热河(294).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers 四川(150), 云南(212), 江苏(128), 福建(10).

Peronospora viciae de Bary (霜霉病) 江苏(106).

Pythium spinosum Saw. 云南(134, 135).

P. ultimum Trow. 云南(134).

Sclerotinia minor Jagger (菌核病) 四川(150).

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 四川(150), 云南(212), 江苏(128), 浙江(8, 54), 江西(158), 福建(10).

Vicia faba L. (蚕豆)

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) 黑龙江(294), 吉林(294, 313), 辽宁(294), 内蒙(372, 373), “热河”(294), 河北(63, 166, 197, 218), 山西(373), 新疆(88), “西康”(32), 四川(32, 75, 150, 194, 221), 云南(111, 112, 212), 贵州(174), 湖北(47), 湖南(112), 河南(13), 江苏(32, 36, 106, 128, 201), 浙江(47, 54), “华东”(341), 江西(32, 36), 福建(10), 广东(112, 233), 广西(32, 37, 112, 178), 台湾(290).

Pseudomonas fabae (Yu) Burk. (细菌性茎枯病) 江苏(128, 138), 福建(10).

P. viciae Uyeda 黑龙江(294).

P. sp. 云南(111).

Lycopersicon virus 3 四川(132).

花叶病 (Mosaic) 湖北(127), 安徽(127), 浙江(127), 江西(127), 湖南(127), 四川(127), 江苏(127), “华东”(341).

轻性花叶病 (Mild mosaic) 江苏(127).

簇生病 (Rosette) 江苏(127).

V. faba L. var. ascendens Mak.

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272).

V. faba L. var. equina Pers.

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

V. gigantea Bge. (大野豌豆, 薇, 薇菜)

Cercospora zonata Wint. (叶斑病) 河北(316).

Uromyces heimerlianus Magn. (锈病) 陕西(7).

V. hirsuta (L.) Gray (小巢菜)

Microsphaera baeumleri Magn. (白粉病) 四川(150).

Peronospora viciae de Bary (霜霉病) 四川(150), 江苏(68), 浙江(8).

V. kulingiana Bail.

Uromyces ervi (Opiz.) West. (锈病) 江苏(270, 364), 江西(364).

U. fabae (Pers.) de Bary (锈病) 浙江(63).

V. monantha Retz.

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 云南(213).

Vicia sativa L. (大巢菜)

Ascochyta phaseolorum Sacc. (褐斑病) 陝西(59).

A. punctata Naoum. (褐斑病) 台灣(358).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) “西康”(57), 四川(226), 雲南(213).

Peronospora viciae de Bary (霜霉病) “西康”(57), 四川(150), 雲南(212), 貴州(174), 江蘇(68, 220), 浙江(8).

Sclerotinia ciborioides (Hoffm.) Noack. (= *S. trifoliorum* Erikss.) (霜霉病) 陝西(59).

Uromyces ervi (Opiz.) West. (銹病) 江蘇(270), 台灣(280, 290, 356).

U. fabae (Pers.) de Bary (銹病) 江蘇(68).

V. sepium Linn. (野豌豆)

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (銹病) 雲南(306).

V. tetrasperma (L.) Moench. (烏喙豆, 四籽野豌豆)

Botrytis cinerea Pers. (灰霉病) 四川(150).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 雲南(213).

Uromyces ervi (Opiz.) West. (銹病) 雲南(214), 台灣(290, 356).

V. unijuga Al. Br. (歪頭菜)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 黑龍江(313), 河北(209).

Microsphaera viciae-unijugae Homma (白粉病) 台灣(283).

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (銹病) 河北(218), 江西(246).

U. heimerlianus Magn. (銹病) 河北(63), 山東(66, 340).

U. orobi Lev. (銹病) “東北”(290), 遼寧(313).

V. villosa Roth. (柔毛野豌豆, 毛巢菜, 蘇聯毛巢菜)

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 雲南(213).

V. sp. (巢菜屬)

Cylindrosporium vicii Miura 吉林(294), “西康”(57).

Erysiphe polygoni DC. (白粉病) 河南(13), 安徽(219).

Microsphaera baumleri Magn. (白粉病) 吉林(294), 遼寧(294).

Septoria viciae West. (斑枯病) 黑龍江(294).

Uromyces fabae (Pers.) de Bary (銹病) 廣西(246).

U. phaseoli (Pers.) Wint. *typica* Arthur (銹病) 貴州(246).

Vigna lutea Gray

Uromyces vignae Barclay (= *U. phaseoli-vignae* (Barcl.) Arthur) (锈病) 台湾(290).

V. luteola Benth.

Phyllachora phaseolina Syd. (黑痣病) 台湾(359).

V. sinensis Endl. (豇豆)

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. var. *phaseoli* Brun. (黑斑病) 山东(182).

Ascochyta phaseolorum Sacc. (褐斑病) 四川(33), 福建(10).

Cercospora canescens Ell. et Mart. (叶斑病) 四川(194), 云南(112, 212, 215), 湖北(231), 湖南(112), 河南(231), 江苏(128), 浙江(231), 广西(30, 32, 215).

C. columnaris Ell. et Ev. (= *Isariopsis griseola* Sacc.) (角斑病) “热河”(345), 江苏(128).

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella cruenta* (Sacc.) Lath.) (叶斑病) “热河”(345), 河北(116), 四川(75, 215), 云南(112, 212, 15), 湖南(112), 河南(13), 福建(10, 113), 广东(125).

C. dolichi Ell. et Ev. (= *C. vignae-sinensis* Tai et Wei) 内蒙(321), 河北(51, 321), “华北”(258), 四川(221), 云南(112), 湖北(239), 湖南(112), 山东(51), 安徽(51), 江苏(51), 广西(112).

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella lindermuthianum* (Sacc. et Magn.) Shear et Wood) (炭疽病) “热河”(345), “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Erysiphe pisi DC. (白粉病) 山东(321).

E. polygoni DC. (白粉病) 江苏(128).

Helminthosporium vignicolum (Kawamura) Tai 四川(150), 湖南(112), 江苏(231), 浙江(231), 广东(112), 广西(30, 32), ——(69).

Macrophoma mame Hara 四川(75).

Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby (茎腐病) 江苏(19).

Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (立枯病) 四川(150), 江苏(128).

Vigna sinensis Endl. (豇豆)

P. sasakii (Shirai) Ito 台湾(347,350).

Phakopsora pachyrhizi Syd. (锈病) “华南”(342).

Phyllosticta phaseolina Sacc. 黑龙江(60), “热河”(345), 四川(75,150), 云南(112,212), 贵州(174), 湖南(112), 河南(13), 福建(10).

Septoria dolichii B. et C. (斑枯病) 河南(13).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 河北(209), 四川(150).

Uromyces vignae Barcl., (= *U. phaseoli-vignae* (Barcl.) Arthur) (锈病) 黑龙江(272), “东北”(272,290), 河北(20,32,36,116,168), 陕西(16), 四川(75,150), 云南(112,212), 贵州(246), 湖南(32,36,112), 河南(13), 江苏(32,36,128), “华东”(341), 江西(246), 福建(10,32,36), 广西(32,37,112), 台湾(290).

U. vignae-sinensis Miura (锈病) 吉林(313), 山西(319), 山东(321).

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dowson (细菌性疫病) “热河”(345).

X. vignicola Burkh. 江苏(138).

Cucumis virus 1 (花叶病) “各地”(130).

花叶病 (Mosaic) 河南(13), 安徽(127), 江苏(127), 浙江(127), “华东”(341), 江西(127).

皱缩花叶病 (Crinka mosaic) 福建(10).

丛枝病 (Witches' broom) 河南(13).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 广东(100).

V. sinensis Endl. var. *catiung* Nakai (小豇豆)

Cercospora dolichii Ell. et Ev. (叶斑病) 台湾(358,376).

V. vexillata Bench.

Uromyces vignae Barclay (= *U. phaseoli-vignae* (Barcl.) Arthur) (锈病) 安徽(246).

V. sp. (豇豆属)

Uromyces vignae Barclay (= *U. phaseoli-vignae* (Barcl.) Arthur) (锈病) 安徽(246), 广东(274).

Vinca rosea L. (常春花)

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Viola odorata L. (香堇菜)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

V. patrinii DC. (白花地丁)

Puccinia violae (Schum.) DC. (锈病) 四川(150,214).

Septoria violae West (斑枯病) 河北(315).

V. patrinii DC. var. chinensis Ging. (紫花地丁)

Puccinia violae (Schum.) DC. (锈病) 河北(166).

V. philippica Cav. subsp. malesica W. Becker

Cercospora granuliformis Ell. et Holw. (叶斑病) 四川(150).

C. violae Sacc. (叶斑病) 四川(150).

V. sp. (堇菜属)

Alternaria violae Gallow. et Dors. (黑斑病) 河南(13).

Cercospora granuliformis Ell. et Holw. (叶斑病) 四川(215).

C. violae Sacc. (叶斑病) 四川(215), 河南(13).

Puccinia violae (Schw.) DC. (锈病) 辽宁(313), 河北(197), “西康”(57), 贵州(246), 河南(13), 安徽(246), 浙江(62), 广西(246).

Uredo alpestris Schroet. (锈病) 贵州(246).

U. iyoensis Hirat. f. et Yosh. (锈病) 贵州(246).

花叶病 (Mosaic) 河南(13).

Meloidogyne sp. (根结线虫病) 广东(100).

Vitex negundo L. (黄荆)

Cercospora viticis Ell. et Ev. (叶斑病) 河南(13), 台湾(360).

Pucciniastrum clemensiae Arthur et Cummins (锈病) 台湾(271,289).

Ramularia viticis Syd. 台湾(360).

V. trifolia L. (蔓荆)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Vitis amurensis Rupr. (阿穆尔葡萄)

Cercospora viticola (Ces.) Sacc. (= *Isariopsis clavispora* Sacc.) (角斑病) 吉林(313), 辽宁(294).

Coniothyrium diploidiella (Speg.) Sacc. (白腐病) 辽宁(294).

Vitis amurensis Rupr. (阿穆尔葡萄)

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 辽宁(294).

Guignardia bidwelli (Ell.) Viala et Rav. (黑腐病) 辽宁(294).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 吉林(294, 313), 辽宁(294).

Sphaceloma ampelinum de Bary (*Elsinoe ampelina* (de Bary) Shear) (黑痘病) 黑龙江(294), 辽宁(294).

Uncinula necator (Schw.) Burr. (白粉病) 吉林(313).

Eriophyes vitis Nal. (毛毡病) 辽宁(294).

V. betulifolia Diels et Gilg. (荆条)

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 四川(150, 214).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 四川(150).

V. flexuosa Thunb. (葛藟)

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

V. heterophylla Thunb. (蛇葡萄)

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. (白粉病) 台湾(350).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 四川(150).

V. labrusca L (美国葡萄)

Cercospora viticola (Ces.) Sacc. (= *Isariopsis clavisporea* Sacc.) (角斑病) 辽宁(294), 河北(222).

Coniothyrium diplodiella (Speg.) Sacc. (白腐病) 辽宁(294).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 辽宁(294).

Guignardia bidwelli (Ell.) Viala et Rav. (黑腐病) 辽宁(294).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 辽宁(294), “东北”(287), 台湾(287).

Sphaceloma ampelinum de Bary (*Elsinoe ampelina* (de Bary) Shear) (黑痘病) 黑龙江(294), 辽宁(294), 河北(222).

Eriophyes vitis Nal. (毛毡病) 辽宁(294).

Vitis pentagona Diels et Gilg.

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 貴州(245).

V. thunbergii Sieb. et Zucc. (蔓莖)

Cercospora truncata Ell. et Ev. (叶斑病) 四川(150,215).

V. thunbergii Sieb. et Zucc. var. *sinuata* Rehd. (小叶蔓莖)

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

V. thunbergii Sieb. et Zucc. var. *typica* Mak.

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) “东北”(287), 台湾(287).

V. vinifera L. (葡萄)

Alternaria viticola P. Brum. (黑斑病) 河北(374), 山东(374).

Cercospora roesleri (Catt.) Sacc. (叶斑病) 河北(321), “华北”(258), 山东(374).

C. viticola (Ces.) Sacc. (= *Isariopsis clavispora* Sacc.) (角斑病) 辽宁(96,294,313), 河北(47,116,166,168,222,315,321), “西康”(57), 四川(150,194,221), 云南(212,215), 湖北(315), 河南(13,168), 山东(11,14,321), 江苏(29,32,106,128,231), 浙江(49), 广东(79,233), 广西(351).

Colletotrichum ampelinum Cav. (炭疽病) 河北(321), 云南(111).

Coniothyrium diplodiella (Speg.) Sacc. (白腐病) 辽宁(96,294), 内蒙(372), 河北(116,168,222,321,372,373), 山东(11,321).

C. vitivora Miura 辽宁(313), “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 河北(116), 台湾(350).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 河南(374).

F. lateritium Nees (*Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc.) 辽宁(96).

Fusicoccum viticolum Red. (*Cryptosporella viticola* (Red.) Shear) (蔓割病) 内蒙(372), 河北(116,373), 河南(13), 山东(321), 江苏(29,32).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 辽宁(294), 河北(116,222), 山东(11,14,321), 江苏(128), 福建(10).

Vitis vinifera L. (葡萄)

Guignardia baccae (Cav.) Jacz. (房枯病) 河北(321), 山东(321).

G. bidwelli (Ell.) Viala et Rav. (黑腐病) 辽宁(96, 294, 313), 河北(166, 197), 四川(150), 河南(13), 山东(11, 47), 江苏(106, 128).

Marssonina viticola Miyake (褐斑病) 湖北(316).

Monochaetia uniseta (Tracy et Earle) Sacc. 四川(150), 江苏(102).

Pestalozzia uvicola Speg. (輪斑病) 四川(150).

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 陕西(7, 168), 甘肃(214), “西康”(57), 云南(111, 112, 212, 214), 山东(11), 江苏(201), 广东(79, 274), 台湾(265, 289).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 黑龙江(43a), 吉林(313), 辽宁(43a, 96, 294, 313), “东北”(287), 河北(166, 222, 372), “西康”(57), 四川(150), 云南(212), 河南(13), 山东(11, 220), 江苏(106, 128, 201, 220), 浙江(49), 福建(10, 183), 广东(79, 220), 广西(178), 台湾(287, 360).

Rhizopus nigricans Ehrb. (軟腐病) 四川(91).

Sphaceloma ampelinum de Bary (*Elsinoe ampelina* (de Bary) Shear) (黑痘病) 黑龙江(294, 313), 辽宁(96, 294), 河北(116, 119, 222, 321, 372), 山西(321), 陕西(168), “西康”(57), 云南(112, 119, 212), 河南(13), 山东(11, 51, 119, 321), 江苏(106, 119, 128), “华东”(341), 台湾(358).

Sphaeropsis ampelos (Schw.) Cke. 江苏(29, 32).

Trichothecium roseum (Bull.) Link. (果腐病) 四川(91).

Uncinula necator (Schw.) Burr. (白粉病) “西康”(57), 云南(112, 212, 213), 贵州(174), 江苏(106, 128), 台湾(350).

Eriophyes vitis Nal. (毛毡病) 辽宁(96, 294), 河北(222, 321), 山东(10, 321).

V. sp. (葡萄属)

Cercospora roesleri (Catt.) Sacc. (叶斑病) 山东(51).

C. viticola (Ces.) Sacc. (= *Isariopsis clavisporea* Sacc.) (角斑病) 河北(51), 四川(75), 山东(51), 广东(231), “华南”(342).

Fusicoccum viticolum Red. 河北(51).

Glomerella cingulata (Stonem.) Schr. et Spauld. (苦腐病) 河北(51), 四川(75), 山东(51).

Vitis sp. (葡萄属)

Guignardia baccae (Cav.) Jacz. (房枯病) 河北(51).

Phakopsora ampelopsidis Diet. et Syd. (锈病) 安徽(245), 广西(245).

Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni (霜霉病) 四川(75), 湖南(315).

Septoria ampelina Berk. et Curt. (斑枯病) “热河”(317).

Sphaceloma ampelinum de Bary (*Elsinoe ampelina* (de Bary) Shear) (黑痘病) 四川(75), 山东(51).

Uncinula necator (Schw.) Burr. (白粉病) 安徽(231).

Eriophyes vitis Nal. (毛毡病) 河北(51), 山东(51).

Wahlenbergia marginata A. DC. (兰花参, 细叶沙参)

Coleosporium campanulae (Pers.) Lev. (锈病) 云南(214), 台湾(289).

Wendlandia glabrata

Phaeosaccardinula javanica (Zimm.) Yamam (煤病) 台湾(387).

Wikstroemia indica C. A. Mey. (南岭蕘花)

Heterosporium wikstroemiae Saw. 台湾(360).

Melampsora yoshinagai P. Henn. (锈病) 广东(274, 370), 台湾(269, 280, 289).

Phyllosticta wikstroemiae Saw. 台湾(360).

W. sp. (蕘花属)

Melampsora yoshinagai P. Henn. (锈病) 湖南(32, 36).

Wistaria floribunda

Coniothyrium kraunhiae Miyake 河北(315).

W. sinensis Sweet (紫藤)

Trichothecium roseum (Bull.) Link 河北(20).

W. sp. (紫藤属)

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Xanthium strumarium L. (藜耳)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (菌核病) 台湾(350).

Septoria xanthiicola Saw. (斑枯病) 台湾(358).

Xylosma congestum (Lour.) Merr. (柞木)

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Elytranthe fordii (Hance) Merr. (枫寄生) 广西(160).

Loranthus chinensis DC. (松寄生) 广西(160).

L. parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Yucca filamentosa L. (絲兰)

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. 河南(13), 江苏(29, 32).

Zanthoxylum acanthopodium DC. (岩椒)

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 云南(214).

Z. ailanthoides Sieb. et Zucc. (食茱萸)

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 台湾(277, 289, 368).

Z. alatum Roxb. (竹叶椒, 狗屎椒)

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 云南(212, 214), 贵州(231), 湖南(214), 河南(13), 江苏(364), 台湾(289).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Z. alatum Roxb. var. planispinum Rehd. et Wils. (小叶狗屎椒, 花椒)

Aecidium xanthoxyli-schinifolii Diet. (锈病) 浙江(32, 36).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).

Z. piperitum DC. (花椒, 秦椒, 山椒)

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 陕西(7), 河南(13).

Z. simulans Hance (花椒)

Aecidium xanthoxyli-schinifolii Diet. (锈病) 江苏(47).

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 河北(64, 116), 贵州(231), 江苏(231).

Septobasidium bogoriense Pat. (膏药病) 四川(150).

Z. sp.

Coleosporium xanthoxyli Diet. (锈病) 贵州(245), 湖南(231), 安徽(32, 36), 江苏(32, 36), 浙江(32, 36), 江西(231), 广西(231).

Rhytidhysterium scortechinii Sacc. et Berl. 贵州(231).

Cuscuta japonica Choisy (菟丝子) 浙江(165).

Zea mays L. (玉蜀黍)

Cladosporium herbarum (Pers.) Link “西康”(57).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台湾(350).

Diplodia frumenti Ell. et Ev. (干腐病) 山西(140b).

D. macrospora Earle (干腐病) 四川(140b), 云南(140b), 贵州(140b), 广东(140b).

D. zeae (Schw.) Lev. (干腐病) 辽宁(86, 140b), 山西(140b), 四川(91, 140b), 云南(140b, 212), 湖北(140b), 广东(140a, 140b).

Zea mays L. (玉蜀黍)

Epicoccum neglectum Desm. 四川(150).

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. ——(135).

F. culmorum (Smith) Sacc. ——(135).

F. diversisporum Sherb. ——(135).

F. graminearum Schw. (*Gibberella zeae* (Schw.) Petch)
(赤霉病) 江苏(128), ——(135).

F. moniliforme Sheld. (*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.)
河南(13), 台湾(357), ——(135).

F. poae (Pk.) Wr. ——(135).

Helminthosporium maydis Nishikado (*Cochliobolus heterostrophus* Drechsler) (小斑病) 吉林(294), 辽宁(294),
内蒙(372), “热河”(294, 345), 河北(374), 四川(33, 75, 150,
194), 云南(112, 212), 湖南(112), 河南(13), 江苏(128), 浙
江(49), 福建(10), 广东(112), 广西(30, 32, 37).

H. turcicum Pass. (大斑病) 黑龙江(60, 294), 吉林(294), 辽
宁(294), “热河”(294, 345), 河北(51, 116, 212, 374), 山西
(319), “西康”(57), 四川(75, 150), 云南(212), 贵州(174),
湖南(112), 河南(13), 山东(51, 321), 安徽(51), 江苏(51,
106, 128), 福建(10), 广东(233), 广西(30, 32, 37), 台湾
(350), “华南”(342).

Mycosphaerella maydis (Pass.) Lindau 辽宁(294), 河南
(13).

Pellicularia sasakii (Shirai) Ito 黑龙江(294).

Physoderma maydis Miyabe (褐斑病) 河北(116, 231), “西
康”(57), 四川(75, 150), 云南(212), 贵州(196), 河南(13),
山东(341), 江苏(106, 128, 341), 广东(112, 233), 广西(178).

Plenophysa mirabilis Syd. 广东(370).

Puccinia sorghi Schw. (锈病) 辽宁(294), “热河”(294,
345), 陕西(7, 168, 218), 甘肃(214), “西康”(32), 四川(75,
150), 云南(111, 112, 212), 贵州(174), 广西(178, 246), 台湾
(290, 359).

Pythium deBaryanum Hesse (猝倒病) 吉林(294, 313).

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum. Shaw et Naras.
(黄化萎缩病) 台湾(287).

Sclerospora sacchari Miyake 台湾(287, 350).

Zea mays L. (玉蜀黍)

Sphaerellotheca reilianum (Kuehn.) Clint. (絲黑穗病) 黑龍江(153), 吉林(153, 294), 遼寧(153), “東北”(32, 104), “熱河”(153, 345), 河北(32, 104, 116, 153, 374), 山西(32, 104, 153), 新疆(88), “西康”(149, 153), 四川(32, 75, 150, 153), 貴州(149, 153), 河南(13, 149, 153), 江蘇(32, 104, 128, 153), 浙江(153), 台灣(153).

Ustilaginoides virens (Cke.) Tak. (麴病) 四川(75, 150), 湖南(112).

Ustilago maydis (DC.) Corda (黑粉病) 黑龍江(60, 153, 294), 吉林(153, 313), 遼寧(153, 294), “東北”(288), 內蒙(153, 372, 373), “熱河”(153, 294, 345), 河北(20, 32, 47, 51, 104, 116, 153, 166, 171, 197, 198, 231, 374), 山西(1, 153, 319, 321), 新疆(88), “西康”(32, 57, 153), 四川(32, 75, 104, 150, 153, 194), 雲南(212), 貴州(174, 196, 231), 湖北(32, 104, 153), 河南(13, 32, 104, 153), 山東(14), 安徽(51), 江蘇(32, 51, 104, 106, 128, 153, 201), 浙江(49, 153), “華東”(341), 福建(153), 廣西(178).

Bacterium stewartii Smith 河南(13).

B. zeae Comes. 河北(197).

Pseudomonas andropogoni (Smith) Stapp. 台灣(331).

Zea virus 1 “西康”(57).

Zea virus 2 “西康”(57), 湖南(127).

花葉病 (Mosaic) 湖南(127), 廣東(82).

Heterodera schachtii A. Schmidt. (根綫蟲病) 山東(95).

Meloidogyne sp. (根結綫蟲病) 山東(95).

Zelkova serrata Mak. (樺)

Uncinula clintonii Peck (白粉病) 江蘇(201, 208).

Zephyranthes candida Herb. (白菖蒲蓮)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Zingiber mioga Rosc.

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Z. officinale Rosc. (薑)

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Xanthomonas zingiberi (Uyeda) Savulescu 浙江(138).

Zinnia elegans L. (百日草, 火球花)

Cercospora zinniae Ell. et Mart. 四川(150), 雲南(215).

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. 台灣(350).

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Poll. (白粉病) 江蘇(208).

Zizania caduciflora H.-M. (菰, 茭白)*Pellicularia sasakii* (Shirai) Ito 台湾(350).*Uromyces coronatus* Miyabe et Nishida (锈病) 四川(75, 150, 214), 湖北(47), 湖南(112), 安徽(47), 浙江(32, 36, 66), 福建(32, 36), 广西(32, 112), 台湾(290).*Yenia esculenta* (P. Henn.) Liou (= *Ustilago esculenta* P. Henn.) (黑粉病) 河北(20, 32, 104, 153, 315), “西康”(57), 四川(32, 149, 150, 153), 云南(112, 212), 湖南(112, 153, 315), 河南(13, 149, 153), 江苏(32, 104, 106, 128, 153, 201), 浙江(32, 153, 198), 福建(10, 32, 153), 广东(32, 104, 112, 153, 199, 233), 广西(32, 112, 153), 台湾(152, 153, 288), ——(69).**Z. sp.** (菰属)*Uromyces coronatus* Miyabe et Nishida (锈病) 贵州(246), 安徽(246), 广西(246).**Zizyphus sativa** Gaertn. (枣)*Ascochyta zizyphi* Hara (褐斑病) 云南(212).*Aspergillus niger* van Tiegh. 四川(150).*Coniothyrium olivaceum* Bon. (白腐病) 河南(13).*Haplosporella ailanthi* Ell. et Ev. 河北(20).*Neocapnodium tanakae* (Shirai et Hara) Yamam. 台湾(387).*Phakopsora zizyphi-vulgaris* (P. Henn.) Diet. (锈病) 辽宁(294), “东北”(272), 河北(20, 32, 36, 64, 166, 197, 222), “西康”(57), 四川(150), 云南(212, 214), 贵州(245), 湖北(231), 河南(13), 山东(11), 安徽(47, 231, 245), 江苏(32, 36, 47, 106, 128, 201, 231), 福建(10), 台湾(289).*Rhizopus nigricans* Ehrb. (软腐病) 四川(150).*Trichoderma viride* Tul. 四川(150).

丛枝病 (Witches' broom) 山西(319), 河南(13).

Loranthus parasiticus (Linn.) Merr. (桑寄生) 广西(160).**Z. sativa** Gaertn. var. *inermis* (Bge.) Rehd. (无刺枣)*Phakopsora zizyphi-vulgaris* (P. Henn.) Diet. (锈病) 河北(64, 116), 贵州(245), 台湾(265, 280).**Z. sativa** Gaertn. var. *sinensis* Rehd. (红枣)*Phakopsora zizyphi-vulgaris* (P. Henn.) Diet. (锈病) 河北(116)

Zizyphus sativa Gaertn. var. **spinosa** Bge. (酸枣)

Phakopsora zizyphi-vulgaris (P. Henn.) Diet. (锈病) 山东(66).

丛枝病(Witches' broom) 河南(13).

Z. spinosus Hu (棘)

Phakopsora zizyphi-vulgaris (P. Henn.) Diet. (锈病) “东北”(289), 江苏(231).

Z. sp. (枣属)

Phakopsora zizyphi-vulgaris (P. Henn.) Diet. (锈病) 山东(51), 江苏(201), 广西(245).

Zoysia matrella (L.) Merr. (结缕草)

Puccinia zoysiae Diet. (锈病) 黑龙江(313), 辽宁(313), “东北”(290), 山东(66), 台湾(290).

病 原 索 引



眞 菌

- Acanthostigma** IIII Keissler
Lilium cathayanum Wils.
L. cordifolium
- Achlya prolifera** (Nees) de Bary
Oryza sativa L.
- Acremoniella** sp.
Oryza sativa L.
- Acrocylindrium oryzae** Saw.
Oryza sativa L.
- Acrothecium rubi** Saw.
Rubus duplicatus Duthie
- Actinonema rosae** (Lib.) Fr.
- Aecidium acanthopanacis** Diet.
Acanthopanax spinosus Miq.
- A. adenophræ** Jacz.
Adenophora sp.
- A. akebiae** P. Henn.
Akebia quinata Decne.
A. trifoliata (Thunb.) Koidz.
- A. alaterni** Maire
Rhamnus sp.
- A. anningerse** Tai
Sophora viciifolia Hance
- A. araliae** Saw.
Aralia chinensis L.
- A. blumeae** P. Henn.
Blumea balsamifera DC.
- A. callistephi** Miyake
Callistephus chinensis Nees.
- A. campylotropidis** Tai
Campylotropis polyantha
 (Franch.) Schindl.
- A. cardui** Syd.
Carduus acanthoides L.
- A. caulophylli** Komar.
Leontice robustum (Max.)
 Deils
- A. clerodendri** P. Henn.
Clerodendron cyrtophyllum
 Turcz.
C. fragrans Vent.
C. paniculatum L.
C. trichotomum Thunb.
- A. cunninghamianum** Barcl.
Cotoneaster morrisonensis
 Hay.
- A. dispori** Diet.
Polygonatum sp.
- A. elaeagni** Diet.
Elaeagnus angustifolia Linn.
E. glabra Thunb.
E. oldhami Max.
E. pungens Thunb.
E. sp.
- A. elaeagni-nmbellatae** Diet.
Elaeagnus multiflora Thunb.
E. sp.
- A. enkianthi** Diet.
Enkianthus chinensis Franch.
- A. eritrichii** P. Henn.
Trigonotis peduncularis Benth.
- A. euphorbiae** Geml.
Euphorbia pekinensis Rupr.
- A. fatsiae** Syd.
Tetrapanax papyrifera C.
 Koch.
- A. fraxini-bungeanae** Diet.
Chionanthus retusus Lindl.
Fraxinus chinensis Roxb.
F. chinensis Roxb. var. *rhynchophylla* Hemsl.
F. sp.
- A. girardiniae** Syd.
Girardinia sp.
- A. hamamelidis** Diet.
Corylopsis platypetala Rehd. et
 Wils.
C. veitchiana Bean.
Hamamelia mollis Oliv.
- A. hydrangeae** Pat.
Hydrangea strigosa Rehd.
- A. hydrangiicola** P. Henn.
Hydrangea angustipetala Hay.
H. longifolia Hay.
H. umbellata Rehd.
- A. kaernbachii** P. Henn.
Ipomoea sp.
- A. klugkistianum** Diet.
Ligustrum ibota Sieb.
L. lucidum Ait.
L. quihoui Carr.
L. sinense Lour.
L. sp.
- A. ligustriicola** Cummins
Ligustrum sp.

- Aecidium machilli** P. Henn.
Machilus arisanensis Hay.
M. bournei Hemsl.
M. kusanoi Hay.
M. pseudo-longifolia Hay.
M. thunbergii Sieb. et Zucc.
M. thunbergii Sieb. et Zucc.
 var. *kwashotensis* Yamam.
M. zuihoensis Hay.
- A. machilli** P. Henn.
Machilus sp.
Phoebe formosana Hay.
- A. meliosmae** Keissler
Meliosma kirkii Hemsl. et
 Wils.
M. stewardii Merr.
- A. meliosmae-myrianthae** P.
Henn. et Shirai
Meliosma myriantha Sieb. et
 Zucc.
M. parviflora le Comte
M. sp.
- A. meliosmae-pungentis** P. Henn.
et Shirai
Meliosma cuneifolia Franch.
- A. mori** Barcl.
Broussonetia kazinoki Sieb.
Morus acidosa Griff.
M. alba L.
M. latifolia Bur.
M. sp.
- A. nittakense** Hirat.
Berberis morrisonensis Hay.
- A. orbiculare** Barcl.
Clematis gouriana Roxb.
C. henryi Oliv. var.
 coptophylla Hay.
C. morii Hay.
C. sp.
- A. osmanthi** Syd. et Butl.
Osmanthus asiaticus Nak.
O. fragrans Lour.
- A. paeoniae** Komar.
Paeonia albiflora Pallas
- A. phyllanthi** P. Henn.
Phyllanthus flexuosus Muell.-
 Arg.
P. sp.
- A. plectranthi** Barcl.
Plectranthus glaucocalyx Max.
- A. polygoni-cuspidati** Diet.
Polygonum cuspidatum Sieb.
 et Zucc.
P. sp.
- A. pulsatillae** Tranzsch.
Anemone vitifolia Buch-Ham.
Pulsatilla sp.
- A. quinatum** Syd.
Elaeagus lanceolata Warb.
 subsp. *grandifolia* Serg.
- A. raphiolepidis** Syd.
Raphiolepis indica Lindl.
- A. rubiae** Diet.
Rubia cordifolia L.
- A. sageretiae** P. Henn.
Sageretia pycnophylla
 Schneid.
S. sp.
- A. scutellariae-indicae** Diet.
Scutellaria sp.
- A. semiaquilegiae** Diet.
Semiaquilegia adoxoides (DC.)
 Mak.
- A. shansiense** Petr.
Sedum aizoon L.
- A. smilacis** Schw.
Smilax china L.
S. sp.
- A. smilacis-chinae** Saw.
Smilax china L.
- A. staphyleae** Miura
Staphylea bumalda DC.
- A. strobilanthicola** Saw.
Strobilanthes flaccidifolius
 Nees
- A. urceolatum** Cke.
Thallectrum przewalskii Max.
- A. urenae** Saw.
Urena lobata L. var. *tomentosa*
 Miq.
- A. xanthoxyli-schinfolii** Diet.
Zanthoxylum alatum Roxb.
 var. *planisponum* Rehd. et
 Wils.
- A. simulans** Hance
Aegerita webberi Fawcett
 Laurus sp.
 Machilus sp.
- Althaloderma clavatisporum** Syd.
Psidium guayava L.

Albugo achyranthis (P. Henn.)

Miyabe

Achyranthes bidentata Bl.*A. japonica* Nakai*A. obtusifolia* Lamb.**A. bliti** (Biv.) Kuntze.*Alternanthera sessilis* R. Br.*Amaranthus blitum* L.*A. blitum* L. var. *oleraceus*

Hook f.

A. caudatus L.*A. inamoenus* Wild. f. *viridis*

Mak.

A. mangostanus L.*A. paniculatus* L.*A. spinosus* L.*A. tricolor* L.*A. viridis* L.*A. sp.***A. bliti** (Biv.) Kuntze. f.**achyranthis** P. Henn.*Achyranthes aspera* L.*A. bidentata* Bl.**A. candida** (Pers.) Kuntze.**Brassica albo-glabra* Bailey*B. campestris* L.*B. campestris* L. var. *napo-brassica* DC.*B. campestris* L. var. *oleifera* Diels.*B. campestris* L. var. *purpuraria* Bailey*B. cernua* Thunb.*B. chinensis* L.*B. chinensis* L. var.*B. juncea* L.*B. juncea* L. var. *thumida* Tsen et Lee*B. napiformis* Bailey*B. napus* L.*B. oleracea* L.*B. oleracea* L. var. *capitata* L.*B. pekinensis* Rupr.*B. rapa* L.*B. sp.**Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.*C. bursa-pastoris* (L.) Medik. var. *auriculata* Mak.*C. bursa-pastoris* (L.) Medik. var. *pinnata* Mak.*Cardamine flexuosa* With.*Draba nemorosa* L. var. *hebecarpa* Ledeb.*Erysium chiiranthoides* L. var. *japonicum* Boiss.**A. candida** (Pers.) Kuntze.*Nasturtium palustis* (Leyss.) Bess.*Raphanus sativus* L.*Sisymbrium officinale* Scop.*Thlaspi japonicum* Boiss.**A. ipomoeae-aquaticae** Saw.*Ipomoea aquatica* Forsk.**A. ipomoeae-panduranae** (Schw.)

Sw.

Ipomoea aquatica Forsk.*I. batatas* (L.) Poir.*I. hederacea* Jacq.*I. reptans* (Linn.) Poir.*Pharbitis hederacea* Choisy**A. macrospora** (Togashi) S. Ito*Brassica cernua* Thunb.*B. chinensis* L.*B. chinensis* L. var. *amplexicaulis* Makino*B. chinensis* L. var. *komatsuna* Mats. et Nakai*B. chinensis* L. var. *oleifera* Makino*B. japonica* Sieb.*B. juncea* L.*B. oleracea* L.*B. pekinensis* Rupr.*B. pekinensis* Rupr. var. *dentata* Max.*B. rapa* L.*Raphanus sativus* L.**A. macrospora** (Togashi) Ito*R. sativus* L. var. *macropodus* Mak.**A. portulacae** (DC.) Kuntze.*Portulaca oleracea* L.**A. tragopogonis** (Pers.) Gray*Carpesium abrotanoides* L.var. *thunbergianum* Mak.*Chrysanthemum* sp*Cinnamomum* sp.

* *Brassica*, *Capsella* 和 *Raphanus* 上的菌应为 *A. macrospora* (Togashi) Ito.

- Albugo tragopogonis** (Pers.) Gray
Cirsium arvensis Scop.
C. arvensis Scop. var. *Setosum* Ledeb.
C. japonicum DC.
C. segetum Bge.
Gnaphalium japonicum Thunb.
G. luteo-album L.
G. luteo-album L. var. *multiceps* Hook f.
G. multiceps Wall.
Inula britannica L.
I. japonica Thunb.
I. salicina L.
I. sp.
Saussurea sp.
Solidago virgaurea L.
- Alternaria abutilonis** Speg.
Abutilon avicennae Gaertn.
A. sp.
- A. agerati** Saw.
Ageratum corryzoides L.
- A. amaranthi** (Peck) Hook
Amaranthus blitum L.
- A. atrans** Gibson
Glycine max (L.) Merr.
- A. azukiae** Hara
Phaseolus mungo L.
P. radiatus L.
P. radiatus L. var. *aurea* Prain.
- A. bokurai** Miura
Pyrus communis L.
P. sinensis Lindl. var. *culta* Mak.
P. sp.
- A. brassicae** (Berk.) Sacc.
Beta vulgaris L.
B. vulgaris L. var. *rapacea* Koch.
Brassica albo-glabra Bailey
B. campestris L.
B. campestris L. var. *purpuraria* Bailey
B. chinensis L.
B. chinensis L. var. *oleifera* Mak.
B. chinensis L. var.
B. juncea L.

- B. juncea* L. var. *thumida* Tsen et Lee
B. napiformis Bailey
B. oleracea L.
B. oleracea L. var. *capitata* L.
B. oleracea L. var. *gongylodes* L.
B. pekinensis Rupr.
B. sp.
Raphanus sativus L.
- A. brassicae** (Berk.) Sacc. var. *macrospora* Sacc.
Brassica albo-glabra Bailey
B. chinensis L.
B. oleracea L. var. *botrytis* L.
B. oleracea L. var. *capitata* L.
B. oleracea L. var. *gemmifera* DC.
Raphanus sativus L. var. *macrospodus* Mak.
- A. brassicae** (Berk.) Sacc. var. *phaseoli* Brun.
Phaseolus mungo L.
P. vulgaris L.
Vigna sinensis Endl.
- A. cerasi** Poteb.
Prunus cerasus L.
P. persica Stokes
- A. citri** Pierce
Citrus deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. sp.
- A. crassa** (Jacq.) Rands.
Datura metel L.
- A. dauci** (Kuehn.) Groves et Skolko (*A. carotae* (Ell. et Lang.) Ell.)
Daucus carota L.
- A. dauci** (Kuehn.) Groves et Skoldo f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.) Jones et Groves)
Capsicum annuum L.
Datura alba Nees
D. stramonium L.
D. sp.

Alternaria dauci (Kuehn.) Groves
et Skoldo f. **solani** (Ell. et Mart.)
Neerg. (= *A. solani* (Ell. et Mart.)
Jones et Groves)

Lycopersicum esculentum Mill.
Solanum melongena L.

S. tuberosum L.

A. exitiosa (Kuehn.) Jorst. (= *A.*
herculea (Ell. et Curt.) Ell.)

Brassica albo-glabra Bailey

B. campestris L. var. *napo-*
brassica DC.

B. chinensis L.

B. juncea L.

B. napus L.

B. oleracea L. var. *capitata* L.

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

Raphanus sativus L.

A. gaisen Nagano

Pyrus bretschneideri Rehd.

P. ussuriensis Max.

P. sp.

A. gossypina (Thuem.) Hopkins

Gossypium herbaceum L.

G. sp.

A. herculea (Ell. et Curt.) Ell.

(参看 *A. exitiosa* (Kuehn.) Jorst.)

A. iridicolum (Ell. et Ev.) Ell.

Iris japonicus Thunb.

A. longipes (Ell. et Ev.) Tisd. et

Wadk.

Nicotiana rustica L.

N. tabacum L.

A. macrospora Zimm.

Gossypium arboreum L.

G. herbaceum L.

G. hirsutum L.

G. sp.

A. mali Roberts

Malus pumila Mill.

M. pumila Mill. var. *domestica*
Schmeid.

Pyrus calleryana Dcne

A. nelumbii (Ell. et Ev.) Enlow
et Rand.

Nelumbo nucifera Gaertn.

A. oryzae Hara

Oryza sativa L.

A. porri (Ell.) Cif.

Allium cepa L.

A. fistulosum L.

A. radicina M., D. et E.

Panax schinseng Nees

A. raphani Groves et Skolko

Brassica pekinensis Rupr.

A. ricini (Yoshii et Rakimoto)

Hansf.

Ricinus communis L.

A. solani (Ell. et Mart.) Jones et
Grove

(*A. dauci* (Kuehn.) Groves et
Skolko f. **solani** (Ell. et Mart.)
Neerg.)

A. tabacina (Ell. et Ev.) Hori

Nicotiana rustica L.

N. tabacum L.

A. tenuis Nees

Citrus sp.

Fagopyrum vulgare Hill.

Glycine max (L.) Merr.

Gossypium arboreum L.

G. barbadense L.

G. arboreum herbaceum L.

G. hirsutum L.

G. sp.

Heliantus annuus L.

Lycopersicum esculentum

Mill.

Oryza sativa L.

Polygonum multiflorum

Thunb.

Prunus armeniaca L.

P. mume Sieb. et Zucc.

P. persica Stokes

P. salicina Lindl.

Pyrus serotina Rehd.

Setaria italica Beauv.

A. tomato (Cke.) Jones

Lycopersicum esculentum Mill.

A. violae Gallow. et Dors.

Viola sp.

A. viticola P. Brum.

Vitis vinifera L.

Amastigis artemisiae Saw.

Artemisia lactiflora Wall.

Ancylospora costi Saw.

Costus speciosus (Koen.) Smith

Angiopsora hiratsukae Syd.

Eragrostis sp.

Antennaria pannosa Berk.

Alnus sp.

Juglans sp.

- Anthina brunnea** Saw.
Citrus sabon Sieb.
- A. citri** Saw.
Citrus nobilis Lour.
C. sinensis (L.) Osb.
Poncirus trifoliata Raf.
- Aphanomyces eutiches** Drechsler
Pisum sativum L.
- Apiosporium salicium** (Pers.)
 Kuntze.
Salix babylonica L.
S. lasiogyne Seem.
S. sp.
Ulmus pumila L.
- Armillaria mellea** (Vahl.) Fr.
Morus alba L.
Pinus sp.
Pyrus bretschneideri Rehd.
Quercus sp.
Salix sp.
- Ascochyta chenopodii** (Karst.)
 Rostr.
Spinacia oleracea L.
- A. cucumis** Fautr. et Rohm.
(Mycosphaerella citrullina
 (Smith) Gross.)
Benincasa hispida Cogn.
- A. dianthi** (A. et S.) Lib.
Dianthus sp.
Silene repens Pater.
- A. eriobotryae** Vogl.
Eriobotrya japonica Lindl.
- A. fabae** Speg.
Vicia faba L.
- A. gossypii** Syd.
Gossypium hirsutum L.
- A. lactucae** Rost.
Lactuca sativa L.
- A. ligulariae** Saw.
Ligularia tussilagined Mak.
 var. *formosana* Hay.
- A. lycopersiel** Brun.
Lycopersicum esculentum
 Mill.
- A. melongenae** Padman.
Solanum melongena L.
- A. moricola** Berl.
Morus alba L.
- A. morifolia** Saw.
Morus alba L.
- A. nicotianae** Pass.
Nicotiana tabacum L.
- A. phaseolorum** Sacc.
Phaseolus aureus Roxb.
P. mungo L.
P. radiatus L. var. *typicus*
 Praln.
P. sp.
Vicia faba L.
V. sativa L.
- A. pisi** Lib.
Pisum sativum L.
Vicia faba L.
- A. punctata** Naoum.
Vicia sativa L.
- A. sesami** Miura
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- A. sojae** Miura
Glycine max (L.) Merr.
- A. sorghi** Sacc.
Andropogon sorghum Brot.
 var. *sudanensis* Piper.
- A. viciae** Lib.
Vicia cracca L.
V. faba L.
- A. zizyphi** Hara
Zizyphus sativa Gaertn.
- Aspergillus carbonarius** (Bain.)
 Thom.
Stephania cepharantha Hay.
S. sphaerantha Hay.
- A. fumigatus** Fres.
Gossypium sp.
Malus pumila Mill.
- A. luchuensis** Inui
Malus pumila Mill.
Prunus mume Sieb. et Zucc.
P. persica Stokes.
P. salicina Lindl.
- A. luteo-niger** (Lutz.) Thom. et
 Church
Malus pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica*
 Schneid.
- A. niger** van Tiegh.
Allium cepa L.
Arachis hypogaea L.
Citrus sp.
Gossypium sp.
Malus pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica*
 Schneid.

- Aspergillus niger** van Tiegh.
Punica granatum L.
Pyrus ussuriensis Max.
Zizyphus sativa Gaertn.
- A. versicolor** (Vuill.) Tiroboschi
Prunus persica Stokes
- Asterina aucubae** P. Henn.
Aucuba chinensis Benth.
- A. brandisiae** Hansf.
Brandisia sp.
- A. elaeocarpi** Syd
Elaeocarpus dubius
E. hainanensis Oliv.
- A. jasmini** Hansf.
Jasminum sp.
- A. lawsoniae** P. Henn. et E. Nym.
Lawsonia sp.
- A. linderiae** Hansf.
Lindera sp.
- A. mahoniae** Keissler
Mahonia bealei Carr.
- A. sepulta** Berk. et Curt.
Lindera strychnifolia F. Villars
- Asteromella platenoidis** (Sacc.) Petr.
Acer truncatum Bge.
- Asterosporium hoffmani** Fr.
Betula sp.
- Atractium flammeum** Berk. et Rav.
Citrus medica L.
- Balansia andropognis** Syd.
Chrysopogon aciculatus Trin.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp. *submutica* Honda
Erianthus pollinoides Rendle
Lophatherum gracile Brongn.
Microstegium ciliatum var. *Wallichiana* Hack.
Miscanthus japonicus (Trunb.) Anders.
Panicum repens L.
Paspalum scrobiculatum L.
Pennisetum japonicum Trin.
Syntherisma sanguinalis Dulac var. *ciliaris* Honda
- B. claviceps** Speg.
Miscanthus sinensis Anders.
- B. oryzae** (Syd.) Narasi et Thirum.
 (参看 *Ephelis oryzae* Syd.)
- B. take** (Miyake) Hara
Arundinaria densiflora Rendle
Phyllostachys pubetula Munro P. sp.
- Balansina stellata** Arn.
Rapanea linearis (Lour.) Moore
- Basidiophora entospora** Roze et Cornu
Erigeron annuus Pers.
- Blastospora itoana** Togashi et Onuma
Smilax randaiensis Hay.
- Botryodiplodia malorum** (Berk.) Pet. et Syd.
Prunus sp.
- B. theobromae** (Pat.) Griff. et Maubl.
Castanea mollissima Bl.
Colocasia esculenta Schott.
Diospyros kaki L.
- Botryosphaeria ribis** (Tode) Gross. et Dugg.
Malus pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
M. spectabilis Borkh.
- Botryosporium pulchrum** Corda
Lycopersicum esculentum Mill.
- Botrytis allii** Munn.
Allium cepa L.
A. fistulosum L.
- B. cinerea** Pers.
Brassica oleracea L.
Capsicum annuum L.
C. frutescens L.
Carum petroselinum Benth.
Citrus sinensis (L.) Osb.
C. sp.
Cordyline terminalis Kunth.
Coriandrum sativum L.
Diospyros kaki L.
Dolichos lablab L.
D. sp.
Fagopyrum vulgare Hill.
Fragaria chiloensis Duch.
Fragaria chiloensis Duch. var. *ananassa* Bail.

Botrytis cinerea Pers.*Gossypium arboreum* L.*Helianthus annuus* L.*Hibiscus cannabinus* L.*H. rosa-sinensis* L.*H. sabdariffa* L.*Indigofera arrecta* Hochst*Ipomoea aquatica* Forsk.*I. batatas* (L.) Poir.*Lactuca sativa* L.*L. scariola* L. var. *astiva* Bisch.*L. sp.**Morus alba* L.*Nicotiana tabacum* L.*Paeonia albiflora* Pallas*Passiflora ceorulea* L.*Phaseolus trinervius* Heyne.*P. vulgaris* L.*Pisum sativum* L.*Prunus armeniaca* L.*P. armeniaca* L. var. *ansu*.

Max.

Ricinus communis L.*Rosa* sp.*Solanum melongena* L.*S. tuberosum* L.*Triticum aestivum* L.*Vicia faba* L.*V. faba* L. var. *equina* Pers.*V. tetrasperma* (L.) Moench**B. depradens Cke.***Ficus carica* L.**B. fabae Sardina***Vicia faba* L.**B. lilliorum Hino***Lilium longifolium* Thunb.*L. philippinense* Veitch**B. paeoniae Oud.***Paeonia suffruticosa* Andr.**Brachysporium oryzae Ito et Ishiyama***Oryza sativa* L.**B. phragmitis Miyake***Phragmites communis* Trin.**B. senegalense Speg.***Oryza sativa* L.**Bremia elliptica Saw.***Lactuca* sp.**B. graminicola Naum.***Arrhenatherum ciliare* Beauv.*A. hispidus* (Thunb.) Mak.**B. lactucae Regel.***Lactuca sativa* L.*L. sp.**Saussurea affinis* Spreng.*Solidago virgaurea* L.*Sonchus arvensis* L.**B. saussureae Saw.***Saussurea affinis* Speng.**B. sonchicola (Schlecht.) Saw.***Sonchus arvensis* L. var. *uliginosus* Trautv.**Burrillia ajrekari Thirum.***Monochoria vaginalis* Persl**Caeoma cheoanum Cummins***Rubus* sp.**C. makinoi Kusano***Prunus cerasus* L.*P. manshurica* Koehne.**C. rosae-bracteatae Saw.***Rosa bracteata* Wendl. var. *typica* Lindl.**C. warburgianum P. Henn.***Rosa banksiae* Ait.*R. lucens* Rolfe**Caldariomyces fasciculatus**

Yamam.

Saccharum officinarum L.**Calonectria bambusae (Hara)**

Hoehn.

Phyllostachys sp.**Capnodaria theae Hara***Thea sinensis* L.**Capnodium caespitosum Ell. et Ev.***Photinia loriformis* Smith**C. citri Berk. et Desm.***Citrus grandis* Osb.*C. nobilis* Lour.*C. poonensis* Tanaka*C. sinensis* (L.) Osb.*C. unshiu* Marc.*C. sp.**Fortunella crassifolia* Sw.**C. footii Berk. et Desm.***Cinnamomum appelianum*

H.-M.

Thea sinensis L.**C. salicinum Mont.***Populus tomentosa* Carr.*P. sp.**Salix* sp.

- Capnodium walteri** Sacc.
Achras sapota L.
Citrus grandis Osb.
Capnophaeum fuliginodes (Rehm.) Yamam.
Citrus grandis Osb.
Catacauma dalbergiicola (P. Henn.) Theiss. et Syd.
Dalbergia hupeana Hance
Cenangium abietis (Pers.) Duby
Pinus tabulaeformis Carr.
P. sp.
Cephalosporium puerariae Saw.
Pueraria thunbergiana Benth.
C. zonatum Saw.
Morus acidosa Griff.
Ceratocystis adiposa (Butl.) Moreau
Saccharum officinarum L.
C. fimbriata Ell. et Halst.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
C. paradoxa (Dode) Moreau
 (参看 *Theelaviopsis paradoxa* (de Seynes) Hoehn.)
Cercospora abelmoschi Ell. et Ev.
Hibiscus cannabinus L.
C. acaciae-confusae Saw.
Acacia richii A. Br.
C. acalyphae Peck
Acalypha australis L.
C. acerina (Hart.) V. B.
Acer sp.
C. achyranthis H. et P. Syd.
Achyranthes bidentata Bl.
C. actinostemmae Saw.
Actinostemma lobatum Max.
C. ageratoides Ell. et Ev.
Eupatorium sp.
C. aleuritidis Miyake
 (*Mycosphaerella aleuritidis* (Miyake) Ou)
Aleurites cordata Muell.-Arg.
A. fordii Hemsl.
C. alocasiae Saw.
Alocasia odora C. Koch.
C. alternantherae-nodiflorae Saw.
Alternanthera nodiflora R. Br.
C. althaeina Sacc.
Abutilon avicennae Gaertn.
Althaea rosea Gav.
Hibiscus sp.
Malva sylvestris L.
C. amorphophalli P. Henn.
Amorphophallus konjac K. Koch.
C. andropogonis Ou
Sorghum vulgare Pers.
C. angulata Wint.
Philadelphus pekinensis Rupr.
C. anisomelicola Saw.
Anisomeles indica (L.) Kuntze.
C. apii Fr.
Apium graveolens L.
A. sp.
C. apii Fres. var. *carotae* Pass.
Daucus carota L.
C. arachidicola Hori
 (*Mycosphaerella arachidicola* Jenk.)
Arachis hypogaea L.
C. araliae P. Henn.
Aralia chinensis L.
A. dasycphylla Miq.
A. sp.
C. araliae-cordatae Hori
Aralia cordata Thunb.
C. arisaemae Tai
Arisaema ambiguum Engl.
C. asparagi Sacc.
Asparagus officinalis L.
C. atro-marginalis Atk.
Lycianthes biflora Bitter
Solanum nigrum L.
C. averrhoae Petch
Averrhoa carambola L.
C. avicennae Chupp
Abutilon avicennae Gaertn.
C. bacilligers (Berk. et Br.) Fres.
Rhamnus nepalensis Wall.
C. bakeri H. et P. Syd.
Clematis fragrans Vent.
C. bellyneckii (West.) Niessl.
Cynanchum sp.
C. beticola Sacc.
Beta vulgaris L.
B. vulgaris L. var. *rapacea* Koch.
Spinacia oleracea L.
C. bischoffiae Yamamoto
Bischofia trifoliata Hook.
C. bixae Allesch. et Noack.
Bixa orellana L.

Cercospora blumeae-balsamiferae
Saw.

- Blumea balsamifera* DC.
C. **boehmeriae** Peck
Boehmeria frutescens Thunb.
var. *concolor* Nakai
B. *nivea* Gaud.
C. **brachiata** Ell. et Ev.
Amaranthus tricolor L.
C. **brachypus** Ell. et Ev.
Euphorbia humifusa Willd.
C. **broussonetiae** Chupp et Linder
Broussonetia sp.
C. **buddleiae** Yamam.
Buddleia officinalis Max.
C. **calendulae** Sacc.
Calendula arvensis L.
C. **callicarpae** Cke.
Callicarpa formosana Rolfe
C. **campanumoeae** Saw.
Campanumoea javanica Blume
C. **campi-silli** Speg.
Impatiens molitangere L.
C. **canavaliae** H. et P. Syd.
Canavalia ensiformis DC.
C. **canascens** Ell. et Mart.
Dolichos lablab L.
Phaseolus aureus Roxb.
P. *mungo* L.
P. *radiatus* L.
P. *vulgaris* L.
Vigna sinensis Endl.
C. **cannabina** Wakef.
Cannabis sativa L.
C. **cannabinis** Hara et Fukui
Cannabis sativa L.
C. **capsici** Heald et Wolf
Capsicum annum L.
C. **carotae** (Pass.) Solheim
Daucus carota L.
C. **castilloae** Saw.
Castilleja elastica Cerv.
C. **catalpac** Wint.
Catalpa bungei C. A. May.
C. *ovata* Don
C. **catappae** P. Henn.
Terminalia catappa L.
C. **catenospora** Atk.
Ebulus formosana Nakai
C. **celosiae** Syd.
Celosia argentea L.
C. **cristata** L.

- C. **celtidis** Saw.
Celtis sinensis Pers.
C. **cephalanthi** Ell. et Kell.
Cephalanthus occidentalis
C. **ceratoniae** Pat. et Trabut
Ceratonia siliqua L.
C. **chengtuensis** Tai
Lyctum chinense Mill.
C. **cheonis** Chupp et Linder
Ilex wilsonii Loes.
C. **chinensis** Tai
Polygonatum officinale Al-
lesch.
C. **chionea** Ell. et Ev.
Cercis chinensis Bge.
C. **chrysanthemi** Heald et Wolf
Chrysanthemum coronarium
L.
C. *coronarium* L. var. *spatiosum* Bail.
C. *segetum* L.
C. *sinense* Sab.
C. **circumscissa** Sacc.
Eriobotrya japonica Lindl.
Prunus armeniaca L.
P. *cerasus* L.
P. *domestica* Linn.
P. *manshurica* Koehne.
P. *mume* Sieb. et Zucc.
P. *mume* Sieb. et Zucc. var.
formosana Masam.
P. *persica* Stokes
P. *persica* Stokes var. *vulgaris*
Max.
P. *pseudocerasus* Lindl.
P. *salicina* Lindl.
P. sp.
C. **citrullina** Cke.
Benincasa hispida Cogn.
Citrullus vulgaris Schrad.
Luffa cylindrica Roem.
Momordica charantia L.
M. *cochinchinensis* Speng.
C. **cladophora** Saw.
Ficus septica Burm. f.
C. **cladrastidis** Jacz.
Mackia amurensis Rupr. et
Max.
C. **clerodendri** Miyake
Clerodendron cyrtophyllum
Turcz.

Cercospora clerodendri Miyake

- C. paniculatum* L.
- C. trichotomum* Thunb.
- C. sp.*

C. cocculi Syd.

- Cocculus trilobus* DC.

C. coffeicola Berk. et Cke.

- Coffea arabica* L.
- C. robusta* Linden.

C. columnaris Ell. et Ev.

(= *Isariopsis griseola* Sacc.)

- Phaseolus vulgaris* L.
- Pisum sativum* L.
- Vigna sinensis* Endl.

C. concors (Casp.) Sacc.

- Solanum tuberosum* L.

C. corchori Saw.

- Corchorus olitorius* L.

C. coriariae Chupp

- Coriaria sinica* Max.

C. costaricensis Syd.

- Eupatorium* sp.

C. costina H. et P. Syd.

- Costus speciosus* (Koen.) Smith

C. cotizensis Muller et Chupp

- Crotalaria verrucosa* L.

C. crotalariae Sacc.

- Crotalaria juncea* L.

C. cruenta Sacc. (*Mycosphaerella*

cruenta (Sacc.) Lath.)

- Canavalia* sp.
- Dolichos lablab* L.
- Glycine max* (L.) Merr.
- Phaseolus aureus* Roxb.
- P. lunatus* L.
- P. mungo* L.
- P. radiatus* L.
- P. radiatus* L. var. *aurea* Prain.
- P. radiatus* L. var. *typicus* Prain.
- P. vulgaris* L.
- P. sp.*
- Pisum sativum* L.
- Vicia faba* L.
- Vigna sinensis* Endl.

C. cryptomeriae Shirai

- Cryptomeria japonica* Don.

C. cydoniae Ell. et Ev.

- Cydonia oblonga* Mill.

C. dahliae Hara

(参看 *C. grandissima* Rangel)

C. daturicola (Speg.) Ray.

- Datura alba* Nees

C. destructiva Rav.

- Evonymus japonicus* Thunb.

C. dianellae Saw.

- Dianella ensifolia* DC.

C. diffusa Ell. et Ev.

- Lycopersicum esculentum* Mill.

C. dioscoreae Ell. et Mart.

- Dioscorea japonica* Thunb.

C. dolichi Ell. et Ev.

(= *C. vignae-sinensis* Tai et Wei)

- Vigna sinensis* Endl.
- V. sinensis* Endl. var. *catiang* Nakai

C. dubia (Riess.) Wint.

- Chenopodium album* L.

C. epicoccoides Cke. et Mass.

- Eucalyptus globulus* Lab.

C. eriobotryae (Enjoji) Saw.

- Eriobotrya japonica* Lindl.

C. eugeniae (Rangel) Chupp

- Eugenia japonica* Lam.

C. eupatorii-formosani Saw.

- Eupatorium formosanum* Hay.

C. euphorbiae Kell. et Sw.

(= *C. helioscopiae* Syd.)

- Euphorbia helioscopia* L.
- E. sp.*

C. evodiae H. et P. Syd.

- Evodia meliaeefolia* Benth.

C. fagopyri Nakata et

Takimoto

- Fagopyrum vulgare* Hill.

C. ferruginea Fuck.

- Artemisia* sp.

C. fici Heald et Wolf

- Ficus carica* L.

C. fici-harlandii Saw.

- Ficus harlandii* Benth.

C. fici-septicae Saw.

- Ficus septica* Burm. f.

C. flexuosa Tanaka

(= *Clasterosporium mori* H. et

- P. Syd.*)
- Morus acidosa* Griff.
- M. alba* L.
- M. latifolia* Bur.
- M. sp.*

- Cercospora formosana** Yamam.
Lantana mista Bailey
L. camara L.
- C. fukushiana** (Matsum.) Yamam.
Impatiens balsamina L.
- C. fuligena** Roldan
Lycopersicum esculentum Mill.
- C. fuligenosa** Ell. et Ev
 (参看 **C. macClatchieana**
 Sacc. et Syd.)
- C. fusimaculans** Atk.
Echinochloa crus-galli (L.)
 Beauv.
Panicum miliaceum L.
Setaria plicata (Lam.) Cke.
- C. genkwa** Syd.
Daphnes genkwa Sieb. et Zucc.
- C. glandulosa** E. et K.
Ailanthus altissima (Mill.) Sw.
- C. gomphrenae** Saw.
Gomphrena globosa L.
- C. gossypina** Cke.
(Mycosphaerella gossypina
 (Atk.) Earle)
Gossypium arboreum L.
G. barbadense L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
G. nanking Meyen.
G. sp.
- C. gotoana** Togashi
Sorbaria kirilowii Regel.
- C. grandissima** Rangel
 (= **C. dahliae** Hara)
Dahlia variabilis Desf.
- C. granuliformis** Ell. et Holw.
Viola philippica Cav. subsp.
malesica W. Becker
V. sp.
- C. helianthi** Ell. et Ev.
Helianthus sp.
- C. helioscopiae** Syd.
 (参看 **C. euphorbiae** Kell. et Sw.)
- C. henningsii** Allesch.
(Mycosphaerella manihotis
 Syd.)
Manihot utilisima Pohl.
M. sp.
- C. hibisci-cannabini** Saw.
 (参看 **C. abelmoschi** Ell. et
 Ev.)
- C. hibiscina** Ell. et Ev.
Hibiscus cannabinus L.
- C. hibiscivora** Hara
Hibiscus cannabinus L.
- C. humuli** Hori
Humulus japonicus Sieb. et
 Zucc.
- C. hydrangeae** Ell. et Ev.
Hydrangea angustipetala Hay.
H. macrophylla (Thunb.) DC.
- C. ilicis-micrococcae** Saw.
Ilex micrococca Max. var.
longifolia Hay.
- C. imperatae** (Syd.) Saw.
Imperata cylindrica (Linn.)
 Beauv. var. *koenigii* Dur. et
 Schinz.
- C. instabilis** Rangel
Cajanus cajan (L.) Millsp.
- C. ipomoeae** Wint.
Ipomoea aquatica Forsk.
I. hederacea Jacq.
I. pes-caprea Roth.
Pharbitis hederacea Choisy
- C. iteodaphnes** (Thuem.) Sacc.
Actinidia callosa Lindl.
- C. ixorae** Solheim
Ixora chinensis Lam.
- C. jasminicola** Muller et Chupp
Jasminum grandiflorum L.
J. odoratissimum L.
- C. juncicola** Chupp
Juncus sp.
- C. kaki** Ell. et Ev.
Diospyros kaki L.
D. lotus L.
- C. kashotoensis** Yamam.
Clerodendron inerme Gaertn.
- C. kikuchii** Matsumoto et
 Tomoyasu
Glycine max (L.) Merr.
- C. kopkei** Krueger
 (= **C. longipes** Butl.)
Saccharum officinarum L.
- C. latens** Ell. et Ev.
 (= **C. lespedezae** Ell. et Dearn.)
Lespedeza bicolor Turcz.
L. cyrtobotrya Miq.
L. tomentosa Sieb.
L. sp.
- C. leguminum** Chupp et Linder
Crotalaria sp.

- Cercospora leguminum** Chupp et Linder
Crotalaria sp.
C. lespedezae Ell. et Dearn.
 (参看 **C. latens** Ell. et Ev.)
C. ligustri Roum.
Ligustrum ibota Sieb.
C. lindericola Yamam.
Lindera oldhami Hemsl.
C. lingi Tai
Oenothera sp.
C. liquidambaris Cke. et Ell.
Liquidambar formosana Hance
C. liriopes Tai
Liriope graminifolia Baker
Ophiopogon sp.
C. longipes Butl.
 (参看 **C. kopkei** Krueger)
C. longissima Sacc.
Lactuca sativa L.
 L. sp.
C. lonicericola Yamam.
Lonicera japonica Thunb. var.
sempervillosa Hay.
C. lygodii Saw.
Lygodium microstachyum Desv.
C. lythracearum Heald et Wolf
Lagerstroemia indica L.
L. subcostata Koehne.
L. subcostata Koehne. var.
hirtella Koehne.
C. macarangae H. et P. Syd.
Macaranga tanarius Muell.-Arg.
C. macClatchieana Sacc. et Syd.
 (= **C. fuligenosa** Ell. et Ev.)
Diospyros lotus L.
C. machili Saw.
Machilus kusanoi Hay.
C. malayensis Stev. et Solh.
Hibiscus esculentus L.
C. mali Ell. et Ev.
Malus pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica*
 Schneid.
M. spectabilis Borkh.
Pyrus ussuriensis Max.
 P. sp.
C. malloti Ell. et Ev.
Mallotus japonicus Muell.-Arg.
C. mangiferae Koord.
Mangifera indica L.

- C. medicaginis** Ell. et Ev.
Medicago sativa L.
C. melastombia Yamam.
Melastoma candidum Don.
M. candidum Don. var. *nobotan* Mak.
C. melongenae Welles.
Solanum melongena L.
S. nigrum L.
C. melothriae Saw.
Melothria heterophylla (Lour.) Cogn.
C. menispermii Ell. et Halst.
C. micromera Syd.
Menispermum dahuricum DC.
Sapium sebiferum Roxb.
C. microsora Sacc.
Tilia chinensis Max.
C. miscanthi Saw.
Miscanthus japonicus (Thunb.) Anders.
C. missouriensis Wint.
Morus acidosa Griff.
C. miurae Syd.
Cynanchum sp.
Metaplexis japonica (Thunb.) Mak.
C. mori Hara
Morus acidosa Griff.
M. alba L.
C. moricola Cke.
Morus latifolia Bur.
C. musae Zimm. (**Metasphaeria musae** (Zimm.) Saw.)
Musa basjoo Sieb.
M. cavendishii L.
 M. sp.
C. musaecola Saw.
Musa cavendishii L.
C. mysorensis Thirum. et Chupp
Pouzolzia zeylanica Burm. var.
alienata Sasaki
C. nasturtii Pass.
Rorippa sinapis (Burm. f.) Schultz.
C. neriella Sacc.
Nerium oleander L.
C. nerii-indici Yamam.
Nerium indicum Mill.
C. nicotianae Ell. et Ev.
Nicotiana rustica L.
N. tabacum L.

- Cercospora nymphaeacea** Cke. et Ell.
Nelumbo nucifera Gaertn.
- C. obtegens** H. et P. Syd.
Hydrangea opuloides K. Koch.
- C. oclimicola** Petr. et Ciff.
Ocimum basilicum L.
- C. oenotherae** Ell. et Ev.
Oenothera biennis L.
- C. oryzae** Miyake
Oryza sativa L.
- C. osmanthi-asiatici** Saw.
Osmanthus asiaticus Nak.
- C. pachypus** Ell. et Kell.
Helianthus annuus L.
- C. paederiae** Tai
Paederia chinensis Hance
- C. paeoniae** Tehon et Daniels
Paeonia albiflora Pall.
- C. papaveri** Nakata
Papaver somniferum L.
- C. papavericola** Chupp
Papaver somniferum L.
- C. papayae** Hansf.
Carica papaya Linn.
- C. paulowniae** Hori
Paulownia tomentosa (Thunb.) Schneid.
- C. penzigii** Sacc.
Citrus junos Tanaka
- C. persicariae** Yamam.
Polygonum chinense L.
P. hydropiper L.
- C. personata** (B. et C.) Ell.
(Mycosphaerella berkeleyi) Jenk.)
Arachis hypogaea L.
- C. phyllanthi** Chupp
Phyllanthus niruri L.
- C. physalidis** Ell.
Physalis alkekengi L.
- C. pini-densiflorae** Hori et Nambu
Pinus luchuensis Mayr.
P. massoniana Lamb.
- C. piricola** Saw.
Pyrus communis L.
P. lindleyi Rehd.
P. sp.
- C. pisi-sativi** Stev.
Pisum sativum L.
- C. pollicae** Saw.
Pollicia japonica Thunb.
- C. polygonorum** Cke.
Polygonum aviculare L.
- C. profusa** H. et P. Syd.
Acalypha australis L.
- C. prunicola** Ell. et Ev.
Prunus campanulata Max.
P. Yedoensis Matsum.
- C. psychotriae** Saw.
Psychotria rubra Poir.
- C. pueraricola** Yamam.
Pueraria thunbergiana Benth.
- C. punicae** P. Henn.
Punica granatum L.
- C. ricinella** Sacc. et Berl.
Ricinus communis L.
- C. roesleri** (Catt.) Sacc.
Vitis vinifera L.
V. sp.
- C. rosae** (Fuck.) Hoehn.
Rosa multiflora Thunb.
R. sp.
- C. rosicola** Pass.
Rosa centifolia L.
R. chinensis Jacq.
R. multiflora Thunb.
R. sp.
- C. sagittariae** E. et K.
Sagittaria sagittifolia L.
- C. salicina** Ell. et Ev.
Salix babylonica L.
S. glandulosa Seem. var. *warburgi* Koidz.
- C. sapindicola** Tai
Sapindus mukorossi Gaertn.
- C. saururi** Ell. et Ev.
Saururus chinensis (Lour.) Bail.
- C. sawadae** Yamam.
Psidium guayava L.
- C. sesami** Zimm.
Linum usitatissimum L.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- C. setariae** Atk.
Setaria italica Beauv.
- C. snelliana** Reichert
Morus sp.
- C. sojae** Hara
Glycine max (L.) Merr.

- Cercospora sorghii* Ell. et Ev.
Andropogon sorghum Brot.
 var. *sudanensis* Piper.
Sorghum vulgare Pers.
- C. *spgazzinii* Sacc.
Celtis sinensis Pers.
- C. *sphaeriaeformis* Cke.
 (= *C. ulmi* Syd.)
Ulmus pumila L.
- C. *spilosticta* Syd.
Pithecolobium lucidum Benth.
- C. *spiraeae* Thuem.
Spiraea thunbergii Sieb.
- C. *stizolobii* H. et P. Syd.
Mucuna ferruginea Mats.
- C. *subsessilis* H. et P. Syd.
Melia azedarach L.
 M. sp.
- C. *symploci* Saw.
Symplocos paniculata (Thunb.)
 Miq.
- C. *szechuanensis* Tai
Pisum sativum L.
- C. *taiwanensis* Matsum. et
 Yamam.
Saccharum officinarum L.
- C. *tectoniae* Stev.
Tectona grandis L.
- C. *ternateae* Petch
Clitoria ternatea L.
- C. *theae* (Cav.) Breda de Haan
Thea sinensis L.
- C. *thladianthae* Saw.
Thladiantha formosana Hay.
- C. *timorensis* Cke.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
 I. sp.
- C. *tiuea* Sacc.
Viburnum opulus L.
- C. *tremae* Saw.
Trema orientalis Bl.
- C. *trilobi* Chupp
Cocculus trilobus DC.
- C. *truncata* Ell. et Ev.
Vitis thunbergii Sieb. et Zucc.
- C. *tuberculans* Ell. et Ev.
Liquidambar formosana
 Hance.
- C. *ubi* Rac.
Dioscorea alata L.
- C. *ulmi*, Syd.
 (参看 *C. sphaeriaeformis* Cke.)
- C. *urariae* Saw.
Uraria macrostachya Wall.
- C. *vaginae* Krueger
Saccharum officinarum L.
S. spontaneum L.
- C. *vanierae* Chupp et Linder
Cudrania tricuspidata Bur.
- C. *viburni-cylindrici* Tai
Viburnum cylindricum Buch-
 Ham.
- C. *vignae-sinensis* Tai et Wei
 (参看 *C. dolichi* Ell. et Ev.)
- C. *violae* Sacc.
Viola philipica Cav. subsp.
malesica W. Becker
 V. sp.
- C. *viticis* Ell. et Ev.
Vitex negundo L.
- C. *viticola* (Ces.) Sacc.
 (= *Isariopsis clavispora* Sacc.)
Vitis amurensis Rupr.
V. labrusca L.
V. vinifera L.
 V. sp.
- C. *yerbae* Speg.
Ilax wilsonii Loes.
- C. *zebrina* Pass.
Trifolium pratense L.
- C. *zinniae* Ell. et Mart.
Zinnia elegans L.
- C. *zizyphi* Petch
Paliurus ramosissimus Poir.
- C. *zonata* Wint.
Vicia faba L.
V. gigantea Rge.
- Cercospora albo-maculans* (Ell.
 et Ev.) Sacc.
Brassica campestris L.
B. chinensis L. (Cont.)
B. chinensis L. var. *utilis*
 Twen et Lee
B. chinensis L. var.
B. juncea L.
B. oleracea L.
B. oleracea L. var. *capitata* L.
B. pekinensis Rupr.
 B. sp.
Raphanus sativus L.
- C. *bicalcarata* (Ces.) Eert.
Chamaerops humilis L.

- Cercospora boehmeriae** Sawada
Boehmeria frutescens Thunb.
 var. *concolor* Nakai
- C. clematidis** Saw.
Clematis gouriana Roxb.
- C. dendrocalami** Saw.
Dendrocalamus latiflorus
 Munro
- C. eupatorii** Saw.
Eupatorium formosanum Hay.
- C. evonymi** Erikss.
Evonymus sp.
- C. indigoferae** Miura
Indigofera kirilowii Max.
- C. persicae** Sacc.
Prunus persica Stokes
- C. theae** Petch
Thea sinensis L.
- C. triumfettae** Saw.
Triumfetta bartramia L.
- C. virgaureae** (Thuem.) L.
Solidago virgaurea L.
- Cercosporidium artemisiae** Saw.
Artemisia vulgaris L. var. *indica* Max.
- C. bambusicolum** Saw.
Bambusa sp.
- Cerebella cynodontis** Syd.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
- C. ischemicola** Saw.
Ischaemum timorense Kunth.
 var. *peguense* Hack.
- C. paspali** Cke. et Mass.
Ischaemum akqense Honda
Microstegium ciliatum var.
Wallichiana Hack.
Miscanthus japonicus (Thunb.)
 Anders.
Paspalum scrobiculatum L.
Sporobolus elongatus R. Br.
- Ceuthocarpus calamicolum** Teng
 et Ou
Calamus sp.
- Chaetoseorias vulgare** Yamam.
Sanchezia nobilis Hook f.
- Chaetothyrium dictyosporum**
 Petr.
Ficus foveolata Wall.
- C. sinense** Teng
Castanopsis sclerophylla
 Schottk.

- C. spinigerum**
 (Hoehn.) Yamam.
Citrus grandis Osb.
C. poonensis Tanaka
C. unshiu Marc.
- Chnoopsora itoana** Hirat. f.
Oxalis griffithii Edgew. et
 Hook f.
 O. sp.
- Choanephora cucurbitarum** (Berk.
 et Rav.) Thaxter
Cucurbita maxima Duch.
C. moschata Duch.
C. pepo L.
Gossypium sp.
Hibiscus cannabinus L.
Luffa cylindrica Roem.
Solanum melongena L.
- C. manshurica** (Saito et Neg.) Tai
Capsicum annuum L.
Cucurbita moschata Duch.
Dolichos lablab L.
Luffa cylindrica Roem.
Solanum melongena L.
- Chrysomyxa bambusae** Teng
Bambusa sp.
- C. dietelii** Syd.
Rhododendron trichodladum
 Franch.
- C. expansa** Diet.
Rhododendron morii Hay.
R. pseudo-chrysanthum Hay.
R. sp.
- C. ledi** de Bary
Picea likiangensis (Franch.)
 Pritz.
- C. pyrolae** (DC.) Rostr.
Pyrola rotundifolia L. var. *incarnata* DC.
- C. rhododendri** de Bary
Rhododendron dauricum L.
R. decorum Franch.
R. faberi Hemsl.
R. micranthum Turcz.
R. oldhami Max.
- C. succinea** (Sacc.) Tranzsch.
Rhododendron nankotaisanense
 Hay.
- C. tsugae-yunnanensis** Teng
Tsuga yunnanensis (Franch.)
 Mast.

- Cintractia caricis** (Pers.) Magn.
Carex laticeps Franch.
- C. limitata** Clint.
Cyperus malaccensis Roxb.
- Cladochytrium tenue** Nowak
Iris sp.
- Cladosporium araliae** Saw.
Aralia chinensis L.
- C. caesalpiniae** Saw.
Caesalpinia nuga Ait.
- C. carpophilum** Thuem.
Prunus armeniaca L.
P. armeniaca L. var. *ansu* Max.
P. mume Sieb. et Zucc.
P. persica Stokes
P. persica Stokes var. *vulgaris* Max.
- C. colocasiae** Saw.
Colocasia esculenta Schott.
- C. cucumerinum** Ell. et Halst.
Lagenaria siceraria (Molina) Stanley
- C. daphniphylli** Saw.
Daphniphyllum glaucescens Bl.
- C. fulvum** Cke.
Lycopersicum esculentum Mill.
Solanum melongna L.
- C. herbarum** (Pers.) Link.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Salix sp.
Setaria italica Beauv.
Sorghum vulgare Pers.
S. sp.
Thuja orientalis L.
Triticum aestivum L.
Zea mays L.
- C. herbarum** (Pers.) Link. var. *lablab* Sacc.
Dolichos lablab L.
- C. lonicerae** Saw.
Lonicera japonica Thunb.
var. *sempervillosa* Hay.
- C. macrocarpum** Preuss.
Spinacia oleracea L.
- C. nodulosum** Corda
Spiraea blumei Don.
- C. paeoniae** Pass.
Paeonia albiflora Pallas
P. suffruticosa Andr.
- C. rhodomyrti** Saw.
Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
- C. sclerotophilum** Saw.
Citrus grandis Osb.
- C. tectonae** Saw.
Tectona grandis L.
- Clasterosporium camelliae** Mass.
Thea sinensis L.
- C. carpophilum** (Lev.) Aderh.
Prunus armeniaca L.
P. persica Stokes
- C. carpophilum** (Lev.) Aderh.
Prunus persica Stokes var. *vulgaris* Max.
P. pseudocerasus Lindl.
P. sp.
- C. degenerans** Syd.
Prunus manshurica Koehne.
P. mume Sieb. et Zucc.
- C. erlobotryae** Hara
Eriobotrya japonica Lindl.
- C. mori** H. et P. Syd.
(参看 *Cercospora flexuosa* Tanaka)
- C. paeoniae** Pass.
Paeonia suffruticosa Andr.
- Clathrococcum niponicum** Hiura
Phaseolus mungo L.
P. radiatus L. var. *aurea* Prain.
- Claviceps microcephala** (Wallr.) Tul.
Calamagrostis sp.
Spodiopogon sibiricus Trin.
- C. miscanthi** Saw.
Miscanthus japonicus (Thunb.) Anders.
- C. paspali** Stev. et Hall
Paspalum scrobiculatum L.
- C. purpurea** (Fr.) Tul.
Agropyron ciliare (Trin.) Franch.
A. cristatum (L.) Gaertn.
A. semicostatum Nees
Agrostis sp.
Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus

- Claviceps purpurea* (Fr.) Tul.
Bromus inermis Leyss.
B. sp.
Calamagrostis sp.
Capillepedium parviflorum
 Stapf.
Dactylis glomerata L.
D. sp.
Elymus tianchanicus Drobov
Festuca elatior L.
F. sp.
Heteropogon contortus (L.)
 Beauv.
Hordeum bogdanii
H. vulgare L.
Miscanthus sinensis Anders.
Pennisetum alopecuroides (L.)
 Spreng.
P. sinense Mez
Poa sp.
Sacharum narenga (Nees)
 Hack.
Secale cereale L.
Themeda triandra Forsk.
Triticum aestivum L.
T. turgidum
C. syntherismae Saw
Syntherisma sanguinalis Dulac
 var. *ciliaris* Honda
Clithris rosae (Teng) Tehon
Rosa sp.
Coccodiella arundinariae Hara
 (参看 *Coccostromopsis arundinariae* (Hara) Teng)
Coccodiscus quercicola P. Henn.
Quercus sp.
Coccoomyces hiemalis Higg.
Prunus cerasus L.
C. mussaendae Saw
Mussaenda parviflora Miq.
Coccostromopsis arundinariae
 (Hara) Teng (= *Coccodiella arundinariae* Hara)
Arundinaria densiflora Rendle
Bambusa sp.
Phyllostachys sp.
Cochliobolus heterostrophus
 Drechsler
 (参看 *Helminthosporium maydis* Nicikado)
C. miyabeanus (Ito et Kurib.)
 Drechsler

- (参看 *Helminthosporium oryzae* van Breda de Haan)
C. sativus (Ito et Kurib.)
 Drechsler
 (参看 *Helminthosporium sativum* Pam., King et Bakke)
C. setariae (Ito et Kurib.)
 Drechsler
 (参看 *Helminthosporium setariae* Saw.)
C. stenospilus (Carp.) Matsum.
 et Yamam.
 (参看 *Helminthosporium stenospilum* Drechsler)
Coleophoma sinensis Petr.
Cassiope selaginoides Hook f.
 et Thoms.
Coleopuccinia kummingensis Tai
Cotoneaster franchetii Bois
C. microphylla Wall.
C. simplex Diet.
Eriobotrya japonica Lindl.
E. sp.
C. sinensis Pat.
Amelanchier sp.
Cotoneaster racemiflora var.
microcarpa Rehd. et Wils.
C. tenuipes Rehd. et Wils.
C. sp.
Coleosporium aconiti Thuem.
Aconitum vilmorinianum
 Komar.
C. arundinae Syd.
Arundina chinensis Blume
Spathoglottis pubescens Lindl.
C. asterum (Diet.) Syd.
Aster ageratoides Turcz.
A. indicus L.
A. scaber Thunb.
A. tataricus L.
A. sp.
Asteromaea indica L.
Callistephus chinensis Nees
Inula sp.
Pinus taiwanensis Hay.
C. bletiae Diet.
Anthogonium gracile Wall.
Bletilla formosana Schtr.
B. striata (Thunb.) Rehb. f.

Coleosporium campanulae (Pers.)
Lev.

Adenophora divaricata Franch.
et Sav. var. *manshurica* Kitag.

A. morrisonensis Hay.

A. pereskiaefolia G. Don.

A. polymorpha Ledeb.

A. remotiflora Miq.

A. rupicola Hemsl.

A. scabridula Nannf.

A. stricta Miq.

A. verticillata Fisch.

A. verticillata Fisch. var.
typica Rgl.

A. sp.

Lobelia pyramidalis Wall.

L. sp.

Platycodon sp.

Wahlenbergia marginata A.
DC.

C. carpesii Sacc.

Carpesium abrotanoides L.

C. acutum Hay.

C. cernuum L.

C. cheoanum Cummins

Coleus sp.

C. cimicifugatum Thuem.

Cimicifuga dahurica Max.

C. foetida

C. simplex Wornesck.

C. sp.

C. clematidis Barcl.

Clematis angustifolia Jacq.

C. apiifolia DC. var. *obtusiden-*
tata Rehd. et Wils.

C. armandi Franch.

C. bartlettii Yamam.

C. benthamiana Hemsl.

C. brevicaudata DC.

C. chinensis Osb.

C. chrysocoma Fr.

C. fargesii Franch.

C. formosana Kuntze

C. fusca Turcz. var. *mand-*
shurica Regel

C. fusca Turcz. var. *jezoensis*
Miyabe

C. gouriana Roxb.

C. trita Wall.

C. grata Wall var. *grandiden-*
tata Rehd. et Wils.

C. heracleaefolia DC. var. *davi-*
diana Fr.

C. hexapetala Pall.

C. mandshurica Rupr.

C. montana (Buch.-Ham.) DC.

C. orientalis L.

C. paniculata Thunb.

C. peterae H.-M.

C. recta Linn.

C. sp.

C. clematidis-apiifoliae Diet.

Clematis apiifolia DC.

C. mandshurica Rupr.

C. montana (Buch.-Ham.) DC.

C. sp.

C. clerodendri Diet.

Clerodendron curtophyllum
Turcz.

C. fragrans Vent.

C. trichotomum Thunb.

C. sp.

C. elephantopodis Thuem.

Elephantopus sp.

C. eupetorii Arthur

Eupatorium formosanum Hay.

E. fortunei Turcz. var. *tripar-*
titum Nakai

E. lindleyanum DC.

E. sp.

C. evodiae Diet.

Evodia meliaefolia Benth.

E. officinalis Dode

E. rutae-carpa Benth.

E. sp.

C. geranii Pat.

Geranium strigosum Fr.

G. sp.

C. inulae (Kunze.) Rabh.

Inula serrata Bur. et Fr.

C. leptodermidis

(Barcl.) Syd.

Leptodermis glomerata Hutch.

L. pilosa var. *microphylla*

L. potanini Batal.

L. potanini Batal. var. *glauca*
(Diels) H. Winkl.

L. potanini Batal. var. *tomen-*
tella H. Winkl.

C. ligulariae Thuem.

Ligularia dictyoneura (Franch.)
H.-M.

Coleosporium ligulariae Thuem.

- L. lapathifolius* (Franch.) H.-M.
L. stenocephala Matsum. et Koidz. var. *typica* M. et K.
L. tangutica (Max.) Matt.
L. tussilaginea Mak. var. *formosana* Hay.
L. sp.
C. melampyri (Rebent.) Kleb.
Melampyrum roseum Max.
C. paederiae Diet.
Paederia chinensis Hance
P. sp.
C. perillae Syd.
Elscholtzia patrini (Lepech.) Garcke
E. rugulosa Hemsl.
Mosla chinensis Max.
M. formosana Max.
M. punctata Max.
M. sp.
Orthodon lanceolatum Kudo
Perilla frutescens (L.) Brit.
P. nankinensis Decne.
P. ocimoides L.
C. phellodendri Kam.
Phellodendron amurense Rupr.
P. sachalinenses Sargent
C. plectranthi Barcl.
Elscholtzia patrini (Lepech.) Garcke
Plectranthus eriocalyx Dunn
P. glaucocalyx Max.
C. pulsatillae (Strauss.) Lev.
Pulsatilla cernua Spreng.
P. chinensis (Bge.) Regel.
P. dahurica Spreng.
C. rubiicola Cummins
Rubia cordifolia L.
C. saussureae Thuem.
Saussurea pulchella DC.
S. sp.
C. solidaginis (Schw.) Thuem.
Pinus massoniana Lamb.
Solidago virgaurea L.
C. xanthoxyli Diet.
Zanthoxylum acanthopodium DC.
Z. ailanthoides Sieb. et Zucc.

- Z. alatum* Roxb.
Z. piperitum DC.
Z. simulans Hance
Z. sp.

Coleroa circinans (Fr.) Wint.

- Geranium nepalense* Sweet
G. sp.
C. sacchari (Sacc.) Breda de Haan.
Saccharum officinarum L.
Colletotrichum agaves Cav.
Agave americana L.
A. rigida Mill. var. *sisalana* Pers.
C. ampelinum Cav.
Vitis vinifera L.
C. artrabotrydis Saw.
Artabotrys odoratissimus R. Br.
C. beehmeriae Sawada
Boehmeria nivera Gaud.
C. cajani Rangel
Cajanus cajan (L.) Millsp.
C. camelliae Mass.
Thea sinensis L.
C. carica Stev. et Hall.
Ficus carica L.
C. chrysanthmi (Hori) Saw.
Chrysanthemum coronarium L.
C. cinctum (Berk. et Curt.) Stonem.
Dendrobium crystallinum Reichb.
C. circinans (Berk.) Vogl.
Allium cepa L.
A. fistulosum L.
A. odorum L.
A. sp.
C. coffeanum Noack.
Coffea arabica L.
C. corchorum Ikata et Tanaka
Corchorus capsularis L.
C. elasticae Tassi
Ficus elastica Roxb.
C. erumpens Sacc.
Amaranthus spinosus L.
Ricinus communis L.
C. erumpens (Sacc.) Sacc. var. *amaranthi* Teng
Amaranthus mangostanus L.
A. spinosus L.

- Colletotrichum euryae* Saw.
Eurya japonica Thunb.
- C. falcatum** Went (*Physalospora*
tucumanensis Speg.)
Saccharum officinarum L.
S. sinense Roxb.
- C. follicolum** Nishida
Citrus grandis Osb.
C. nobilis Lour.
- C. gloeosporioides** Penz.
Citrus deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. grandis Osb. f. *buntan*
C. junos Tanaka
C. lemon (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka*
C. medica L.
C. medica L. var. *sarcodactylis* Sw.
C. microcarpa Bge.
C. natsudaoidai Hay.
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sabon Sieb.
C. sinensis (L.) Osb.
C. sinensis (L.) Osb. *sekkan*
Hay.
C. suhoiensis Tanaka
C. tangerina Tanaka
C. unshiu Marc.
C. sp.
- C. glycines** Hori (*Glomerella*
glycines (Hori) Lehman et. Wolf)
Glycine max (L.) Merr.
- C. gossypii** South. (*Glomerella*
gossypii (South.) Edg.)
Gossypium arboreum L.
G. barbadense L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
G. sp.
- C. graminicolum** (Ces.) Wils.
Alópecurus japonicus Steud.
Andropogon sorghum Brot.
var. *sudanensis* Piper.
Avena sativa L.
Bromus japonicus Thunb.
Digitaria sanguinalis (L.)
Scop.
Echinochloa crus-galli (L.)
Beauv.
- Eleusine coracana* (L.) Gaertn.
Panicum sanguinale L.
Polypogon litoralis (With.)
Smith
Setaria glauca Beauv.
Sorghum vulgare Pers.
Triticum aestivum L.
- C. hibisci** Poll.
Hibiscus cannabinus L.
- C. higginsanum** Sacc.
Brassica campestris L.
B. campestris L. var. *purpuraria* Bailey
B. juncea L.
B. pekinensis Rupr.
Raphanus sativus L.
- C. hydrangeae** Saw.
Hydrangea chinensis Max.
- C. indicum** Dastur.
Gossypium arboreum L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
G. sp.
- C. lagenarium** (Pass.) Ell. et
Halst.
Benincasa hispida Cogn.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis melo L.
C. melo L. var. *conomon* Mak.
C. melo L. var. *makuwa* Mak.
C. sativus L.
Cucurbita maxima Duch.
C. moschata Duch.
C. moschata Duch. var. *toonas*
Mak.
C. pepo L.
Lagenaria siceraria (Molina)
Stanley
L. siceraria (Molina) Stanley
var. *clavata* Ser.
L. siceraria (Molina) Stanley
var. *gourda* Ser.
Luffa cylindrica Roem.
- C. lebbek** (Syd.) Petr.
Albizzia lebbek (L.) Benth.
- C. lillacearum** Ferr.
Hemerocallis aurantiaca Baker
- C. lindemuthianum** (Sacc. et
Magn.) Bri. et Cav. (*Glomerella*
lindemuthianum (Sacc. et
Magn.) Shear et Wood)
Dolichos lablab L.

Collectotrichum lindemuthianum

- (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav.
Glycine max (L.) Merr.
Phaseolus lunatus L.
P. mungo L.
P. radiatus L. var. *typicus* Prain.
P. vulgaris L.
P. sp.
Pisum sativum L.
Vicia faba L.
Vigna sinensis Endl.
C. lini (West.) Tochinai
Linum usitatissimum L.
L. sp.
C. lycopersici Chester
Lycopersicum esculentum Mill.
C. malvarum Southw.
Malva sylvestris L.
C. medicaginis-denticulatae Saw.
Medicago hispida Gaertn.
C. montemartini Togn. var.
rhodeae Trav.
Rhodea japonica Roth.
C. morifolium Hara
Morus alba L.
C. nicotianae Aversa.
Nicotiana tabacum L.
C. nigrum Ell. et Halst.
 (= *Vermicularia capsici* Syd.)
Capsicum annuum L.
C. annuum L. var. *grossum* Bail.
C. frutescens L.
C. sp.
Lycopersicum esculentum Mill.
Solanum melongena L.
C. omnivorum de Bary
Beta vulgaris L.
B. vulgaris L. var. *rapacea* Kbh.
C. orchidearum Allesch.
Bulbophyllum sp.
C. orchidearum Allesch. f.
cymbidii Allesch.
Cymbidium virescens Lindl.
C. sp.
C. pachyrrhizi Saw.
Pachyrrhizus erosus (L.) Urb.
P. tuberosus Spreng.

- C. panacicola** Nak et Tak.
Panax pseudo-ginseng C. A. Meyer
C. papayae (Henn.) Syd.
Carica papaya Linn.
C. parthenocissi (Shen) Teng
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Pl.
C. pekinensis Katsura
Abutilon avicennae Gaertn.
C. phaseolorum Tak.
Phaseolus aureus Roxb.
P. radiatus L.
P. radiatus L. var. *aurea* Prain.
C. phomoides (Sacc.) Chester
Lycopersicum esculentum Mill.
C. pinelliae Saw.
Pinellia ternata Breit.
 (C. *piri* Noack. f. *tirolionse* Bubak)
Pyrus sp.
C. pisi Pat
Pisum sativum L.
C. ricini Bubak et Frag.
Ricinus communis L.
C. septorioides Sacc.
Bambusa vulgaris Wendl.
C. sorauerianum (Allesch.) Hori
Codiaeum variegatum (L.) Bl.
C. spinaciae Ell. et Halst.
Spinacia oleracea L.
C. tabacum Boning
Nicotiana tabacum L.
C. trevesiae (Keiss.) Patr.
Brassaiopsis papayoides Hand.-Mzt.
C. tricyrtii Teng
Tricyrtis formosana Baker
T. sp.
C. trifolii Bain
Medicago sativa L.
C. truncatum (Schw.) Andr. et Moore
Phaseolus limensis Macf.
P. vulgaris L.
Coniosporium arundinis (Corda) Sacc.
Phragmites communis Trin.

Coniosporium bambusae (Theum.
et. Bolle) Sacc.

Bambusa sp.

Phyllostachys sp.

C. saccardianum Teng

Phyllostachys sp.

C. shiraianum (Syd.) Bubak

Bambusa vulgaris Wendl.

C. spondiadis Keissler

Spondias sp.

Coniothecium chomathosporium

Corda

Malus pumila Mill.

M. pumila Mill. var. *domestica*
Schneid.

C. citri McAlp.

Citrus nobilis Lour.

C. intricatum Peck

Pyrus communis L.

P. sinensis Lindl. var. *culta*

Mak.

P. sp.

Coniothyrium agaves (Mont.)

Sacc.

Agave americana L.

C. aleuritis Teng.

Aleurites sp.

C. brevisporum Miyabe

Oryza sativa L.

C. celtidicola Miura

Celtis bungeana Bl.

C. chamaeropsis Sacc. et Syd.

Chamaerops humilis

C. concentricum (Desm.) Sacc.

Yucca filamentosa L.

C. diplodiella (Speg.) Sacc.

Vitis amurensis Rupr.

V. labrusca L.

V. vinifera L.

C. dumei Br. et Cav.

Rhamnus davuricus Pall.

C. fraxini Miura

Fraxinus chinensis Roxb. var.
rhynchophylla Hemsl.

C. fusciculatum Sacc.

Morus alba L.

C. humuli Hollos

Humulus japonicus Sieb. et
Zucc.

C. japonicum Miyake

Oryza sativa L.

C. kraunhiae Miyake

Wistaria floribunda

C. mizogamii Togashi

Paliurus ramosissimus Poir.

C. nakatae Hara

Prunus persica Stokes

P. persica Stokes var. *vulgaris*
Max.

C. olivaceum Bon.

Cycas revoluta Thunb.

Rhus verniciflua Stokes

Zizyphus sativa Gaertn.

C. olivaceum Bon. var.

phylogenum Sacc.

Rhododendron cucullatum

H.-M.

C. piricola Potebnia

Prunus pseudocerasus Lindl.

Pyrus bretschneideri Rehd.

P. calleryana Decne.

P. communis L.

P. serotina Rehd.

P. sinensis Lindl. var. *culta*

Mak.

P. sp.

C. pirinum (Sacc.) Sheld.

Malus asiatica Nakai

M. pumila Mill.

M. pumila Mill. var. *domestica*
Schneid.

M. sp.

Prunus manshurica Koehne.

C. populicola Miura

Populus laurifolia Ledeb.

P. simonii Carr.

C. rhamni Miyake

Rhamnus sp.

C. sacchari (Mass.) Pril. et

Delacr.

Saccharum officinarum L.

C. spiraeae Miyake

Spiraea pubescens Turcz.

C. tillae Miyake

Tilia cordata Mill.

C. vitivora Miura

Vitis vinifera L.

Corticium Bambusae Burt.

Phyllostachys sp.

C. centrifugum (Lev.) Bres.

Abutilon striatus Dicks.

Agave rigida Mill. var. *sisa-*
lana Pers.

Corticium centrifugum (Lev.)

Bres.

- Allium cepa* L.
A. fistulosum L.
Alopecurus pratensis L.
Amaranthus tricolor L.
Amorphophallus gigantiflorus
 Hay.
A. konjac K. Koch.
Arachis hypogaea L.
Artemisia lactiflora Wall.
Avena elastica L.
A. flavescens L.
A. sativa L.
Bambusa sp.
Bauhinia sp.
Beta vulgaris L.
Boehmeria nivera Gaud.
Brassica chinensis L. (cont.)
B. oleracea L.
B. pekinensis Rupr.
Cammelina nudiflora L.
Canavalia ensiformis DC.
Carica papaya Linn.
Centaurea cynus L.
Chloranthus inconspicuus Sw.
Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
C. sinense Sab.
C. sinense Sab. var. *hortensis*
 Mak.
Cicer arietinum L.
Cinnamomum camphora Nees
 et Ebern.
Citrullus vulgaris Schrad.
Citrus grandis Osb.
C. limonia Osb.
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sabon Sieb.
C. sinensis (L.) Osb.
Clerodendrin fragrans Vent.
Colocasia esculenta Schott.
C. sp.
Commelina nudiflora L.
Corchorus capsularis L.
Coreopsis drummondii Torr.
 et Gray
C. tinctoria Nutt.

- Cosmos bipinnatus* Cav.
Crotalaria juncea L.
Cryptomeria japonica Don.
Cryptotaenia japonica Hassk.
Cucumis melo L.
C. sativus L.
C. pepo L.
Daucus carota L.
Dendrocalamus latiflorus
 Munro
Dianthus chinensis L.
D. sinensis L.
Dioscorea japonica Thunb.
Duranta plumieri Jacq.
Echinochloa crus-galli (L.)
 Beauv.
Eleusine coracana (L.) Gaertn.
Eupatorium formosanum Hay.
Fagopyrum vulgare Hill.
Ficus carica L.
Glycine max L.
Gossypium arboreum L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
G. sp.
Helianthus annuus L.
H. tuberosus L.
Hibiscus cannabinus L.
Hippeastrum reginae Hers.
Indigofera arrecta Hochst.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Jasminum sambac Soland
Kochia scoparia Schrad.
Lactuca sp
Lagenaria siceraria (Molina)
 Stanley
Lolium italicum A. Br.
Luffa cylindrica Roem.
Lycopersicum esculentum
 Mill.
Malus spectabilis Borkh.
Manihot utilissima Pohl.
Maranta arundinacea L.
Medicago lupulina L.
M. sativa L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L. var. *pipe-*
 rascens Malinvaud
Momordica charantia L.

Corticium centrifugum (Lev.)

Bres.

- Morus acidosa* Griff.
M. alba L.
Musa sp.
Nicotiana tabacum L.
Oryza sativa L.
Passiflora ceorulea L.
Phaseolus lunatus L.
P. vulgaris L.
Pisum sativum L.
Poa serotina Roxb.
Polygonum multiflorum
 Thunb.
Prunus persica Stokes
Pyrus bretschneideri Rehd.
P. sp.
Radernachera sinica (Hance)
 Hemsl.
Ricinus communis L.
Saccharum officinarum L.
Sesamum indicum L.
Setaria italica L.
Solanum melongena L.
S. nigrum L.
S. tuberosum L.
Sorghum vulgare Pers.
Tetrapanax papyrifera C
 Koch.
Thea sinensis L.
Trifolium hybridum L.
T. pratense L.
T. repens L.
Triticum aestivum L.
T. vulgare Vill. var.
Verbena officinalis L.
Vicia faba L.
Vigna sinensis Endl.
Viola odorata L.
Vitis vinifera L.
Xanthium strumarium L.
Zea mays L.
Zephyranthes candida Herb.
Zingiber mioga Rosc.
Z. officinale Rosc.
Zinnia elegans L.
- C. gramineum** Ikata et Matsuma
Triticum aestivum L.
- C. salmonicolor** Berk. et Br.
Acacia richii A. Br.
Bombax malabaricum DC.

Citrus aurantium Linn.

- C. grandis* Osb. f. *buntan*
C. natsudaoides Hay.
C. poonensis Tanaka
C. sabon Sieb.
C. tankan Hay.
Citrus unshiu Marc.
C. sp.
Duranta plumieri Jacq.
Ficus carica L.
Gardenia jasminoides Ell.
Malus pumila Mill. var. *dome-*
 stica Schneid.
Michelia fuscata Bl.
Morus acidosa Griff.
Nerium odorum Soland
Pithecolobium dulce Benth.
Tabernaemontana coronaria R.
 Br.

Coryneliospora fruticicola (Pat.)

Fitz.

- Myrsine africana* L.
M. sp.

Cerynespora melonis (Cke.)

Gussow.

- Cucumis melo* L.

Coryneum beyerinckii Oud.

- Prunus persica* Stokes var.
 vulgaris Max.
P. salicina Lindl.

C. crataegicola Miura

- Crataegus pinnatifida* Bge.

C. foliicolum Fuck.

- Malus pumila* Mill. var. *dome-*
 stica Schneid.

C. microstictum Berk. et Br.

- Crataegus pinnatifida* Bge.

C. rosaecola Miura

- Rosa xanthina* Lindl.
R. sp.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.

- Delphinium delavayi* Fr.
Paeonia albiflora Pallas
P. suffruticosa Andr.
Pinus yunnanensis Franch.

C. gentianeum Thuern.

- Gentiana rigescens* Franch.
G. yunnanensis Franch.

- Cronartium keteleeriae** Tai
Keteleeria evelyniana Mast.
- C. quercum** Miyabe
Castanea mollissima Bl.
Pinus armandi Franch.
P. tabulaeformis Carr.
P. yunnanensis Franch.
P. sp.
Quercus acutissima Carr.
Q. dentata Thunb.
Q. glandulifera Bl.
Q. serrata Thunb.
Q. suber L.
Q. variabilis Bl.
Q. sp.
- C. ribicola** Fisch. et Waldh.
Ribes coeleste Jancz.
R. formosana Hay.
R. manshuricum Kom.
R. sp.
- Crossopora antidesmae-dioicae**
(Syd.) Arthur et Cummins
Antidesma gracile Hemsl.
- Cryptocoryneum millettiae** Saw.
Millettia taiwaniana Hay.
- Cryptomyces theae** Saw.
Thea sinensis L.
- Cryptosporella viticola** (Red.)
Shear
(參看 *Fusicoccum viticolum* Red.)
- Curvidigitus daphniphylli** Saw.
Daphniphyllum glaucescens Bl.
- Curvularia geniculata** (Fr. et Earle) Boed.
Oryza sativa L.
- C. lunata** (Wakker) Boed.
Oryza sativa L.
- Cylindrosporium dioscoreae**
Miyabe et Ito
Dioscorea alata L.
D. batatas Decne.
D. japonica Thunb.
D. quinqueloba Thunb.
- C. frigidum** (Sacc.) Vassil
Evonymus japonicus Thunb.
- C. humuli** Ell. et Ev.
Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
- C. komarowi** Jacz.
Polygonatum sp.
- C. padi** Karst.
Prunus mume Sieb. et Zucc.
P. padus L.
P. persica Stokes
- C. phalaenopsidis** Saw.
Phalaenopsis aphrodite Reichb.
- C. pruni-tomentosi** Miura
Prunus tomentosa Thunb.
- C. vicii** Miura
Vicia amoena Fisch.
V. sp.
- Cytospora carphosperma** Sacc.
Pyrus lindleyi Rehd.
P. serotina Rehd.
Pyrus sp.
- C. chrysosperma** (Pers.) Fr.
(*Valsa sordida* Nitschlse)
Populus laurifolia Ledeb.
P. nigra L. var. *pyramidalis* Spach.
P. sp.
Salix sp.
- C. microspora** (Corda) Rabh.
Quercus sp.
- C. sacchari** Butl.
Saccharum officinarum L.
- Dactylium alpiniae** Saw.
Alpinia speciosa K. Schum.
- Dasturella divina** (Syd.) Mundk.
et Khesw.
Bambusa oldhami Munro
B. shimadai Hay.
B. stenostachys Hack.
Dendrocalamus latiflorus Munro
- Dasyscypha agassizii** (Berk. et Curt.) Sacc.
Abies delavayi Franch. var. *forrestii* Cheng
- Dendrographium Bambusae** Saw.
Bambusa oldhami Munro
- Dendrophoma convallariae** Cav.
Convallaria majalis L.
- D. obscurana** (Ell. et Ev.) Anders.
Erugaria sp.

- Dermatodothis javanica** Racib.
Symplocos sp.
- Dermatosorus eleocharidis** Saw.
Eleocharis dulcis (Burm. f.)
 Trin. et Hensch.
- Derminus musae** Saw.
Musa cavendishii L.
Diaporthe ambigna (Sacc.)
 Nitschke
- Diaporthe ambigna** (Sacc.)
 Nitschke
Pyrus communis L.
 P. sp.
- D. batatatis** Harter et Field
 (参看 *Phomopsis batatae* Ell. et
 Halst.)
- D. citri** (Fawcett) Wolf
 (参看 *Phomopsis citri* Fawcett)
- D. eres** Nitsch.
Prunus avium L.
- D. phaseolorum** (Cke. et Ell.)
Phaseolus limensis Macf.
- D. pomigena** (Schw.) Miura
Malus pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
- D. sojae** Lehman
 (参看 *Phomopsis sojae* Lehman)
- D. vexans** Gratz.
 (参看 *Phomopsis vexans* (Sacc.
 et Syd.) Harter)
- Diatrype chlorosarca** Berk. et Br.
Rubus sp.
- D. microstega** Ell. et Ev.
Ligustrum lucidum Ait.
- Diatrypella quercina** (Pers.) Nits.
Quercus sp.
- Dictylenchus dipsaci** (Kuhn.)
 Filipj.
Arachis hypogaea L.
- Didymellina iridis** (Desm.) Hoehn.
Iris tectorum Max.
- Didymoporella lemanensis**
 (Goidge) Hirat. f.
Toddalia asiatica Lam.
- Didymosporium liquidambaris**
 Teng
Liquidambar formosana Hance
- Dimerina bambusicola** Teng
Bambusa sp.

- Dimerium elegans** Syd.
Lithocarpus variolosa (Franch.)
 Chun.
- Diplocarpon rosae** (Fr.) Wolf
 (*Actinonema rosae* (Lib.) Fr.)
Rosa chinensis Jacq.
R. laevigata Mich.
R. multiflora Thunb.
R. rugosa Thunb.
R. xanthina Lindley
 R. sp.
- Diplodia catalpae** Speg.
Catalpa speciosa Warder
- D. frumenti** Ell. et Ev.
Zea mays L.
- D. gossypina** Cke.
 (*Physalospora gossypina* Stev.)
Gossypium arboreum L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
 G. sp.
- D. juniperi** Westd.
Juniperus chinensis L.
- D. macrospora** Earle
Zea mays L.
- D. medicaginis**
Medicago sativa L.
- D. moricola** Cke. et Ell.
Morus alba L.
- D. natalensis** Evan.
 (*Physalospora rhodina* Berk. et
 Curt.)
Agalma lutchuense Nakai.
Citrullus vulgaris Schrad.
Citrus deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. lemon (Burm. f.) Tanaka
 var. *eureka*
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. tankan Hay.
 C. sp.
Eugenia jambos Linn.
Fortunella crassifolia Sw.
 F. sp.
Malus asiatica Nakai
Pyrus bretschneideri Rehd.
P. serotina Rehd.
- D. ricini** Sacc. et Roum.
Ricinus communis L.

- Diploidea salicina** Lev.
Salix sp.
- D. sophorae** Speg. et Sacc.
Sophora sp.
- D. spiraeina** Sacc.
Spiraea blumei Don.
- D. zeae** (Schw.) Lev.
Zea mays L.
- Diplodiella oryzae** Miyake
Oryza sativa L.
- Diplodina destructiva** (Plowr.) Petr.
Lycopersicum esculentum Mill.
Solanum melongena L.
- Discella carbonacea** (Fr.) Berk. et Br.
Salix sp.
- Discula microsperma** (Berk. et Br.) Sacc.
Salix sp.
- Doassansia opaca** Setch.
Sagittaria trifolia L.
- Doassansiopsis heriana** (P. Henn.) Shen
Sagittaria sagittifolia L.
S. sp.
- Dothidea tetraspora** B. et Br. var. *citricola* Sacc.
Poncirus trifoliata Raf.
- Dothiorella phaseoli** (Maubl.) Pat. et Syd.
Phaseolus aureus Roxb.
P. chrysantha Savi
- D. philippinensis** Pat.
Sesamum orientale L.
- Ectostroma oryzae** Saw.
Oryza sativa L.
- Elaeodema cinnamomi** Syd.
Cinnamomum camphora Nees et Ebern.
C. *camphora* Nees et Ebern. var. *nominale* Hay.
C. *cassia* Blume
C. *micranthum* Hay.
C. *pedunculatum* Nees
C. sp.
- E. cinnamomi** Syd. f. *brunnea* Keissler
Cinnamomum glanduliferum Meisn.
- E. floricola** Keissler
Cinnamomum pittosporoides H.-M.
- Elsinoe ampelina** (de Bary) Shear (参看 *Sphaceloma ampelinum* de Bary)
- E. australis** Bit. et Jenk. (参看 *Sphaceloma fawcetti* Jenk. var. *scabiosa* Jenk.)
- E. batatas** Jenk. et Vieg. (参看 *Sphaceloma batatas* Saw.)
- E. dolichi** Jenk., Bit. et Cheo
Dolichos lablab L.
- E. fawcetti** Bit. et Jenk. (参看 *Sphaceloma fawcetti* Jenk.)
- Endodothella hambusae** (Rabh.) Theiss. et Syd.
Bambusa sp.
- Endomycopsis mali** (Lewis) Dekker
Malus pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
- Endothia gyosa** (Schw.) Fr.
Quercus sp.
- E. parasitica** (Murr.) P. J. et Anders
Castanea cruenta Sieb. et Zucc.
C. *mollissima* Bl.
- E. radicalis** (Schw.) de Not.
Acanthopanax sp.
Quercus sp.
- Englerulaster sinensis** Syd.
Ilex ficoidea
- Entyloma australe** Speg.
Physalis angulata L.
P. *minima* L.
- E. eleocharidis** (Saw.) Ling
Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. et Hensch.
- E. oryzae** Syd. (*Balansia oryzae* (Syd.) Naras. et Thirum.)
Oryza sativa L.
- Ephelis japonica** P. Henn.
Paspalum scrobiculatum L.
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
P. *purpurascens* Mak.
Setaria lutescens (Wieg.) F. E. HuBb
S. *viridis* Beauv.

Ephelis oryzae Syd.
Echinochloa crus-galli (L.)
 Beauv.
Oryza sativa L.
Pennisetum sp.

Epichloe bambusae Pat.
Phyllostachys sp.

E. cinerea B. et Br.
Andropogon sp.
Pennisetum sp.
Sporobolus elongatus R. Br.
S. indicus (L.) R. Br.
S. sp.

E. sporoboli Teng
Sporobolus sp.

E. typhina (Pers.) Tul.
Agropyron ciliare (Trin.)
 Franch.
A. cristatum (L.) Gaertn.
A. semicostatum Nees
Bromus sp.
Poa sp.

Epicoccum hyalopes Miyake
Coix lachryma-jobi L.
Oryza sativa L.

E. neglectum Desm.
Oryza sativa L.
Zea mays L.

E. nigrum Link.
Beta vulgaris L.

E. sinense Petr.
Astragalus sinicus L.

E. tritici P. Henn.
Hordeum sativum Jessen var.
vulgare Hack.
Triticum aestivum L.

Erinella neilliae Keissler
Neillia sinensis Oliv.

E. tomatella Penz. et Sacc.
Salix sp.

Erysiphe cichoracearum DC.
Actinostemma lobatum Max.
Adenophora polymorpha Ledeb
A. remotiflora Miq.
Artemisia argyi Lev. et Van.
A. japonica Thunb.
A. mongolica Fisch.
A. vulgaris L.

A. sp.
Centella asiatica (L.) Urb.
Chrysanthemum indicum L.
Cinnamomum camphora Nees
 et Ebern. var. *nominale* Hay.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis melo L. var. *conomon*
 Mak.

C. sativus L.
C. sp.
Cucurbita maxima Duch.
C. moschata Duch.
C. pepo L.
C. sp.

Helianthus annuus L.
Inula britannica L.

I. sp.
Luffa cylindrica Roem.
Lycium chinense Mill.
Mallotus japonicus Muell.-Arg.
Melilotus sp.
Mentha sp.

Momordica charantia L.
Nicotiana longiflora Cav.
N. tabacum L.
Papaver somniferum L.
Patrinia lupestris Turcz.
Plantago major L.
P. major L. var. *asiatica*
 Decne.

Rubia cordifolia L.
Scorzonera albicaulis Bge.
S. austriaca L.
S. mongolica Max.
Scutellaria baikalensis Georgi
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
Siegesbeckia orientalis L.
Sonchus arvensis L.
Veronicastrum virginicum
 (L.) Farwell

E. galeopsidis DC.
Elscholtzia stauntoni Benth.
E. sp.
Leonurus macranthus Max.
L. sibiricus L.
L. sp.
Phlomis umbrosa Turcz.

E. graminis DC.
Agropyron ciliare (Trin.)
 Franch.

Erysiphe graminis DC.

- A. cristatum* (L.) Gaertn.
A. semicostatum Nees
A. sp.
Avena sativa L.
Brachypodium japonicum Miq.
Bromus japonicus Thunb.
Hordeum sativum Jessen
H. sativum Jessen var. *hexastichon*
H. sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
H. vulgare L.
Poa sp.
Triticum aestivum L.
T. sativum L.
T. vulgare Vill.

E. pisi DC.

- Astragalus sinicus* L.
Medicago sativa L.
Phaseolus aureus Roxb.
P. radiatus L.
P. radiatus L. var. *typicus* Prain.
Pisum sativum L.
Trifolium lupinaster L.
Vigna sinensis Endl.

E. polygoni DC.

- Actinostemma labatum* Maxim.
Aeschynomene indica L.
Alysicarpus vaginalis DC.
Anemone japonica S. et J.
Astragalus melilotoides Pall.
Begonia chinensis A. DC.
B. evansiana Andr.
B. sinensis A. DC.
B. yunnanensis Levl.
Brassica campestris L.
B. juncea L.
B. napiformis Bailey
B. napus L.
B. sp.
Calendula arvensis L.
Cassia mimosoides L.
Castanopsis concolor Rehd. et Wills.
C. delavayi Franch.
C. sp.
Clematis mandshurica Rupr.

Desmodium sp.

- Dolichos lablab* L.
Elscholtzia patrini (Lepech.) Garcke
E. stauntoni Benth.
Fagopyrum vulgare Hill.
Glycines ussuriensis Regel. et Maack.
G. sp.
Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Incarvillea sinensis Lam.
Indigofera suffruticosa Mill.
I. tinctoria L.
Lathyrus odoratus L.
L. palustris Linn.
Lespedeza bicolor Turcz.
L. dahurica Schindler
L. sericea Miq.
L. tomentosa Sieb.
L. sp.
Lycopersicon esculentum Mill.
Medicago hispida Gaertn.
M. lupulina L.
M. sativa L.
M. sp.
Melilotus indica (L.) Allesch.
M. officinalis Desr.
M. suaveolens Ledeb.
M. sp.
Muehlenbeckia platyclada Meisn.
Paeonia obovata Max. var. *japonica* Mak.
Phaseolus mungo L.
P. vulgaris L.
Phlomis umbrosa Turcz.
Pisum sativum L.
Plantago depressa Willd.
Plectranthus eriocalyx Dunn
P. glaucocalyx Max.
Polygonum aviculare L.
P. nodosum Pers.
P. orientale L.
P. sp.
Robinia pseud-acacia L.
Rumex crispus L.
R. sp.
Sambucus adnata Wall.
S. javanica Bl.
Scabiosa superba Gruening

Erysiphe polygoni DC.*Sedum aizoon* L.*Symplocos paniculata*

(Thunb.) Miq.

Thalictrum delavayi Franch.*T. reticulatum* Franch.*T. sp.**Trifolium pratense* L.*T. sp.**Vicia amoena* Fisch.*V. dasycarpa* Tenore*V. ervilla* Willd.*V. faba* L.*V. monantha* Retz.*V. sativa* L.*V. tetrasperma* (L.) Moench.*V. unijuga* Al. Br.*V. villosa* Roth.*V. sp.**Vigna sinensis* Endl.**E. polygoni** DC. var. **epimedii**

Tai

Epimedium sp.**Euryachora betulina** (Fr.) Schroet.*Betula chinensis* Max.**Exobasidium gracile** (Shirai) Syd.*Camellia oleifera* Abel.*Thea yunnanensis* Pitard**E. hemisphaericum** Shirai*Rhododendron pseudo-chrysanthum* Hay.*R. racemosum* Franch.*R. simsii* Planch.**E. japonicum** Shirai*Rhododendron* sp.**E. pentasporium** Shirai*Rhododendron* sp.**E. pieridis** P. Henn.*Lyonia ovalifolia* (D. Don.) H.-M.**E. reticulatum** Ito et Saw.*Thea sinensis* L.**E. rhododendri** Cramer*Rhododendron wilsonii* Hemsl. et Wils.*R. sp.***E. vexans** Mass.*Thea sinensis* L.**Farysia orientalis** Ling*Carex baccans* Nees**F. subolivacea** (P. Henn.) Cif.*Carex filicina* Nees*C. nemostachys* Steud.*C. rhynchiophora* Franch.*C. simulans* C. B. Clarke**Fomes annosus** (Fr.) Cke.*Abies fabri* Craib.*A. georgei* Ou*Picea brachytyla* Pritz.*P. likiangensis* (Franch.)

Pritz.

Tsuga yunnanensis (Franch.)

Mast.

F. connatus (Weinm.) Gill.*Albizia* sp.**F. fomentarius** (L.) Gill.*Betula albo-sinensis* Burk.*Populus szechuanica* Schneid.*P. tremula* L. var. *daurica*

Schneid.

Quercus semicarpifolia Smith*Q. sp.***F. fulvus** (Scop.) Gill.*Prunus armeniaca* L.*P. daurica* Franch.*P. persica* Stokes*P. persica* Stokes var. *vulgaris* Max.*P. sp.***F. ignarius** (L.) Kickx*Betula albo-sinensis* Burk.*B. sp.**Cornus* sp.*Populus szechuanica* Schneid.*P. tremula* L. var. *daurica*

Schneid.

*P. sp.**Salix* sp.**F. officinalis** (Vill.) Ames*Pinus yunnanensis* Franch.**F. pini** (Thore) Karst.*Abies chensiensis* van Tiegh.*A. delavayi* Franch.*A. georgei* Ou*A. recurvata* Mast.*Larix potaninii* Batal.*Picea likiangensis* (Franch.)

Pritz.

P. neoveitchii Mast.*P. purpurea* Mast.*Pinus armandi* Franch.*P. tabulaeformis* Carr.*P. yunnanensis* Franch

- Fomes pini** (Thore) Karst.
Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast.
- F. pinicola** (Sw.) Cke.
Abies chensiensis van Tiegh.
A. faberi Craib.
A. fargesii Franch.
A. georgei Ou
Larix potaninii Batal.
Picea asperata Mast.
P. brachytyla Pritz.
P. likiangensis (Franch.) Pritz.
P. purpurea Mast.
Pinus yunnanensis Franch.
Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast.
T. sp.
- F. robustus** Karst.
Abies faberi Craib.
A. georgei Ou
Picea brachytyla Pritz.
Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast.
- F. roseus** (Alb. et Schw.) Cke.
Picea asperata Mast.
- Fumago vagans** Pers.
Nicotiana tabacum L.
Prunus persica Stokes
Quercus schottiana Rehd. et Wils.
Saccharum officinum L.
Salix babylonica L.
- Fusarium anguloides** Sherb.
Gossypium hirsutum L.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Pisum sativum L.
Solanum melongena L.
Vicia faba L.
- F. angustum** Sherb.
Allium cepa L.
- F. annuum** Leodian
Capsicum annuum L.
- F. aquaeductum** (Radik. et Rabh.) Lagerh.
Hordeum vulgare L.
Pinus massoniana Lamb.
- F. arthrosporoides** Sherb.
Oryza sativa L.
Vicia faba L.
- F. avenaceum** (Fr.) Sacc.
Allium cepa L.
Avena sativa L.
- Brassica chinensis* L.
C. deliciosa Tenore
C. nobilis Lour.
Cucurbita moschata Duch.
Daucus carota L.
Dianthus caryophyllus L.
Hordeum vulgare L.
Juglans regia L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Malus pumila Mill.
Paspalum scrobiculatum L.
Pinus massoniana Lamb.
Prunus persica Stokes
Staria italica Beauv.
Solanum tuberosum L.
Sorghum vulgare Pers.
Trifolium repens L.
Triticum aestivum L.
Vicia faba L.
Vitis vinifera L.
Zea mays L.
- F. avenaceum** (Fr.) Sacc. var. *fabae* Yu
Vicia faba L.
- F. baetridioides** Wr.
Cucumis sativus L.
Narcissus poeticus L.
Pinus massoniana Lamb.
- F. bambusicola** Hara
Sinocalamus affinis (Rendie) McClure
- F. bulbigenum** Cke. et Mass.
Asparagus officinalis L.
Citrullus vulgaris Schrad.
- F. bulbigenum** Cke. et Mass. var. *batatae* Wr.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
- F. bulbigenum** Cke. et Mass. var.
Lycopersicum esculentum Mill.
- F. bulbigenum** Cke. et Mass. var. *niveum* (Smith) Wr.
Cucumis melo L.
C. melo L. var. *makuwa* Mak.
C. sativus L.
- F. bulbigenum** Cke. et Mass. var. *tracheiphilum* (Smith) Wr.
Glycine max (L.) Merr.
Phaseolus aureus Roxb.
- F. cavispermum** Corda
Pinus massoniana Lamb.

- Fusarium cerasi** Roll. et. Ferry
Prunus persica Stokes
- F. ciliatum** Link
Populus tomentosa Carr.
- F. coeruleum** (Lib.) Sacc.
Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
Gossypium hirsutum L.
Solanum tuberosum L.
- F. concolor** Reink.
Citrus deliciosa Tenore
C. nobilis Lour.
C. sinensis (L.) Osb.
Gossypium hirsutum L.
Hordeum vulgare L.
Setaria italica Beauv.
Vicia faba L.
- F. conglutinans** Woll.
Brassica campestris L.
- F. conglutinans** Wr. var. *betate*
Stewart
Beta vulgaris L.
- F. conglutinans** Wall. var. *callistephi* Beach.
Callistephus chinensis Nees.
- F. culmorum** (Smith) Sacc.
Asparagus officinalis L.
Avena sativa L.
Beta vulgaris L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita moschata Duch.
Daucus carota L.
Dianthus caryophyllus L.
D. chinensis L.
Hordeum vulgare L.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Pinus massoniana Lamb.
Secale cereale L.
Setaria italica Beauv.
Sorghum vulgare Pers.
Triticum aestivum L.
Zea mays L.
- F. dianthi** Prill. et Del.
Dianthus chinensis L.
- F. dimerum** Penz.
Citrus deliciosa Tenore
C. nobilis Lour.
- F. diversisporum** Sherb.
Setaria italica Beauv.
Zea mays L.
- F. equiseti** (Corda) Sacc.
Beta vulgaris L.
Coix lachryma-jobi L.
Setaria italica Beauv.
Triticum aestivum L.
- F. equiseti** (Corda) Sacc. var. *bullatum* (Sherb.) Wr.
Hibiscus cannabinus L.
Vicia faba L.
- F. flavum** (Fr.) Wr.
Capsicum annuum L.
- F. graminearum** Schw.
(*Gibberella zeae* (Schw.) Petch)
Agropyron Ciliare (Trin.) Franch.
A. cristatum (L.) Gaertn.
A. semicostatum Nees
Avena fatua L.
A. sativa L.
A. sp.
Coix lachryma-jobi L.
Dactylis glomerata L.
Gossypium herba-ceum L.
Hordeum sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
Lolium multiflorum L.
L. perenne L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
Setaria italica Beauv.
Triticum aestivum L.
T. sativum L.
T. turgidum
T. vulgare Vill.
Vicia faba L.
Zea mays L.
- F. graminum** Corda
Vicia faba L.
- F. heterosporium** Nees
Coix lachryma-jobi L.
Hordeum vulgare L.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Paspalum sp.
Pennisetum sp.
Setaria italica Beauv.
- F. javanicum** Koord. (*Hypomyces ipomoeae* (Halst.) Wr.)
Callistephus chinensis Nees.
Cucurbita moschata Duch.
Glycines max (L.) Merr.

- Fusarium javanicum** Koord.
(*Hypomyces ipomoeae* (Haist.)
Wr.)
 Ipomoea batatas (L.) Poir.
 Iris tectorum Max.
 Thea sinensis L.
- F. javanicum** Koord. var.
 radicicola Wr.
 Callistephus chinensis Nees
- F. kuehnii** (Fuck.) Sacc.
 Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
- F. lactis** Pir. et Rib.
 Pisum sativum L.
- F. larvarum** Fuck.
 Citrus deliciosa Tenore
 C. sinensis (L.) Osb.
- F. lateritium** Nees (*Gibberella*
 baccata (Wallr.) Sacc.
 Allium cepa L.
 Callistephus chinensis Nees
 Citrus deliciosa Tenore
 C. sinensis (L.) Osb.
 Morus latifolia Bur.
 Pinus massoniana Lamb.
 Prunus persica Stokes
 Vitis vinifera L.
- F. lateritium** Nees var. *morii*
 Desm. (*Gibberella baccata*
 (Wallr.) Sacc. var. *moricola*
 (Ntrs.) Wr.)
 Morus alba L.
- F. lini** Bolley
 Linum usitatissimum L.
- F. merismoides** Corda
 Beta vulgaris L.
 Dahlia pinnata Cav.
 Vicia faba L.
- F. moniliforme** Sheld.
(*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.
 Allium cepa L.
 Asparagus officinalis L.
 Capsicum annuum L.
 Celosia cristata L.
 Citrus deliciosa Tenore
 C. nobilis Lour.
 C. sinensis (L.) Osb.
 Coix lachryma-jobi L.
 Cucumis melo L.
 Cucurbita moschata Duch.
 Gladiolus gandavensis var.
 Houtt.
- Gossypium arboreum* L.
 G. herbaceum L.
 G. sp.
 Hibiscus cannabinus L.
 Ipomoea batatas (L.) Poir.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Musa sapientum L.
 Oryza sativa L.
 Pinus massoniana Lamb.
 Setaria italica Beauv.
 Solanum melongena L.
 Sorghum vulgare Pers.
 Spinacia oleracea L.
 Trifolium repens L.
 Triticum aestivum L.
 Zea mays L.
- F. moniliforme** Sheld. var.
 subglutinans Wr. et Reink.
(*Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.
 var. *subglutinans* Edwards)
 Musa sapientum L.
 Saccharum officinarum L.
- F. nivale** (Fr.) Ces.
 Avena sativa L.
 Secale cereale L.
 Setaria italica Beauv.
 Triticum aestivum L.
- F. nivale** (Fr.) Ces. var. *setariae*
 Yu et Lou
 Setaria italica Beauv.
- F. orthoceras** App. et Wr.
 Allium cepa L.
 Asparagus officinalis L.
 Citrus deliciosa Tenore
 C. nobilis Lour.
 Cucumis sativus L.
 Spinacia oleracea L.
 Vicia faba L.
- F. orthoceras** App. et Wr.
 var. *longius* (Sherb.) Wr.
 Avena sativa L.
 Setaria italica Beauv.
- F. orthoceras** App. et Wr. var.
 psi Linford
 Pisum sativum L.
- F. oxysporum** Schlecht.
 Cucumis melo L.
 Fragaria chiloensis Duch.
 Iris tectorum Max.
 Lycopersicum esculentum
 Mill.

Fusarium oxysporum Schlecht.*Pinus massoniana* Lamb.*Solanum tuberosum* L.*Trifolium repens* L.**F. oxysporum** Schlecht. var.**aurantiacum** (Link.) Wr.*Beta vulgaris* L.*Citrus deliciosa* Tenore*C. nobilis* Lour.*Cucumis sativus* L.**F. oxysporum** Schlecht. var.**gladioli** Mass.*Gladiolus gandavensis* van
Houtt.**F. oxysporum** Schlecht. var.**nicotianae** Johnson*Nicotiana tabacum* L.**F. oxysporum** Schlecht. f. **fabae**

Yu et Fang

Vicia faba L.**F. oxysporum** Schlecht. f. 2 Wr.*Ipomoea batatas* (L.) Poir.**F. oxysporum** Schlecht. f. 6 Wr.*Callistephus chinensis* Nees**F. oxysporum** Schl. f. 7 Wr.*Allium cepa* L.**F. oxysporum** Schlecht. f. 8.

Snyder

Pisum sativum L.**F. poae** (Pk.) Wr.*Avena sativa* L.*Cucumis melo* L.*Dianthus caryophyllus* L.*Setaria italica* Beauv.*Triticum aestivum* L.*Zea mays* L.**F. redolens** Wr.*Hordium vulgare* L.*Spinacia oleracea* L.*Triticum aestivum* L.*Vicia faba* L.**F. reticulatum** Mont.*Beta vulgaris* L.*Cucurbita moschata* Duch**F. sambucinum** Fuck.*Citrus deliciosa* Tenore*C. nobilis* Lour.*C. sinensis* (L.) Osb.*Cucumis sativus* L.*Ricinus communis* L.**F. sambucinum** Fuck. f. 6. Wr.*Pinus massoniana* Lamb.**F. sarcochromum** (Desm.) Sacc.*Populus tomentosa* Carr.**F. scirpi** Lamb. et Fautr.*Avena sativa* L.*Citrus deliciosa* Tenore*C. nobilis* Lour.*Gladiolus gandavensis* van
Houtt.*Gossypium herbaceum* L.*Hordeum vulgare* L.*Pinus massoniana* Lamb.*Setaria italica* Beauv.**F. scirpi** Lamb. et Fautr. var.**acuminatum** (Ell. et Ev.) Wr.*Ipomoea batatas* (L.) Poir.**F. scirpi** Lamb. et Fautr. var.**caudatum** Wr.*Setaria italica* Beauv.**F. scirpi** Lamb. et Fautr. var.**compactum** Wr.*Setaria italica* Beauv.**F. semitectum** Berk. et Rev.*Lycopersicum esculentum* Mill.*Solanum melongena* L.**F. semitectum** Berk. et Rev. var**majus** Wr.*Asparagus officinalis* L.**F. solani** (Mart.) App. et Wr.*Allium cepa* L.*Callistephus chinensis* Nees*Citrus deliciosa* Tenore*C. nobilis* Lour.*Colocasia esculenta* Schott.*Cucumis melo* L.*C. sativus* L.*Gossypium hirsutum* L.*Ipomoea batatas* (L.) Poir.*Musa sapientum* L.*Solanum tuberosum* L.**F. solani** (Mart.) App. et Wr.**eumartii** (Carp.) Wr.*Solanum tuberosum* L.**F. solani** (Mart.) App. et Wr.var. **martii** (App. et Wr.) Wr.*Glycines max* (L.) Merr.*Pinus bungeana* Zucc.*P. koraiensis* Sieb. et Zucc.*P. tabulaeformis* Carr.**F. solani** (Mart.) App. et Wr.var. **martii** (App. et Wr.) Wr.

f. 2 Snyder

Pisum sativum L.

- Fusarium solani* (Mart.) App. et Wr. var. *martii* (App. et Wr.) f. 3 Snyder *Arachis hypogaea* L.
F. solani (Mart.) App. et Wr. f. *fabae* Yu et Fang
Vicia faba L.
F. sporotrichioides Sherb.
Setaria italica Beauv.
F. tricinctum (Corda) Sacc.
Cucurbita moschata Duch.
F. vasinfectum Atk.
Arachis hypogaea L.
Gossypium arboreum L.
G. herbaceum L.
G. sp.
Hibiscus cannabinus L.
Sesamum orientale L.
Vicia faba L.
F. vasinfectum Atk. var. *sesami* Zap.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
F. vasinfectum Atk. var. *zonatum* (Sherb.) f. 1 (Lk. et Bail) Wr.
Allium cepa L.
F. vasinfectum Atk. var. *zonatum* (Sherb.) f. 2 (Link. et Bail) Wr.
Capiscum annuum L.
F. vasinfectum Atk. f. 1. Wr.
Allium cepa L.
Gossypium hirsutum L.
G. sp.
F. vasinfectum Atk. f. 2 Wr.
Allium cepa L.
Fusicladium alopecuri Ell. et Ev.
Alopecurus aequalis Sobol.
A. arundinaceus Poir.
A. geniculatus L.
F. dendriticum (Wallr.) Fuck.
(Venturia inaequalis (Cke.) Wint.)
Malus asiatica Nakai
M. pumila Mill.
M. sp.
F. depressum (Berk. et Br.) Sacc.
Foeniculum vulgare Gaertn.
F. évonymai-japonici Hori
Evonymus japonicus Thunb.
F. kaki Hori et Yoshino
Diospyros kaki L.
F. pyrinum (Lib.) Fuck.
(Venturia pirina Aderh.)
Pyrus bretschneideri Rehd.
P. communis L.
P. lindley Rehd.
P. lindleyi Rehd.
P. serotina Rehd.
P. sinensis Lindl. var. *culta* Mak.
P. ussuriensis Max.
P. sp.
F. theae Hara
Thea sinensis L.
Fusicoccum pruni Potebnia
Prunus armeniaca L.
P. donarum Sieb.
F. viticolum Red. (*Cryptosporella viticola* (Red.) Shear)
Vitis vinifera L.
V. sp.
Gambleola cornuta Mass.
Mahonia lomariifolia Takeda
Gerwasia chinensis (Diet.) Hirat. f.
*Rubus amplioli*us Levl et Van.
R. cochinchinensis Tratt.
R. formosensis Kuntze.
R. hupehensis Oliyev
R. laciniato-stipulatus Hay.
R. reflexus Ker.
R. setchuensis Bur. et Franch.
R. shimadai Hay.
R. swinhoei Hance var. *hupehensis* Oliver
R. sp.
G. rosae Tai
Rosa cymosa Tratt.
R. roxburghii Franch.
R. sp.
G. rubi Racib.
Rubus reflexus Ker.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc.
(参看 Fusarium lateritium Nees)
G. baccata (Wallr.) Sacc. var. *moricola* (Ntrs.) Wr.
(参看 Fusarium lateritium Nees var. *mori* Desm.)
G. fujikuroi (Saw.) Wr.
(参看 Fusarium moniliforme Sheld.)

- Gibberella fujikuroi* (Saw.) Wr.
var. *subglutinans* Edwards
(参看 *Fusarium moniliforme*
Sheld. var. *subglutinans* Wr. et
Reink.)
- G. zeae* (Schw.) Petch
(参看 *Fusarium graminearum*
Schw.)
- G. cerealis* Pass.
Triticum aestivum L.
- Gliocladium mumicola* Wei
Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Gloeodes pomigena* (Schw.) Colby
Malus pumila Mill.
- Gloeosporium album* Osterw.
Malus asiatica Nakai
M. pumila Mill.
Pyrus serotina Rehd.
- G. amygdalinum* Bri.
Prunus mume Sieb. et Zucc.
- G. betularum* Ell. et Mart.
Betula sp.
- G. betulinum* Westd.
Betula alba L.
- G. fici-septicae* Saw.
Ficus septica Burm. f.
- G. follicolum* Nishoda
Citrus sinensis (L.) Osb.
- G. hibisci-tiliacei* Saw.
Hibiscus tiliaceus L.
- G. kaki* Hori
Diospyros kaki L.
- G. kawakami* Miyabe
Paulownia tomentosa
(Thunb.) Schneid.
- G. laeticolor* Berk.
Prunus persica Stokes.
P. persica Stokes var.
vulgaris Max.
- G. machill* Saw.
Machilus pseudo-longifolia
Hay.
- G. mangiferae* P. Henn.
Mangifera indica L.
- G. melongenae* Ell. et Halst.
Solanum melongena L.
- G. musarum* Cke. et Mass.
Musa sapientum L.
M. sp.
- G. passifloricolum* Saw.
Passiflora quadrangularis L.
- G. pestis* Mass.
Dioscorea alata L.
D. batatas Decne.
- G. piperatum* Ell. et Ev.
Capsicum annuum L.
- G. pithecologiicola* Saw.
Pithecolobium lucidum Benth.
- G. quercinum* West. (*Gnomonia*
quercina Kleb.)
Quercus aliena Bl.
- G. quercum* Miura
Quercus mongolica Pisch. et
Turcz.
- G. ricini* Maubl. (*Glomerella*
ricini (Maubl.) Hemmi et Matuo).
Ricinus communis L.
- G. rotundimaculatum* Saw.
Citrus poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. tankan Hay. f. *koshotankan*
Hort.
- G. serotinum* Ell. et Ev.
Prunus armeniaca L.
P. armeniaca L. var. *ansu*
Max.
P. mume Sieb. et Zucc.
P. persica Stokes
P. salicina Lindl.
- G. siameae* Saw.
Cassia siamea Lamk.
- G. theae-sinensis* Miyake
Camellia sasanqua Thunb.
Thea biflora Hay.
T. sinensis L.
- Glomerella cingulata* (Stonem.)
Schr. et Spauld.
Canarium album Raeusch.
Carica papaya Linn.
Diospyros kaki L.
Ficus carica L.
Lycopersicum esculentum
Mill.
Malus asiatica Nakai
M. pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domes-*
tica Schneid.
M. sp.
Pyrus bretschneideri Rehd.
P. communis L. var. *bartlett*

Glomerella cingulata (Stonem.)

Schr. et Spauld.

P. communis L. var. *kiefferi**P. ussuriensis* Max.*P. ussuriensis* Max. var.*P. sp.**Vitis amurensis* Rupr.*V. labrusca* L.*V. vinifera* L.*V. sp.***G. cinnamomi** Yosh.*Cinnamomum camphora* Nees
et Ebern.**G. glycines** (Hori) Lehman et
Wolf(参看 *Colletotrichum glycines*
Hori)**G. gossypii** (South.) Edg.(参看 *Colletotrichum gossypii*
south.)**G. lindemuthianum** (Sacc. et

Magn.) Shear et Wood

(参看 *Colletotrichum lindemu-*
thianum (Sacc. et Magn.) Shear
et Wood)**G. piperata** (Stonem.)

Spauld. et Schr.

Capsicum annuum L.*C. annuum* L. var.**G. ricini** (Maubl.) Hemmi et

Matuo

(参看 *Gloeosporium ricini*
Maubl.)**Gnomonia illau** Lyon*Saccharum officinarum* L.**G. oharana** Nisikado et Matsum.*Ulmus parvifolia* Jacq.*U. pumila* L.**G. quercina** Kleb.(参看 *Gloeosporium quercinum*
West.)**G. setacea** (Pers.) Ces. et de Not.*Quercus acutissima* Carr.**G. ulmea** (Sacc.) Thuem.*Ulmus parvifolia* Jacq.*U. pumila* L.**Gnomoniella coryli** (Batsch.) Sacc.*Corylus* sp.**G. hibisci** Saw.*Hibiscus tiliaceus* L.**G. vulgaris** (Ces. et de Not.)

Sacc.

Ostrya sp.**Graphiola cylindrospora** Syd.*Livistona chinensis* R. Br.**G. phoenicis** Poit.*Phoenix dactylifera* L.*P. hanceana* Naud.*P. hanceana* Naud. var. *formo-*
sana Becc.*P. sp.***Guignardia arecae** Sacc.*Areca catechu* L.**G. baccae** (Cav.) Jacz.*Vitis vinifera* L.*Vitis* sp.**G. bidwelli** (Ell.) Viala et Rav.*Vitis amurensis* Rupr.*V. labrusca* L.*V. vinifera* L.**G. camelliae** (Cke.) Butl.*Thea sinensis* L.**G. fici-beecheyanae** Saw.*Ficus beecheyana* Hook et
Arn.**G. fici-septicae** Saw.*Ficus septica* Burm. f.**G. ilicis-formosanae** Saw.*Ilex formosana* Max.**G. linderæ** Saw.*Lindera glauca* Bl. var. *kawa-*
kami Hay.**G. polygoni-chinense** Saw.*Polygonum chinense* L.**G. pruni-persicae** Saw.*Prunus persica* Stokes**G. puerariae** Saw.*Pueraria thunbergiana* Benth.**G. rhodomyrti** Saw.*Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.)
Hassk.**G. rubi** Saw.*Rubus nagasawanus* Koidz.**G. theae** (Rac.) Bernard*Thea sinensis* L.**G. ulmariae** (Thuem.) Miura*Filipendula palmata* (Pall.)
Max.**Gymnoconia peckiana** (Howe)

Trott.

Rubus saxatilis L.

Gymnesporangium clavariaeforme (Jacq.) DC.*Crataegus scabrifolius* (Fr.) Rehd.*C. sp.***G. corniforme** Saw.*Juniperus formosana* Hay.**G. cunninghamianum** Barcl.*Cupressus declouxiana* Hickel**G. formosanum** Hirat. f. et Hash.*Juniperus squamata* Ham.**G. haraeianum** Syd.*Chaenomeles extusoccine* Carr.*C. japonica* Pers.*C. lagenaria* (Lois.) Koidz*Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc.*C. pinnatifida* Bge.*C. pinnatifida* Bge. var. *major* N. E. Br.*C. scabrifolius* (Fr.) Rehd.*Cydonia oblonga* Mill.*C. sinensis* Thouin.*Juniperus chinensis* L.*Malus spectabilis* Borkh.*Pourthiaea laevis* Koikz.*P. seoulensis* Nakai*P. villosa* Decne.*Pyrus betulifolia* Bge.*P. bretschneideri* Rehd*P. calleryana* Dcne.*P. communis* L.*P. fauriei* Schneid.*P. lindleyi* Rehd.*P. serotina* Rehd.*P. serotina* Rehd. var. *culta* Rehd.*P. sinensis* Lindl. var. *culta* Mak.*P. ussuriensis* Max.*P. sp.***G. japonicum** Syd.*Juniperus chinensis* L.*Photinia amphidoxa* (Schneid.) R. et W.*P. parvifolia* Schneid.*P. subumellata* Rehd. et Wils.*P. villosa* DC.*P. sp.**Pourthiaea benthamiana* Nakai**G. juniperinum** (L.) Mart.*Sorbus valbraji***G. nipponicum** Yamada*Sorbus alnifolia* K. Koch.**G. tsingchenensis** Wei*Cupressus funebris* Endl.**G. yamadai** Miyabe*Juniperus chinensis* L.*Malus asiatica* Nakai*M. halliana* Koehne. var. *spontanea* Rehd.*M. prunifolia* Borkh.*M. pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica* Shneid.*M. sieboldii* (Reg.) Rehd.*M. spectabilis* Borkh.*M. sp.***Gyrophana lacrymans** (Wulf.)

Pat.

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hk.**Hadronema orbiculare** Syd.*Quercus salicina* var. *orgyalis***Hadrotrichum phragmiticolum**

Teng

Phragmites communis Trin.**Hamaspora acutissima** Syd.*Rubus calycinoides* Hay.*R. formosensis* Kuntze.*R. laciniato-stipulatus* Hay.*R. nantoensis* Hay.*R. pectinellus* Max. var. *triloba* Koiz.*R. setchuensis* Bur. et Franch.*R. sp.***H. benguetensis** Syd.*Rubus ellipticus* Smith var. *obcordatus* (Fr.) Focke*R. pectinellus* Max. var. *triloba* Koiz.**H. hashikoi** Hidrat. f.*Rubus lambertianum* Ser.*R. lambertianus* Ser. subsp. *xanthoneurus* Focke*R. taiwanianus* Matsum.**H. sinica** Tai et Cheo*Rubus parkeri* Hance*R. phoenicolasius* Max.

Hamasporea sinica Tai et Cheo*R. pinnatisepelus* Hemsl.*R. trianthus* Focke*R. sp.***H. taiwaniana** Hirat.*Rubus kawakamii* Hay.**Haplophragmium kawakamii**

Hirat. et Hash.

Derris chinensis Benth.*Millettia taiwaniana* Hay.**Haplosporella ailanthi** Ell. et Ev.*Ailanthus altissima* (Mill.) Sw.*Robinia pseudo-acacia* L.*Zizyphus sativa* Gaertn.**H. amorphae** (Ell. et Berth.)

Togashi

Amorpha fruticosa Trin.**H. hibisci** (Berk.) Pat. et Syd.*Hibiscus syriacus* Linn.**H. mall** (West.) Pet et Syd.*Malus pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.**H. minor** Ell. et Barth.*Morus alba* L.**H. robiniae** (Ell. et Barth.) Pet.

et Syd.

Robinia pseudo-acacia L.**H. setoana** Togashi et Mizokami*Lagerstroemia indica* L.**Helicobasidium albicans** Saw.*Citrus unshiu* Marc.**H. cinereum** Saw.*Gordonia anomala* Spreng.**H. mompa** Tanaka*Arachis hypogaea* L.*Ipomoea batatas* (L.) Poir. var. *edulis* Mak.*Malus pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.*Morus acidosa* Griff.*M. alba* L.*M. latifolia* Bur.*Pyrus lindleyi* Rehd.**Helminthosporium arundinis** Lev.*Arundo formosana* Hack.**H. avenae** Eidam (*Pyrenophora**avenae* (Eidam) Ito et Kurib.)*Avena fatua* L.*A. sativa* L.*i. sp.***H. bryophylli** Saw.*Bruephyllum calycinum*

Salisb.

H. carposaprum Poll.*Lycopersicum esculentum* Mill.**H. caryopsidum** Sacc.*Sorghum vulgare* Pers.**H. citri** Saw.*Citrus sinensis* (L.) Osb.*C. sp.***H. coicis** Nishikado*Coix lachryma-jobi* L.**H. ebuli** Saw.*Ebulus formosana* Nakai**H. gramineum** (Rabh.) Erikss.*(Pyrenophora graminea* (Rabh.) Ito et Kurib.)*Hordeum sativum* Jessen*H. sativum* Jessen var. *vulgare* Hack.*H. vulgare* L.*Triticum vulgare* Vill.**H. heveae** Petch*Hevea brasiliensis* Muell.-Arg.**H. ischaemi** Saw.*Ischaemum akoense* Honda**H. machili** Saw.*Machilus kusanoi* Hay.**H. maydis** Nisikado (*Cochlio-**bolus heterostrophus* Drechsler)*Zea mays* L.**H. monoceras** Drechsler*Echinochloa colonum* (L.)

Link.

E. crus-galli (L.) Beauv. var. *edulis* Honda**H. nodulosum** Berk. et Curt.*Eleusine indica* (L.) Gaertn.**H. oryzae** Breda de Haan*(Cochliobolus miyabeanus* (Ito et Kurib.) Drechsler)*Alopecurus aequalis* Sobol.*Oryza sativa* L.**H. panici** Saw.*Setaria plicata* (Lam.) Cke.**H. panici-miliacei** Nishikado*Panicum miliaceum* L.**H. papaveris** Saw.*(Pleosporea calvescens* (Fr.) Tul.)*Papaver somniferum* L.

- Helminthosporium ravenelii** Curt.
Sporobolus elongatus R. Br.
S. indicus (L.) R. Br.
S. sp.
- H. rhodomyrti** Syd.
Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
- H. sacchari** (Breda de Haan) Butl.
Saccharum officinarum L.
- H. sapii** Miyake
Sapium sebiferum Roxb.
- H. sativum** Pam., King et Bakke
 (Cochliobolus sativus (Ito et Kurib) Drechsler
Hordeum vulgare L.
Triticum aestivum L.
- H. sesami** Miyake
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- H. setariae** Saw. (Cochliobolus setariae (Ito et Kurib.) Drechsler)
Setaria italica Beauv.
S. sp.
- H. signoideum** Cav.
 (Leptosphaeria salvinii Catt.)
Oryza sativa L.
- H. signoideum** Cav. var.
irregulare Crally et Tullis
Oryza sativa L.
- H. stenospilum** Drechsler
 (Cochliobolus stenospilus (Carpenter) Matsum. et Yamam.)
Saccharum officinarum L.
- H. teres** Sacc. (Pyrenophora teres (Sacc.) Drechsler)
Hordeum sativum Jessen
H. sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
H. vulgare L.
- H. torulosum** (Syd.) Ashby
Musa basjoo Sieb
M. cavendishii L.
M. sapientum L.
- H. tritici-vulgaris** Nisikado
Triticum aestivum L.
- H. turcicum** Pass.
Sorghum vulgare Pers.
Zea mays L.

- H. vignicolum** (Kawamura) Tai
Vigna sinensis Endl.
- H. yamadai** Nishikado
Panicum miliaceum L.
- Hemileia gardeniae-floridiae** Saw.
Gardenia jasminoides Ell. var. *grandiflora* Hort.
- H. vastatrix** Berk. et Br.
Coffea arabica L.
C. liberica Bull.
C. robusta Linden.
- Hendersonia bicolor** Pat.
Rhododendron sp.
- H. botulispora** Teng
Phragmitis communis Trin.
- H. citricarpa** Saw.
Citrus unshiu Marc.
- H. kwangsiensis** Petr.
Andropogon sp.
- H. mali** Thuem.
Malus pumila Mill.
- H. oryzae** Miyake
Oryza sativa L.
- H. paeoniae** Allesch.
Paeonia suffruticosa Andr.
- H. piricola** Sacc.
Pyrus calleryana Decne.
P. serotina Rehd.
- H. sachari** Speg.
Saccharum officinarum L.
- H. sarmentorum** West
Rosa roxburghii Franch.
- H. theae** Hara
Thea sinensis L.
- H. vulgaris** Desm.
Rubus sp.
- Heterosporium allii** Ell. et Martin
Allium fistulosum L.
A. scorodoprasum L.
- H. dianellae** Saw.
Dianella ensifolia DC.
- H. wikstroemiae** Saw.
Wikstroemia indica C. A. Mey.
- Heydenia myrsinea** Keissler
Myrsine africana L.
M. semiserrata Wall.
- Homodendron mori** Yendo
Morus acidosa Griff.
M. alba L.

Hormiscium handelii Bubak*Rhododendron decorum*

Franch.

R. delavayi Franch.**Hyalothyridium nakatae** Hara*Hibiscus cannabinus* L.**Hymenopsis cudraniae** Mass.*Cudrania javanensis* Trecul.**Hymenula nigra** Saw.*Corchorus capsularis* L.**Hypochnus cinnamomi** Saw.*Cinnamomum camphora* Nees
et Ebern.**H. cucumeris** Frank.*Benincasa hispida* Cogn.**H. setariae** Saw.*Setaria italica* Beauv.**Hypoderma cunninghamiae**

(Keissler) Teng

Cunninghamia lanceolata

(Lamb.) Hk.

H. ipomoeae (Halst.) Wr.(参看 *Fusarium javanicum*
Koord.**Irene arisanensis** Yamam.*Cyclobalanopsis ternaticupula*
(Hay.) Kudo**I. calostroma** (Desm.) Hoehn.*Rubus conduplicatus* Duthie*R. floribundo-paniculatus* Hay.*R. formosensis* Kuntze.*R. mingetsensis* Hay.*R. taiwanianus* Matsum.*R. sp.***I. castanopsisifoliae** Yamam.*Synaedrys amygdalifolia*(Skan.) Koidz. f. *castanopsi-*
sifolia (Hay.) Kudo**I. engelhardtiae** Yamam.*Engelhardtia chrysolepis*
Hance**I. formosensis** Yamam.*Callicarpa formosana* Rolfe**I. klaiensis** Yamam.*Actinodaphne mushensis* Hay**I. konishii** Yamam.*Synaedrys konishii* (Hay.)
Koidz.**I. lithocarpicola** Yamam.*Synaedrys amygdalifolia*
(Skan.) Koidz.*S. formosana* (Hay.) Koidz.*S. formosana* (Hay.) Koidz. f.*dodoneaeifolia* (Hay.) Kudo*S. rhamnocarpa* (Hay.) Kudof. *suishoensis* (Kan. et

Yamam.) Kudo

*S. sp.***I. photinicola** Yamam.*Photinia kudoi* Masam.**I. raphiolepis** Yamam.*Raphiolepis indica* Lindl. var.
tashiroi Hay.**I. sinsuiensis** Yamam.*Synaedrys shinsuiensis* (Hay.
et Kan.) Kudo**I. stranvaesiicola** Yamam.*Stranvaesia nitakayamensis*
Hay.**I. styracicola** Yamam.*Styrax formosanum* Matsum.**I. styracicola** Yamam. var.*minor* Hansf.*Styrax benzoin* Dry.**I. viburni** (H. et P. Syd.) Stev.*Viburnum* sp.**Irenina buddleiae** Hansf.*Buddleia* sp.**I. castanopsis** Hansf.*Castanopsis tibetana* Hance**I. cheoi** Hansf.*Ficus* sp.**I. cyclobalanopsicola** Yamam.*Cyclobalanopsis ternaticupula*
(Hay.) Kudo**I. ebuli** Yaman.*Ebulus formosana* Nakai**I. hydrangeae** Yamam.*Hydrangea angustipetala* Hay.*H. chinensis* Max.*H. sp.***I. lonicerae** Hansf.*Lonicera* sp.**I. lonicerae** Yamam.*Lonicera japonica* Thunb. var.
sempervillosa Hay.**I. mallotica** Yamam.*Mallotus cochinchinensis* Lour.*M. japonicus* Muell.-Arg.**I. manca** (Ell. et Mart.) Stev.*Myrica adenophora* Hance var.
Kusanoi Hay.

Irenina manca (Ell. et Mart.) Stev.

M. rubra Sieb. et Zucc.

Myrsine sp.

I. pithecolobii Yamam.

Pithecolobium lucidum Benth.

I. quercina Hansf.

Quercus sp.

I. rhododendri Yamam.

Rhododendron oldhami Max.

I. rosae Hansf.

Rosa roxburghii Franch.

I. subapoda (Syd.) Stev.

Mahonia philippensis (Lam.)

Muell.

I. turpiniae Yamam.

Turpinia formosana Nakai

I. viburni (Syd.) Stev.

Viburnum luzonicum Rolf. var. *formosanum* Rehd.

V. odoratissimum Ker.

V. propinquum Hemsl.

Irenopsis benguetensis Stev. et Rold.

Ficus sp.

I. coronata (Speg.) Stev. var.

triumfetae (Stev.) Stev.

Urena lobata L. var. *tomentosa* Miq.

I. hiptages Yamam.

Ecdysanthera utilis Hay. et Kawakami

Isariopsis alborosella (Desm.)

Sacc.

Stellaria aquatica Scop.

I. clavispora Sacc.

(参看 *Cercospora viticola* (Ces.) Sacc.)

I. griseola Sacc.

(参看 *Cercospora columnaris* Ell. et Ev.)

I. sapindi Saw.

Sapindus mukorossi Gaertn.

Konradia bambusina Racib.

Bambusa sp.

Kordyana commelinae Saw.

Commelina nudiflora L.

K. pollinae Saw.

Pollia japonica Thunb.

Kuehneola callicarpae Syd.

Callicarpa sp.

K. japonica (Diet.) Diet.

Rosa chinensis Jacq. subsp.

indica Koehne

R. laevigata Michx.

R. taiwanensis Nakai

K. malvicola Arthur

Malvastrum tricuspidatum A. Gray

Kwellingia bambusae Teng

Bambusa sp.

Lasmenia phyllostachyis Saw.

Dendrocalamus latiflorus

Munro

Phyllostachys makinoi Hay.

Leptosphaeria coicis Saw.

Coix lachryma-jobi L. var. *susutana* Honda

L. culmifraga (Fr.) Ces. et de Not.

Arundinella fluviatilis

L. mandshurica Miura

Malus pumila Mill. var. *domestica* Schneid.

L. pomona Sacc.

Pyrus sp.

L. puttemansii Maubl.

Eriobotrya japonica Lindl

L. sacchari Breda de Haan

Saccharum officinarum L. *S. sinense* Roxb.

L. salvinii Catt

(参看 *Helminthosporium signoides* Cav.)

L. trachycarpi Hara

Trachycarpus excelsa Wendl.

Leptosphaerella bambusae

(Miyake et Hara) Sacc.

Bambusa sp.

Leptosphaerulina moricola Saw.

Morus alba L.

Leptostroma lonicericolum Rabh.

Lonicera maximowiczii Max.

L. orientalis Lam.

L. macrospora Teng

Sasa sp.

Leptostromella hysterioides (Fr.)

Sacc.

Dianthus sp.

Leptothyrium camelliae P. Henn.

Camellia japonica L.

- Leptothyrium glycosmidis**
Keissler
Glycosmis pentaphylla (Retz.)
Correa
- L. polygonati** Tassi
Smilacina yunnanensis
(Franch.) H.-M.
- L. pomi** (M. et F.) Sacc.
Malus pumila Mill.
M. spectabilis Borkh.
M. sp.
Pyrus serotina Rehd.
- L. quercinum** (Lasch.) Sacc
Quercus serrata Thunb.
- L. smilacis-chinae** Teng
Smilax china L.
- Leucostoma persoonii** (Nit.)
Tagashi (*Valsa leucostoma*
(Pers.) Fr.)
Prunus armeniaca L. var. *ansu*
Max.
P. persica Stokes
P. persica Stokes var. *vulgaris*
Max.
- Leucotellium pruni-persicae** (Hori)
Tranzsch.
Prunus persica Stokes
P. persica Stokes var. *vulgaris*
Max.
P. sp.
- Leveillula taurica** (Lev.) Arn.
Capsicum annuum L.
Reinwardtia trigyna Planch.
Tropaeolum majus L.
- Libertella betulina** Desm.
Betula sp.
- Lophodermium nervisequum**
(DC.) Rehm.
Abies delavayi Franch.
- L. pleridis** Keissler
Pieris doyonensis H.-M.
- L. pinastri** (Schräd.) Chev.
Pinus densiflora Sieb. et Zucc.
P. massoniana Lamb.
P. sp.
- L. rhododendri** Ces.
Rhododendron adenogynum
Diels
R. sp.
- L. rottboelliae** Saw.
Rottboellia japonica Honda
- L. uncinatum** Darker
Cunninghamia lanceolata
(Lamb.) Hk.
C. sp.
- Macrophoma abensis** Hara
Thea sinensis L.
- M. abutilonis** Nakata et Takim.
Abutilon avicennae Gaertn.
- M. chenopodii** Miura
Chenopodium hybridum L.
- M. corchori** Saw.
Corchorus capsularis L.
C. olitorius L.
- M. cruenta** (Fr.) Ferr.
Polygonatum officinale Allesch.
Toraria japonica Baker
- M. cylindrospora** (Desm.) Eerl.
et Vogl.
Evonymus sp.
- M. dalbergicola** Teng
Dalbergia hupeana Hance
- M. dendrocalami** Saw.
Dendrocalamus latiflorus
Munro
- M. diospyri** Earle
Diospyros kaki L.
- M. ehretiae** Cke. et Mass.
Ehretia formosana Hemsl.
- M. fagopyri** Saw.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
- M. fusispora** Bubak
Quercus sp.
- M. ilicis-cornutae** Teng
Ilex cornuta Lindl.
- M. ipomoeae** Pass.
Ipomoea hederacea Jacq.
- M. ischurochloae** Saw.
Ischurochloa stenostachya
Nakai
- M. kawatsukai** Hara (*Physalospora piricola* Nose)
Crataegus pinnatifida Bge.
Cydonia oblonga Mill.
Malus asiatica Nakai
M. baccata (L.) Borkh.
M. pumila Mill.
Prunus armeniaca L.?
P. armeniaca L. var. *ansu*
Max.?
P. persica Stokes?
P. salicina Lindl.?

- Macrophoma kawatsukai** Hara
(Phyalospora piricola Nose)
Pyrus bretschedleri Rehd.
P. communis L.
P. serotina Rehd.
P. ussuriensis Max.
P. sp.
- M. macrospora** (McAlp.) Sacc. et Sacc.
Prunus persica Stokes var.
vulgaris Max.
- M. magnoliae** Saw.
Magnolia coco DC.
- M. mame** Hara
Glycine max (L.) Merr.
Vigna sinensis Endl.
- M. musae** (Cke.) Berl. et Vogl.
Musa sapientum L.
M. sp.
- M. perseae** Saw.
Persea gratissima Gaertn.
- M. salicina** (Sacc.) Berk. et Vogl.
Salix sp.
- M. sophorae** Miyake
Sophora japonica L.
- M. sophoricola** Teng
Sophora japonica L.
- M. taxi** (Berk.) Berl. et Vogl.
Taxus chinensis Rehd.
- M. tumefaciens** Shear
Populus sp.
- Macrophomina phaseoli** (Maubl.) Ashby
Arachis hypogaea L.
Cannabis sativa L.
Castanea mollissima Bl.
Corchorus capsularis L.
C. olitorius L.
Cupressus funebris Endl.
Eucommia ulmoides Oliv.
Ginkgo biloba L.
Gossypium sp.
Helianthus annuus L.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Nicotiana tabacum L.
Phaseolus vulgaris L.
Pinus sp.
Quercus acutissima Carr.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- Vigna sinensis* Endl.
- Macrosporium abutilonis** Speg.
Abutilon avicennae Gaertn.
- M. brassicae** Berk. et Sacc. var.
macrospora Cfr.
Brassica sp.
- M. bulbotrichum** Cke.
Canna indica L.
- M. calycanthi** Cav.
Calycanthus praecox L.
- M. catalpae** Ell. et Mart.
Catalpa ovata Don.
- M. commune** Rabh. (**Pleospora**
herbarum (Pers.) Rab.)
Allium cepa L.
A. fistulosum L.
A. porrum L.
A. sativum L.
A. scorodoprasum L.
A. scorodoprasum L. var.
viviparum Regel.
A. sp.
Capsicum annuum L.
Citrus sp.
Morus alba L.
Sedum sp.
Thalictrum alpinum L.
- M. cucurmerinum** Ell. et Ev.
Cucurbita sp.
- M. fasciculatum** Cke. et Ell.
Phaseolus radiatus L.
P. vulgaris L.
- M. helminthosporioides** (Corda)
 Sacc. et Trav.
Cunninghamia lanceolata
 (Lamb.) Hk.
C. sp.
Picea sp.
- M. negundinicum** Ell. et Bartn.
Acer buergerianum Miq.
A. negundo L.
- M. nerii** Cke.
Nerium odoratum Soland
- M. nigricans** Atk.
Gossypium herbaceum L.
G. sp.
- M. phaseoli** Fautr.
Phaseolus vulgaris L.
- M. pirorum** Cke.
Pyrus sp.

- Macrosperium porri** Ell.
Allium sativum L.
 A. sp.
- M. ricini** Saw.
Ricinus communis L.
- M. sesami** Kawamura
Sesamum indicum L.
- M. tomiato** Cke.
Lycopersicum esculentum Mill.
- M. trichellum** Arc. et Sacc.
Magnolia sp.
- Mamiania fimbriata** (Pers.) Ces.
 et de Not.
Corylus heterophylla Fisch.
- Marasmius plicatus** Wakker
Eleusine coracana (L.) Gaertn.
Oryza sativa L.
Panicum maximum Jacq.
P. miliare Lamb.
P. sanguinale L.
Paspalum scrobiculatum L.
Saccharum officinarum L.
- M. sacchari** Wakker
Cyperus rotundus L.
Saccharum officinarum L.
- M. semiustus** Berk. et Curt.
Musa cavendishii L.
- Maravalia achroa** (Syd.) Arthur et Cummins
Dalbergia sisso Roxb.
 D. sp.
- Marssonina potentillae** (Desm.) Fisch.
Fragaria chiloensis Duch.
F. chiloensis Duch. var.
ananassa Bail.
 F. sp.
- M. puerariae** Saw.
Pueraria thunbergiana Benth.
- M. rosae-laevigatae** Saw.
Rosa laevigata Michx.
- Marssonina juglandis** (Lib.) Magn.
Juglans sp.
- M. mali** (P. Henn.) Ito
Malus asiatica Nakai
M. manshurica Koehne.
M. prunifolia Borkh.
M. pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
- M. pumila* Mill. var. *tomentosa* Koeh.
- M. sp.
- M. martini** (Sacc. et Ell.) Magn.
Quercus glandulifera Bl.
Q. serrata Thunb.
 Q. sp.
- M. populicola** Miura
Populus laurifolia Ledeb.
 P. sp.
- M. viticola** Miyake
Vitis vinifera L.
- Massaria moricola** Miyake
Morus alba L.
- M. phorcioides** Miyabe
Morus alba L.
- Melampsora aleuritidis** Cummins
Aleurites sp.
- M. allii-fragilis** Kleb.
Salix babylonica L.
- M. apocyni** Tranzsch.
Apocynum venotum L.
- M. coleosporioides** Diet.
Salix babylonica L.
S. heteromera H.-M.
S. matsudana Koidz.
S. matsudana Koidz.
S. mesneyi Hance
 S. sp.
- M. cynanchi** Thuem.
Cynanchum sibiricum R. Br.
- M. euphorbiae** (Schr.) Cast.
Euphorbia esula L. var.
latifolia Ledeb.
 E. sp.
- M. euphorbiae-dulcis** Othth.
Euphorbia pekinensis Rupr.
E. sieboldiana Morr. et Decne.
 E. sp.
- M. farinosa** Schroet.
Salix wilsonii Seem.
- M. hartigii** Thuem.
Salix daphnoides Vill.
 S. sp.
- M. idesiae** Miyabe
Idesia polycarpa Max.
- M. kuzanoi** Diet.
Hypericum ascyron L.
H. patulum Thunb.
H. patulum Thunb. var. *henryi* Veitch.
 H. sp.

Melampsora larici-capraearum
Kleb.

Salix caprea L. var. *sinica* Hao
S. spathulifolia Seem.

M. larici-epitea Kleb.

Salix delavayana H.-M.
S. longiflora Anders.
S. psilostigma Anders.
S. purpurea L. subvar.
angustifolia Koidz.

S. viminalis L.

S. sp

M. larici-populina Kleb.

Populus italica L.
P. maximowiczii Henry
P. simonii Carr.
P. yunnanensis Dode

M. laricis Hart.

Populus tremula L. var.
 davidiana Schneid.

M. lini (Ehr.) Lev.

Linum usitatissimum L.

M. magnusiana Wagner

Corydalis sp.
Populus tomentosa Carr.
P. tremula L. var. *davidiana*
Schneid.

P. sp.

M. ribesii-purpureae Kleb.

Ribes diacantha Pall.
R. sp.
Salix matsudana Koidz.
S. purpurea L.
S. spodiophylla H.-M.

M. ricini Pass.

Ricinus communis L.

M. rostrupii Wagner

Populus alba L.
P. rotundifolia Griff.
P. tremula L.
P. tremula L. var. *villosa*
Weam.

P. sp.

M. salici-warburgii Saw.

Salix glandulosa Seem. var.
warburgi Koidz.

M. salicis-albae Kleb.

Salix sp.

M. salicis-capularis Wang

Salix capularis Rehd.

M. salicis-cavaleriei Tai

Salix cavaleriei Levl.

M. stelleriae Teich.

Stellera chamaejasme L.

M. syntherismae Saw.

Ischaemum ciliare Retz. var.
genuinum Hack.

I. ciliare Retz. var. *scrobiculatum* Honda

Syntherisma formosana Honda

M. yezoensis Miyabe et Matsum.

Salix longiflora Anders.

M. yoshinagai P. Henn.

Wikstroemia indica C. A. Mey.
W. sp.

Melampsorella caryophyllacearum
Schroet.

Abies delavayi Franch. var.
forresti Cheng

Pseudostellaria heterophylla
Pax.

Melampsoridium alni (Thuem.)
Diet.

Alnus cremastogyne Burk.

M. carpini (Fuck.) Diet.

Carpinus kawakamii Hay.
C. sp.

M. hiratsukanum Ito

Alnus hirsuta Turcz.

Melanconium bambusinum Speg.
Bambusa sp.

M. meliae Teng

Melia azedarach L.

M. oblongum Berk.

Juglans cattayensis Dode
J. regia L.

M. oblongum Berk.

Pterocarya stenoptera DC.

M. shiraianum Syd.

Sinocalamus affinis (Rendle)
McClure

Melanomma glumarum Miyake
Oryza sativa L.

Melanopsichium inouyei (P. Henn.
et Shirai) Ling
Machilus sp.

M. pennsylvanicum Hirschh.
Polygonum sp.

Melasmia acerina Lev. (Rhytisma
acerinum (Pers.) Fr.)

Acer buergerianum Miq.
A. henryi Pax.

- Melasmia acerina** Lev. (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.)
A. oblongum Wall.
A. sinense Pax.
A. sp.
- M. aceris-trifidi** Saw.
Acer trifidum Hook et Arn.
 var. *formosanum* Hay.
- M. alni** Syd.
Alnus maritima Nutt.
A. sp.
- M. caragane** Jacz.
Caragana frutex Koch. var. *latifolia*
- M. lonicerae** Jacz.
Lonicera maackii Max.
L. modesta Rehd.
L. sp.
- M. punctata** Sacc. et Roum.
 (*Rhytisma punctatum* (Pers.) Fr.)
Acer buergerianum Miq.
A. caudatum Wall. var. *prattii* Rehd.
A. ginnala Max.
A. pseudo-sieboldianum Kom.
A. tetramerum Max. var. *betulifolium* Rehd.
A. sp.
- M. rhododendri** P. Henn. et Shirai (*Rhytisma shiraiana* Hemmi et Kurata)
Rhododendron farrerae Tate
R. seniavinii Max.
R. simsii Planch.
- M. ulmicola** Berk. et Curt.
Ulmus pumila L.
U. sp.
- Meliola acaciae-confusae** Saw.
Acacia confusa Merr.
 l. *richii* A. Br.
- M. acanthopanax** Yamam.
Acanthopanax trifoliatum (L.) Merr.
- M. aceris** Yamam.
Acer oblongum Wall.
- M. actinodaphnes** Hansf.
Actinodaphne sp.
- M. aethiops** Sacc.
Cassia siamea Lamk.
- M. alniphylli** Yamam.
Alniphyllum pterospermum Matsum.
- M. andropogonis** Stev. et Roldan
Miscanthus japonicus (Thunb.) Anders.
- M. araliicola** Yamam.
Aralia chinensis L.
- M. arundinis** Pat
Phragmites longivalvis Steud.
Saccharum officinarum L.
- M. banosensis** Syd.
Milletia reticulata Benth.
M. sp.
Pueraria thunbergiana Benth.
P. sp.
- M. baubiniicola** Yamam.
Bauhinia championi Benth.
- M. beilschmiediae** Yamam.
Beilschmiedia erythrophloia Hay.
- M. bicornis** Wint. var. *robinsonii* (Syd.) Stev.
Entada phaseoloides (L.) Merr
- M. brachyodonta** Syd.
Rhus chinensis Mill. var. *roxburghii* Rehd. et Wils.
- M. brandisiae** Hansf.
Brandisia sp.
- M. butleri** Syd. (= *M. citricola* Syd.)
Citrus grandis Osb.
C. junos Tanaka
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. tankan Hay
C. sp.
- M. callicarpicola** Yamam.
Callicarpa formosana Rolfe
C. loureiri Hook et Arn.
C. sp.
- M. camelliae** (Catt.) Sacc.
Thea sinensis L.
- M. callicarpicola** Yamam.
Camellia shinkoensis (Hay.) Mak.
- M. euchrestae** Yamam.
 (参看 *M. castanopsidis* Yamam.)
- M. castanopsidis** Yamam. (= *M. castanopsidis* Hansf.?)
Castanopsis formosana Hay.
C. stipitata (Hay.) Kan. et Hatu.

- Meliola castanopsidis** Yamam.
(= *M. castanopsidis* Hansf.?)
C. tibetana Hance
C. uraiana (Hay.) Kan. et Hatu.
C. sp.
- M. citricola** Syd.
(参看 *M. butleri* Syd.)
- M. clerodendri** Yamam.
Clerodendron cyrtophyllum Turcz.
- M. cyclobalanopsina** Yamam.
Cyclobalanopsis sp.
Quercus glauca Thunb.
Q. longinux Hay.
Q. pseudomyrsinaefolia Hay.
- M. cylindrophora** Rehm.
Itea chinensis Hook et Arn. var. *arisanensis* Max.
I. chinensis Hook et Arn. var. *sub serrata* Max.
I. sp.
- M. elmeri** Syd.
Pittosporum oligocarpum Hay.
- M. euchrestae** Yamam.
Euchresta horsfieldii Benn. var. *formosana* Hay.
- M. formosensis** Yamam.
Rubus euphlebophyllus Hay.
R. floribundo-paniculatus Hay.
R. formosensis Kuntze.
R. mingetsensis Hay.
R. shinkoensis Hay.
R. swinhoei Hance
R. sp.
- M. furecata** Lev.
Phyllostachys sp.
- M. fusispora** Yamam.
Castanopsis stipitata (Hay.) Kan. et Hatu.
- M. heliciae** Yamam.
Helicia formosana Hemsl.
- M. hoyae** Sacc.
Hoya carnosia R. Br.
- M. illicicola** Yamam.
Ilex formosana Max.
- M. kadsurae** Yamam.
Kadsura japonica Dun.
- M. kawakamii** Yamam.
Synaedrys kawakamii Koidz.
- M. kiralensis** Yamam.
Synaedrys lepidocarpa Koidz.

- M. knowltoniae** Doidge
Clematis floribunda Yamam.
C. gouriana Roxb.
C. sp.
- M. koae** Stev.
Acacia richii A. Br.
- M. kodaihoensis** Yamam.
Synaedrys kodaihoensis Kudo
- M. koelreuteriae** Hansf.
Koelreuteria sp.
- M. kusanoi** P. Henn.
Prunus pseudocerasus Lindl.
- M. kweichowensis** Hansf.
Styrax benzoin Dry.
- M. leptoclada** Syd.
Gilibertia sp.
Heptapleurum arboricolum Hay.
H. sp.
Schefflera octophylla Harms.
- M. linderiae** Yamam.
Lindera communis Hemsl.
- M. lithocarpina** Yamam.
Synaedrys brevicaudata Koidz.
- M. litseae** Syd.
Litsea citrata Bl.
- M. machili** Yamam.
Machilus arisanensis Hay.
M. kusanoi Hay.
M. pseudo-longifolia Hay.
M. thunbergii Sieb. et Zucc.
M. zuihoensis Hay.
M. sp.
- M. malacotricha** Speg.
Ipomoea sp.
- M. mallotica** Yamam.
Mallotus sp.
- M. mangiferae** Earle
Mangifera indica L.
- M. microtricha** Syd.
Ficus beecheyana Hook et Arn.
F. formosana Max. f. *shimadai* Hay.
F. sp.
- M. neolitseae** Yamam.
Cryptocarya chinensis Hemsl.
C. sp.
Litsea hayata Kanehira
L. sp.
Neolitsea variabilis (Hay.) Kaneh. et Sasaki
N. sp.

- Meliola osmanthi** Syd.
Osmanthus matsumuranus Hay.
- M. palmicola** Wint.
Phoenix hanceana Naud. var. *formosana* Becc.
- M. panici** Earle
Miscanthus japonicus (Thunb.) Anders.
Spodiopogon cotulifer (Thunb.) Hack.
- M. phyllostachydis** Yamam.
Phyllostachys edulis A. et C. Riv.
P. makinoi Hay.
P. sp.
Pseudosasa uzawai Nakai
P. sp.
- M. pileostegiae** Yamam.
Pileostegia viburnoideis Hook f. et Thoms.
- M. pisoniae** Stey. et Roldan
Pisonia aculeata L.
- M. ramulicola** Yamam.
Synaedrys brevicaudata Koidz.
- M. sakahensis** Yamam.
Ficus foveolata Wall. var. *arisanensis* Kudo
- M. sakawensis** Henn.
Clerodendron fragrans Vent.
C. paniculatum L.
C. trichotomum Thunb.
C. sp.
- M. schimicola** Yamam.
Schima kankaoensis Hay.
- M. sempeiensis** Yamam.
Notaphobe konishii Hay.
- M. shiiae** Yamam.
Castanopsis kawakami Hay.
C. stipitata (Hay.) Kan. et Hatu.
C. sp.
- M. sidae** Rehm.
Sida acuta Burm. f.
- M. smilacis** Stev.
Smilax stenopetala Gray
S. trachyclada Hay.
S. sp.
- M. styracis** Yamam.
Styrax suberifolius Hook et Arn.

- M. subacuminata** Yamam.
Castanopsis subacuminata Hay.
- M. subpellucida** Yamam.
Synaedrys amygdalifolia (Sken.) Koidz. f.
castanopsisifolia (Hay.) Kudo
- M. symplocacearum** Yamam.
Symplocos lucida Sieb. et Zucc.
- M. symploci** Yamam.
Symplocos eribotryaefolia Hay.
- M. symplocicola** Yamam.
Symplocos theophrastaefolia Sieb. et Zucc.
- M. symplocicola** Yamam. var. *chinensis* Hansf.
Symplocos setchuensis Brand
- M. taiyuensis** Yamam.
Quercus glauca Thunb.
- M. taiwaniana** Yamam.
Castanopsis taiwaniana Hay.
- M. tenella** Pat.
Murraia paniculata (L.) Jack.
- Meliolina octospora** (Cke.) Hoehn.
Eugenia sp.
- Melophia polygonati** Miyake
Polygonatum officinale Allesch.
- Metasphaeria albescens** Thuem.
Oryza sativa L.
- M. deviata** Syd.
Phyllostachys sp.
- M. musae** (Zimm.) Saw.
 (参看 *Cercospora musae* Zimm.)
- Microdiplodia miyakei** Sacc.
Eriobotrya japonica Lindl.
- Microglossum shiraianum** P. Henn.
 (参看 *Mittrula shiraiana* (P. Henn.) Ito et Imai)
- Microsphaera alni** (Wallr.) Salm.
Akebia quinata Decne.
A. trifoliata (Thunb.) Koidz.
Berberis diaphana Max.
Castanea mollissima Bl.
Corylus heterophylla Fisch.
C. sp.
Menispermum dahuricum DC.
Picrasma quassivides
Pistacia chinensis Bge.

- Microsphaera alni** (Wallr.) Salm.
Quercus acutissima Carr.
Q. aliena Bl.
Q. dentata Thunb.
Q. fabri Hance
Q. glandulifera Bl.
Q. glauca Thunb.
Q. mongolica Fisch. et Turcz.
Q. serrata Thunb.
Q. variabilis Bl.
Q. sp.
Rhamnus davuricus Pall.
- M. alni** (Wallr.) Salm.
 var. *dentatae* (Liou) Tai
Quercus dentata Thunb.
- M. alphitoides** Griff. et Maubl.
Quercus sp.
- M. baeumleri** Magn.
Robinia pseudo-acacia L.
Vicia cracca L.
V. cracca L. var. *japonica* Miq.
V. hirsuta (L.) Gray
V. sp.
- M. benzoinis** Tai
Lindera glauca Bl.
- M. berberidicola** Tai
Berberis sp.
- M. berberidis** (DC.) Lev.
Berberis poiretii Schneid.
B. vulgaris Linn.
B. sp.
- M. coryli** Homma
Corylus heterophylla Fisch.
- M. decaisneae** Tai
Decaisnea fargesii Fr.
- M. divaricata** (Wallr.) Lev.
Berberis sp.
- M. grossulariae** (Wallr.) Lev.
Berberis amurensis Rupr.
B. poiretii Schneid.
Caragana sinica (Buchoz.)
 Rehd.
Sambucus japonica Thunb.
S. javanica Bl.
- M. pseudolonicerae** (Salm.)
 Blumer
Caragana microphylla Lamb.
Cocculus trilobus DC.
Stephania rotunda Lour.
- M. robiniae** Tai
Robinia pseudo-acacia L.
- M. russellii** Clint.
Oxalis corniculata L.
- M. securinegae** Tai et Wei
Securinega suffruticosa (Pall.)
 Rehd.
- M. viciae-unijugae** Homma
Vicia unijuga Al. Br.
- M. yamadai** (Salm.) Syd.
Juglans regia L.
- Microstroma album** (Desm.) Sacc.
 var. *japonicum* P. Henn.
Quercus sp.
- M. juglandis** (Bereng.) Sacc.
Juglans mandshurica Max.
J. regia L.
- M. minimum** Sacc.
Ricinus communis L.
- Microthyrium nigropapillatum** Saw
Desmodium heterocarpum (L.)
 DC.
- M. paraguayense** Speg.
Sapindus mukorossi Gaertn.
- Microxyphium obtusulum** Sacc.
Psidium guayava L.
- Mitrla shiraiana** (P. Henn.) Ito
 et Imai (= *Microglossum*)
shirianum P. Henn.)
Morus alba L.
- Miyagia macrospora** Hirat.
Gnaphalium formosanum Hay.
- Monaseus purpureus** Went.
Oryza sativa L.
- Monochaetia mali** (Ell. et Ev.)
 Sacc.
Malus manshurica Koehne.
M. pumila Mill.
Sorbus alnifolia K. Koch.
- M. pacyspora** Bubak
Punica granatum L.
- M. seridiodes** (Sacc.) Sacc.
Rosa xanthina Lindl.
- M. uniseta** (Tracy et Earle) Sacc.
Vitis vinifera L.
- Monosporium eichhorniae** Saw.
Eichhornia crassipes (Mart.)
 Solms.
- Montagnellina calami** Saw.
Calamus margaritae Hance
- M. fici** Saw.
Ficus nervosa Heyne
- M. rhamni** Saw.
Rhamnus formosana Matsum.

- Multipatina citricola** Saw.
Citrus nobilis Lour.
C. sabon Sieb.
C. sinensis (L.) Osb.
- Munkiella shiraiana** Miyake et Hara
Sinocalamus affinis (Rendle) McClure
- Munkiodothis melastemata** (Hoehn.) Theiss. et Syd.
Melastoma sp.
- Mycosphaerella abutilontidicola** Miura
Abutilon avicennae Gaertn.
- M. aleuritidis** (Miyake) Ou
 (参看 *Cercospora aleuritidis* Miyake)
- M. arachidicola** Jenk.
 (参看 *Cercospora arachidicola* Hori)
- M. araliae** C. Harkn.
Acanthopanax divaricatus Seem.
- M. areola** (Atk.) Ehrl. et Wolf
 (参看 *Ramularia areola* Atk.)
- M. berkeleyi** Jenk.
 (参看 *Cercospora personata* (B. et C.) Ell.)
- M. brassicicola** (Duby) Lindau
 (参看 *Phyllosticta napi* Sacc.)
- M. cannabidis** Johans.
Cannabis sativa L.
- M. centellae** Saw.
Centella asiatica (L.) Urb.
- M. cerasella** Aderh.
Prunus pseudocerasus Lindl.
- M. ceres** Sacc.
Sorghum vulgare Pers.
- M. citrullina** (Smith) Gross.
 (参看 *Ascochyta cucumis* Fautr. et Rohm.)
- M. corylina** Karst.
Corylus heterophylla Fisch.
- M. cruenta** (Sacc.) Lath.
 (参看 *Cercospora cruenta* Sacc.)
- M. davisii** F. R. Jones
Medicago sativa L.
- M. entadae** Saw.
Entada phaseoloides (L.) Merr.
- M. fici-wightianae** Saw.
Ficus wightiana Wall.
- M. fragariae** (Tul.) Lindau
Fragaria chiloensis Duch.
F. chiloensis Duch var. *ananassa* Bail.
F. moschata Duch.
F. sp.
Potentilla supina L.
Rubus thunbergii Sieb. et Zucc.
- M. fushinoki** Miura
Rhus semilata Murr.
- M. gentianae** (Niessl) Lindau
 (= *Sphaerella gentianae* Niessl) *Gentiana* sp.
- M. gossypina** (Cke.) Earle
 (参看 *Cercospora gossypina* Cke.)
- M. horii** Hara
Citrus grandis Osb.
C. nobilis Lour.
C. sinensis (L.) Osb.
- M. ikedai** Hara
Thea sinensis L.
- M. imperatae** Saw.
Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. var. *koenigii* Dur. et Schinz.
- M. ipomoeaecclela** Hara
Ipomoea aquatica Forsk.
- M. iridis** (Auersw.) Schroet.
Iris japonicus Thunb.
- M. malinverniana** Catt.
Oryza sativa L.
- M. mandshurica** Miura
Populus laurifolia Ledeb.
- M. manihotis** Syd.
 (参看 *Cercospora henningsii* Allesch.)
- M. maydis** (Pass.) Lindau
Zea mays L.
- M. moricola** Saw.
Morus alba L.
- M. morifolia** Pass.
Morus alba L.
- M. myricae** Saw.
Myrica rubra Sieb. et Zucc.
- M. nawae** Hiura et Ikata
Diospyros kaki L.
D. lotus L.

- Mycosphaerella olivaceum** Weh.
Allium cepa L.
- M. oxalidis** Saw.
Oxalis repens Thunb.
- M. pachyasca** Rost.
Prunus persica Stokes
- M. paulowniae** Shirai et Hara
Paulownia tomentosa (Thunb.)
 Schneid.
- M. persicae** (Sacc.) Higg.
Prunus persica Stokes
- M. pinodes** (Berk. et Blox.)
 Vestergr.
Phaseolus mungo L.
Pisum sativum L.
- M. piperis** Saw.
Piper futokadsura Sieb.
- M. polygona** (DC.) Saw.
Vicia faba L.
- M. pomaccarum** (Corda) Sacc.
Malus pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica*
 Schneid.
- M. pouzolziae** Saw.
Pouzolzia zeylanica Burm. var.
alienata Sasaki
- M. puerariae** (Keissler) Petr.
 (= *M. puerariae* Saw.)
Pueraria thunbergiana Benth.
P. sp.
- M. puerariae** Saw.
 (参看 *M. puerariae* (Keissler)
 Petr.)
- Mycosphaerella rosigen** (Ell. et
 Ev.) Lindau
Rosa chinensis Jacq.
R. sp.
- M. rubi** (West) Roark.
 (参看 *Septoria rubi* West.)
- M. rumicis** (Desm.) Grove
Rumex hydrolapathum
 Hudson
- M. schoenoprasi** (Rabh.) Schroet.
Allium cepa L.
A. fistulosum L.
A. porrum L.
- M. sentina** (Fr.) Schroet.
 (参看 *Septoria pricola* Desm.)
- M. shirafiana** Mivake
Oryza sativa L.

- M. sojae** Hori
Glycine max (L.) Merr.
- M. staphyleae** Miura
Staphylea bumalda DC.
- M. tassiana** (de Not.) Johans.
Arenaria juncea Bieb.
Leontopodium franchetii
 Beauv.
Oryza sativa L.
Papaver nudicaule L.
Paraquilegia microphylla
- M. tatarica** (Syd.) Miura
 (参看 *Septoria tatarica* Syd.)
- M. theae** Hara
Thea sinensis L.
- M. tulasnei** Jacz.
Brassica campestris L.
Oryza sativa L.
- Myriangium haraeum** Tai et
 Wei
Bambusa multiplex (Lour.)
 Roensch.
Phyllostachys puberula Munro
P. sp.
- Myrothecium roridum** (Tode) Fr.
Abutilon avicennae Gaertn.
Althaea rosea Cav.
Amaranthus paniculatus L.
A. tricolor L.
Beta vulgaris L.
Celosia argentea L.
C. cristata L.
Dolichos lablab L.
Gossypium hirsutum L.
Impatiens balsamina L.
Ipomoea aquatica Forsk.
I. hederacea Jacq.
Lycopersicum esculentum Mill.
Malva sylvestris L.
Ricinus communis L.
Solanum melongena L.
- Myxosporella miniata** Sacc.
Broussonetia sp.
Morus sp.
- Myxosporium psidii** Saw. et
 Kurosawa
Psidium guayava L.
- M. rimosum** Fautr.
Populus simonii Carr.

Napieladium arundinaceum

(Corda) Sacc.

Phragmitis communis Trin.**N. brunaudii** Sacc.*Prunus* sp.**N. musae** Saw.*Musa cavendishii* L.**Nectria cinnabarina** (Tode) Fr.(参看 *Tubercularia vulgaris* Tode)**N. pterospermi** Saw.*Pterospermum acerifolium* Willd.**Nectriella cucumeris** Hanz.*Cucumis sativus* L.**Nematospora coryli** Peglion*Lycopersicum esculentum* Mill.**Nematostoma artemisiae** Syd.*Artemisia vulgaris* L.**Neocapnodium tanakae** (Shirai et Hara) Yamam.*Callicarpa formosana* Rolfe*Castanea cruenta* Sieb. et Zucc.*Celtis sinensis* Pers.*Cinchona ledgeriana* Moens.*Citrus balotina**C. chrysocarpa**C. grandis* Osb.*C. hotokan* Hay.*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka var. *eureka**C. nobilis* Lour.*C. paradisi**C. poonensis* -Tanaka*C. sinensis* (L.) Osb.*C. tankan* Hay.*C. unshiu* Marc.*Codiaeum variegatum* (L.) Bl.*Coffea arabica* L.*C. liberica* Bull.*Diospyros kaki* L.*Elaeocarpus decipiens* Hemsl.*Eugenia malaccensis**Ficus beecheyana* Hook et Arn.*F. bengalensis**F. retusa* Linn.*F. septica* Burm. f.*F. wightiana* Wall.*Gardenia angusta* (L.) Merr.*Gelonium aequourea* Hance*Ixora chinensis* Lam.*I. coccinea* Linn.*I. parviflora**Jasminum sambac* Soland*Leleba dolichoclada**L. oldhami* Nakai*Mangifera indica* L.*Myrica rubra* Sieb. et Zucc.*Photinia taiwanensis**Phyllostachys makinoi* Hay.*Poncirus trifoliata* Raf.*Psidium guayava* L.*Psychotria rubra* Poir.*Quercus variabilis* Bl.*Saccharum officinarum* L.*Syzygium samarangense* (Bl.)

Merr. et Perry

Thea sinensis L.*Zizyphus sativa* Gaertn.**Neofabraea malicorticis** (Corda) Jackson*Pyrus* sp.**Neottiospora Theae** Saw.*Thea sinensis* L.**Neovossia horrida** (Tak.) P. et A.*Oryza sativa* L.**N. setariae** (Ling) Yu et Lou(= *Tilletia setariae* Ling)*Setaria lutescens* (Wieg.) F.

E. Hubb.

Nigrospora oryzae (B. et Br.)

Petch

Oryza sativa L.**Nothopatella chinensis** Miyake*Broussonetia papyrifera* L.

Herit

Morus acidosa Griff.*M. alba* L.*Prunus persica* Stokes**Nothoravenelia japonica** Diet.*Securinega suffruticosa* (Pall.)

Rehd.

Nyssopsora asiatica Lutj.*Aralia chinensis* L.**N. cedrelae** (Hori) Tranzsch.*Cedrela chinensis* Juss.*C. sinensis* Juss.*Spondias axillaris* Roxb.**N. chinense** (Tai et Cheo) Tai*Koeleruteria paniculata* Laxm.

Nyssopsora formosana (Saw.)

Lutj.

Koelreuteria formosana Hay.**N. koelreuteriae** (Syd.) Tranzsch.*Koelreuteria bipinnata* Franch.**Ochropsora ariae** (Fuck.) Syd.(=*O. sorbi* (Oud.) Diet.)*Pyrus lindleyi* Rehd.*P. serotina* Rehd.*P. sinensis* Lindl. var. *culta* Mak.**O. Sorbi** (Oud.) Diet.(参看 *O. ariae* (Fuck.) Syd.)**Oidiopsis capsici** Saw.*Capsicum annuum* L.**O. papaveris** Saw.*Papaver somniferum* L.**Oidium agrimoniae** Saw.*Agrimonia eupatoria* L.**O. cephalanthi** Saw.*Cephalanthus occidentalis* L.**O. evonymi-japonici** (Arc.) Sacc.*Evonymus japonicus* Thunb.**O. heliotropii-indici** Saw.*Heliotropium indicum* L.**O. heveae** Stein*Hevea brasiliensis* Muell.-Arg.**O. leonuri-sibirici** Saw.*Leonurus sibiricus* L.**O. leucoconium** Desm.*Rosa centifolia* L.**O. rosae-indicae** Saw.*Rosa indica* L. var. *formosana* Hay.**O. sonchi-arvensis** Saw.*Sonchus arvensis* L.**Olivea tectonae** Thirum.*Tectona grandis* L.**Olpidium brassicae** Woron.*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC.*B. oleracea* L. var. *botrytis* L.*B. oleracea* L. var. *capitata* L.**Ophiobolus fracocephali-****altajensis** Murash.*Dracocephalum prattii* (Levl.) H.-M.*D. rupestre* Hance**O. graminis** Sacc.*Triticum aestivum* L.**O. oryzae** Miyake*Oryza sativa* L.**O. setariae** (Saw.) Ito et Kurib.*Setaria italica* Beauv.**Ophiodothis paspali** P. Henn.*Paspalum scrobiculatum* L.var. *orbiculare* (Forst.) Mak.**Ophionectria sojae** Hara*Glycine max* L.**Ophiosporella komarovii** (Jacz.)

Petr.

Polygonatum officinale Al-lesen. var. *humile* Baker**Orthochaeta acalyphae** Saw.(=*Uncinula acalyphae* Tai)*Acalypha australis* L. var.*lanceolata* Hay.*A. brachystachys* Hornem.**Ovularia decipiens** Sacc.*Ranunculus japonicus* Thunb.**Ovulariopsis asclepidis-****curassaviae** Saw.*Asclepias curassavica* L.**O. broussonetiae-papyriferae**

Saw.

Broussonetia papyrifera L.-

Herit

O. caricae Saw.*Carica papaya* Linn.**O. cephalanthi** Saw.*Cephalanthus occidentalis* L.**O. moricola** Delacr.*Morus alba* L.**Papularia sphaerosperma** (Pers.)

Hoehn.

Arundinaria szechuanensis

Rendle

Paranthostomella phyllostachydis

Saw.

Phyllostachys makinoi Hay.**Parodiella perisporiodes** (Berk. et

Curt.) Speg.

Desmodium triflorum (L.) DC.*D. sp.**Eriosema chinense* Vogel*Indigofera kirilowii* Max.*I. sp.***Pellicularia filamentosa** (Pat.)

Rogers

Abutilon avicennae Gaertn.*Allium cepa* L.*Beta vulgaris* L.*B. vulgaris* L. var. *rapacea*

Koch.

Pellicularia filamentosa (Pat.)

Rogers

Brassica campestris L.
B. chinensis L.
B. oleracea L.
B. pekinensis Rupr.
B. sp.
Citrus sinensis (L.) Osb.
Corchorus capsularis L.
Cucumis sativus L.
Cyperus sp.
Digitaria sp.
Fagopyrum vulgare Hill.
Glycine max (L.) Merr.
Gossypium arboreum L.
G. herbaceum L.
G. hirsutum L.
G. sp.
Hibiscus cannabinus L.
Hordeum vulgare L.
Lactuca sativa L.
Luffa cylindrica Roem.
Lycopersicon esculentum Mill.
Nicotiana tabacum L.
Oryza sativa L.
Phaseolus vulgaris L.
Pinus bungeana Zucc.
P. koraiensis Sieb. et Zucc.
P. tabulaeformis Carr.
Pisum sativum L.
Rheum rhaponticum L.
Ricinus communis L.
Solanum melongena L.
S. tuberosum L.
Triticum aestivum L.
T. vulgare Vill.
Vicia faba L.
Vigna sinensis Endl.
sasakii (Shirai) Ito
Alternanthera sessilis R. Br.
Arachis hypogaea L.
Arthraxon ciliare Beauv. var.
cryptantherus Hack.
Bromus catharticus
B. inermis Leyss.
B. japonicus Thunb.
B. remotiflorus (Steud.) Ohwi
Canavalia ensiformis DC.
Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
Chrysopogon aciculatus Trin.

Cinnamomum camphora Nees
 et Ebern.

Commelina nudiflora L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Dactylis glomerata L.
Dolichos lablab L.
D. sp.
Echinochloa crus-galli (L.)
 Beauv.
Eclipta alba (L.) Hassk.
Eichhornia crassipes (Mart.)
 Solms.
Elephantopus scaber L.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Eragrostis plumosa Link.
Eriochloa villosa (Thunb.)
 Kunth.
Glycine max (L.) Merr.
Imperata cylindrica (Linn.)
 Beauv.
Ipomoea aquatica Forsk.
I. batatas (L.) Poir.
Ischaemum rugosum Salisb.
 var. *segetum* Hack.
Maranta arundinacea L.
Marsilea quadrifolia L.
Medicago sativa L.
Mentha piperita L. var.
officinalis Sol.
Miscanthus japonicus (Thunb.)
 Anders.
Monochoria vaginalis Presl.
Morus acidosa Griff.
M. alba L.
Nicotiana tabacum L.
Oryza sativa L.
Panicum repens L.
Phaseolus mungo L.
P. trinervius Heyne.
P. vulgaris L.
Pueraria thunbergiana Benth.
Saccharum officinarum L.
Setaria italica Beauv.
Urena lobata L. var. *tomentosa* Miq.
Vigna sinensis Endl.
Zea mays L.
Zizania caduciflora H.-M.
Penicillium corylophilum Dierckx.
Prunus salicina Lindl.

Penicillium digitatum Sacc.*Citrus deliciosa* Tenore*C. grandis* Osb.*C. junos* Tanaka*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka*C. medica* L.*C. microcarpa* Bge.*C. nobilis* Lour.*C. poonensis* Tanaka*C. sinensis* (L.) Osb.*C. suavissima* Tanaka*C. suholensis* Tanaka*C. tankan* Hay.*C. sp.***P. expansum** Link.*Malus asiatica* Nakai*M. pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.*M. sp.**Pyrus communis* L.*P. sinensis* Lindl. var. *culta* Mak.**P. flavi-dorsum** Bge.*Crataegus pinnatifida* Bge.**P. frequentans** West. var.*Malus pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.**P. fructigenum** Takeuchi*Citrus sinensis* (L.) Osb.*C. sp.***P. islandicum** Sopp.*Malus pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.**P. italicum** Wehmer*Citrus deliciosa* Tenore*C. grandis* Osb.*C. junos* Tanaka*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka**C. medica* L.*C. microcarpa* Bge.*C. nobilis* Lour.*C. poonensis* Tanaka*C. sinensis* (L.) Osb.*C. suavissima* Tanaka*C. suhoiensis* Tanaka*C. tankan* Hay.*C. sp.**Fortunella margarita* (Lour.)
Sw.**Penicillium italicum** Wehmer var.
album Wei*Citrus grandis* Osb.*C. sinensis* (L.) Ost**P. purpurogenum** Stoll*Punica granatum* L.**Periconia pycnospora** Fres.*Morus alba* L.**Peronospora aestivalis** (Syd.)

Gaum.

Medicago hispida Gaertn.*M. sativa* L.**P. alsinearum** Casp.*Stellaria media* (L.) Cyrill.**P. alta** Fuck.*Plantago depressa* Willd.*P. major* L.**P. aparines** (de Bary) Gaum.*Galium aparine* L.*G. aparine* L. var. *spurium*
Koch.**P. aquatica** Gaum.*Veronica anagallis* L.**P. arborescens** (Berk.) de Bary*Papaver alpinum* L.*P. nudicaule* L.*P. somniferum* L.**P. artemisiae-annuae** Ling et M.

C. Tai

Artemisia annua L.**P. calotheca** de Bary*Asperula odorata* L.*A. platygaliun* Max.**P. capparidis** Saw.*Capparis spinosa* L.**P. chelidonii** Miyabe*Chelidonium majus* L.**P. chenopodii** Casp.*Axyris amaranthoides* L.*Chenopodium album* L.*C. glaucum* L.**P. chenopodii-ficifolli** Saw*Chenopodium ficifolium* Sm.**P. chrysanthemii-coronarli**

(Saw.) Ito et Tokunaga

Chrysanthemum coronarium L.**P. crossostephii** Saw.*Crossostephium chinense* (L.)
Mak.**P. dentariae** Rabh.*Cardamine flexuosa* With.subsp. *debilis* (Don.) Schulz.

Peronospora desmodii Miyabe, Ito
et Tokunaga

- Kummerowia stipulacea*
Makino
- P. destructor** (Berk.) Casp.
Allium fistulosum L.
- P. drabae** Gaum.
Draba nemorosa L. var.
hebecarpa Ledeb.
- P. echinospermi** Sw.
Lappula echinata Gilbert var.
heteracantha O. Kuntze
- P. effusa** (Grev.) Ces.
Spinacia oleracea L.
Sueda glauca Bge.
- P. eritrichii** Ito et Tokunaga
Eritrichium pectrinatum DC.
- P. ficariae** (Eds.) Tul.
Ranunculus acris L.
- P. kochiae** Gaum.
Kochia scoparia Schrad.
- P. lamii** Al. Br.
Galeopsis tetrahit L.
Plectranthus glaucocalyx Max.
- P. lepidil-virginici** Gaum.
Lepidium apetatum Will.
- P. leptopyrii** Pai
Leptopyrium fumarioides
Reich.
- P. leptosperma** de Bary
Chrysanthemum sp.
- P. lycii** Ling et M. C. Tai
Lycium chinense Mill.
- P. manschurica** (Naum.) Syd.
Glycine max (L.) Merr.
G. ussuriensis Regel. et
Maack.
- P. media** Gaum.
Stellaria media (L.) Cyrill.
- P. meliloti** Syd.
Melilotus indica (L.) Allesch.
- P. nasturtii-montani** Gaum.
Rorippa globosa (Turcz.)
Thellg.
- P. nasturtii-palustris** Ito et
Tokunaga
Nasturtium globosum Turcz.
N. palustre DC.
- P. parasitica** (Pers.) Fr.
Brassica albo-glabra Bail.
B. campestris L.

- B. campestris* L. var. *napo-*
brassica DC.
- B. campestris* L. var. *oleifera*
Diels.
- B. campestris* L. var. *pur-*
puraria Bail.
- B. cernua* Thunb.
- B. chinensis* L. var. *oleifera*
Mak.
- B. chinensis* L. var.
- B. japonica* Sieb.
- B. juncea* L.
- B. juncea* L. var. *thumida*
Tsen et Lee
- B. napiformis* Bail.
- B. napus* L.
- B. oleracea* L.
- B. oleracea* L. var. *capitata*
L.
- B. oleracea* L. var.
gongylodes L.
- B. pekinensis* Rupr.
- B. rapa* L.
- B. sp.*
- Capsella bursa-pastoris* (L.)
Medik.
- C. bursa-pastoris* (L.) Medik.
var. *auriculata* Mak.
- C. bursa-pastoris* (L.) Medik.
var. *pinnata* Mak.
- Raphanus sativus* L.
- R. sativus* L. var. *macropodus*
Mak.
- P. pisi** Syd.
Pisum sativum L.
- P. potentillae** de Bary
Potentilla supina L.
- P. potentillae** de Bary var.
reptantis Gaum.
Potentilla supina L.
- P. ranunculi** Gaum.
Ranunculus cantoniensis DC.
- P. schleideni** Unger.
Allium bakeri Regel.
A. cepa L.
- A. schleideni* Unger.
- A. ledebourianum*, Schult. f.
- A. sp.*
- P. stellariae-aquaticae** Saw.
Stellaria aquatica Scop.
- P. sulfurea** Gaum.
Artemisia sp.

Peronospora thlaspeo-arvensis
Gaum.

Thlaspi arvense L.

P. thyrocarpii Ling et M. C. Tai
Thyrocarpus sampsonii Hance

P. trifoliorum de Bary
Glycine max (L.) Merr.
Medicago sativa L.

P. viciae de Bary
Glycine max (L.) Merr.
Lens culinaris Medic.
Pisum sativum L.
Vicia cracca L.
V. faba L.
V. hirsuta (L.) Gray
V. sativa L.

Pestalozzia bischoffiae Saw.
Bischofia trifoliata Hook

P. calami Saw.
Calamus margaritae Hance

P. compta var. *ramicola* Berl. et
Brev.
Rosa sp.

P. congensis P. Henn.
Eriobotrya japonica Lindl.

P. cycadis Allesch.
Cycas revoluta Thunb.

P. dianellicola Saw.
Dianella ensifolia DC.

P. diospyri Syd.
Diospyros kaki L.

P. ecdysantherae Saw.
Ecdysanthera utilis Hay. et
Kawakami

P. eriobotryae McAlp.
Eriobotrya japonica Lindl.

P. eriobotryae-japonicae Saw.
Eriobotrya japonica Lindl.

P. flagellata Earle
Quercus dentata Thunb.

P. funerea Desm.
Eriobotrya japonica Lindl.
Pinus massoniana Lamb.
Podocarpus chinensis Wall.

P. funerea Desm. var.
macrochaeta Speg.
Pinus massoniana Lamb.

P. ginkgo Hori
(= *P. sinensis* Shen)
Ginkgo biloba L.

P. gossypii Hori
Gossypium herbaceum L.

G. hirsutum L.
G. sp.

P. guepini Desm.
Camellia japonica L.
Pyrus betulifolia Bge.
Smilax sp.

P. kawakamii Saw.
Oryza sativa L.

P. kriegeeriana Bres.
Epilobium angustifolium L.

P. leprogena Speg.
Musa cavandishii L.

P. macrotricha Kleb.
Pinus thunbergii Parl.

P. malicola Hori
Malus pumila Mill. var.
domestica Schneid.

P. palmorum Cke.
Caryota ochlandra Hance
Cocos nucifera L.
Thea sinensis L.

P. pandani Saw.
Panax odoratissimum L. f.

P. pauciseta Sacc.
Mangifera indica L.

P. photinae Thuem.
Photinia serrulata Lindl.

P. puttemansii P. Henn.
Camellia sasanqua Thunb.
Thea sinensis L.

P. rhododendri (Sacc.) Guba
Rhododendron argyrophyllum
Franch. var. *omeiense* Rehd.
et Wils.

P. salicis Saw.
Salix glandulosa Seem. var.
warburgi Koidz.

P. shiraiana P. Henn.
Podocarpus macrophylla Don.
P. sinensis Shen
(參看 *P. ginkgo* Hori)

P. sorbi Pat.
Pyrus sp.
Sorbus sp.

P. theae Saw.
Gardenia jasminoides Ell. var.
ovalifolia (Curt.) Hort.
Thea sinensis L.
T. sinensis L. var. *assamica*
Pierre

Pestalozzia traverseta Sacc.*Malus pumila* Mill.*Pyrus serotina* Rehd.**P. uvicola** Speg.*Vitis vinifera* L.**Phacidium repandum** (Alb. et Schw.) Rehm.*Rubia cordifolia* L.**Phaeodiscula tremae** Saw.*Trema orientalis* Bl.**Phaeodothis ligustri** Saw.*Ligustrum nokoensis* Masam.
et Mori**Phaeoisariopsis tetrapanacis** Saw.*Tetrapanax papyrifera* C.
Koch.**Phaeomonostichella symploci**
(Keissler) Petr.*Symplocos ernesti* Dunn*S. wilsoni* Brand**Phaeosaccardinula javanica**

(Zimm.) Yamam.

Acacia richii A. Br.*Blechnum orientale* L.*Camellia sasanqua* Thunb.*Cinchona ledgeriana* Moens.*Citrus grandis* Osb.*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka**C. paradisi**C. poonensis* Tanaka*C. tankan* Hay.*Codiaeum variegatum* (L.) Bl.*Coffea arabica* L.*C. liberica* Bull.*Dendrocalamus latiflorus*

Munro

Diospyros kaki L.*Elaeocarpus serratus**Eugenia malaccensis**E. uniflora* Linn.*Euphoria longana* Lam.*Ficus bengalensis**F. septica* Burm. f.*F. wightiana* Wall.*Gardenia angustifolia**Holarrhena antidysenterica**Itea chinensis* Hook et Arn.
var. *sub serrata* Max.*Leleba dolichoclada**Litchi chinensis* Sonn.*Machilus zuihoensis* Hay.*Mallotus cochinchinensis* Lour.*M. japonicus* Muell.-Arg.*Mangifera indica* L.*Melastoma candidum* Don.*Miscanthus japonicus* (Thunb.)
Anders.*Myrica rubra* Sieb. et Zucc.*Photinia taiwanensis**Phyllostachys makinoi* Hay.*Psidium guayava* L.*Rourea volubilis**Schefflera octophylla* Harms.*Thea sinensis* L.*Trema orientalis* Bl.*Urena lobata* L.*Wendlandia glabrata***Phaeoseptoria oryzae** Miyake*Oryza sativa* L.**Phaeosphaerella melongenae** Saw.*Solanum melongena* L.**P. oryzae** Hara*Oryza sativa* L.**Phaeosphaeria oryzae** Miyake(参看 *Trematosphaerella*
oryzae (Miyake) Padw.)**Phakopsora ampelopsidis** Diet.
et Syd.*Ampelopsis brevipedunculata*
Koehne.*A. japonica* Merr.*Parthenocissus heterophylla*
Merr.*P. thunbergii* Nakai*Vitis betulifolia* Diels et Gilg.*V. pentagona* Diels et Gilg.*V. vinifera* L.*V. sp.***P. artemisiae** Hirat. f.*Artemisia capillaris* Thunb.*A. dracunculus* L.*A. japonica* Thunb.*A. lactiflora* Wall.*A. parviflora* Roxb.*A. verbenacea* (Komar.) Kitah.*A. vulgaris* L.*A. vulgaris* L. var. *indica* Max.*A. sp.**Aster sp.*

- Phakopsora artemisiae** Hirat. f.
Chrysanthemum indicum L.
 C. sp.
- P. cheoana** Cummins
Cedrela sinensis Juss.
- P. cingae** (Syd.) Hirat. f.
Flueggea microcarpa Blume
 F. sp.
- P. compositarum** Miyake
Artemisia sacrorum Ledeb.
A. vulgaris L. var. *vulgatissima* Bess.
 A. sp.
Aster sp.
Chrysanthemum indicum L.
C. sibiricum Fisch.
Myrionis dioica Bge.
- P. ehretiae** Hirat.
Ehretia acuminata R. Br.
E. taiwaniana Nakai
 E. sp.
- P. elephantopodis** Hirat. f.
Elephantopus scaber L.
Vernonia patula Merr.
- P. fici-erectae** Ito et Otani
Broussonetia papyrifera L.-Herit
Ficus carica L.
F. formosana Max.
F. vasculosa Wall.
 F. sp.
Morus acidosa Griff.
 M. alba L.
- P. gossypii** (Arthur) Hirat. f.
Gossypium barbadense L.
 G. herbaceum L.
- P. incompleta** (Syd.) Cummins
Andropogon sp.
Eulalia sp.
Ischaemum aristatum L.
 I. ciliare Retz.
 I. crassipes (Steud.) Thell.
 I. guianense Kunth.
- P. malloti** Cummins
Mallotus sp.
- P. meibomiae** Arthur
Desmodium racemosum (Thunb.) DC.
- P. meliosmae** Kusano
Meliosma oldhami Miq.
 M. rhoifolia Max.
- M. simplicifolia* Roxb.
 M. sp.
- P. nishidana** Ito
Ficus heteromorpha Hemsl.
F. martini Levl.
- P. pachyrhizi** Syd.
Glycine max (L.) Merr.
G. ussuriensis Regel. et Maack.
 G. sp.
Pachyrhizus erosus (L.) Urb.
P. tuberosus Spreng.
Pueraria thunbergiana Benth.
P. thunbergiana var. *typica* Honda
Vigna sinensis Endl.
- P. tecta** Jackson et Holw.
Commelina nudiflora L.
C. undulata R. Br.
 C. sp.
- P. zizyphi-vulgaris** (P. Henn.) Diet.
Paliurus ramosissimus Poir.
 P. sp.
Zizyphus sativa Gaertn.
Z. sativa Gaertn. var. *inermis* (Ege.) Rehd.
Z. sativa Gaertn. var. *sinensis* Rehd.
Z. sativa Gaertn. var. *spinosa* Bge.
Z. spinosus Hu
 Z. sp.
- Phleospora microspora** Miura
Malus baccata Borkh. var. *mandshurica* Schneid.
- P. symploci** Saw.
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
- Phoma albomaculata** Miura
Ranunculus japonicus Thunb.
- P. apicola** Speg.
Apium graveolens L.
- P. arundinacea** Sacc.
Sinocalamus affinis (Rendle) McClure
- P. asclepiadis** Saw.
Asclepias curassavica L.
- P. asparagi** Sacc.
Asparagus officinalis L.
- P. batatas** Ell. et Halst.
Ipomoea batatas (L.) Poir.

- Phoma betae** Frank
Beta vulgaris L.
B. vulgaris L. var. *rapacea* Koch.
- P. camelliae** Cke.
Thea sinensis L.
- P. caryophylli** Booke
Dianthus sp.
- P. cercidicola** P. Henn.
Cercis chinensis Bge.
- P. chinensis** Sims.
Thea sinensis L.
- P. citricarpa** McAlp.
Citrus aurantium Linn.
C. deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. junos Tanaka
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. sinensis (L.) Osb. f. *sekkan* Hay.
C. tankan Hay.
C. tankan Hay. f. *koshotankan* Hort.
C. sp.
Fortunella crassifolia Sw.
- P. cryptomeriae** Kasai
Cryptomeria japonica Don.
Cryptotaenia japonica Hassk.
- P. dahliae** Berk.
Dahlia variabilis Desf.
- P. destructiva** Plowr.
Capsicum annuum L.
C. frutescens L.
- P. diospyri** Syd.
Diospyros kaki L.
- P. enteroleuca** Sacc.
Prunus sp.
- P. garciniae** Saw.
Garcinia spicata Hook
- P. glumarum** Ell. et Tracy
Oryza sativa L.
- P. hibisci-esculentif** Saw.
Hibiscus esculentus L.
- P. jasmini-sambactis** Saw.
Jasminum sambac Soland
- P. lebbek** Saw.
Albizzia lebbek (L.) Benth.
- P. lingam** (Tode) Desm.
Brassica campestris L.
- B. oleracea* L.
B. oleracea L. var. *botrytis* L.
- P. macrostylospora** Saw.
Amaranthus mangostanus L.
- P. morifolia** Berl.
Morus alba L.
- P. sesami** Saw.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- P. solani** Halst.
Solanum melongena L.
- P. subnervisequa** Desm.
Evonymus venosa Hemsl.
- P. taxi** (Berk.) Sacc.
Taxus chinensis Rehd.
- Phomopsis amygdalina** Canonaco
Prunus armeniaca L.
P. armeniaca L. *ansu* Max.
P. persica Stokes
P. salicina Lindl.
- P. batatae** Ell. et Halst.
 (Diaporthe batatatis Harter et Field)
Ipomoea batatas (L.) Poir.
- P. broussonetiae** (Sacc.) Diet.
Broussonetia sp.
- P. citri** Fawcett (Diaporthe citri (Fawcett) Wolf)
Citrus deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. lemon (Burm. f.) Tanaka var. *eureka*
C. medica L.
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. tankan Hay.
C. sp.
- P. sejae** Lehman
 (Diaporthe sojae Lehman)
Glycine max (L.) Merr.
- P. truncicola** Miura
Malus pumila Mill.
- P. vexans** (Sacc. et Syd.) Harter
 (Diaporthe vexans Gratz.)
Capsicum annuum L.
Solanum melongena L.
- Phragmidium arisanense** Hirat. f. et Hash.
Rubus rarissimus Hay.
- P. brevipedicellatum** Hirat.
Potentilla kleiniana W. et A.

- Phragmidium formosanum** Hirat. f.
Rubus glandulosocalycinus
 Hay
R. hirsuto-pungens Hay.
R. parvipungens Hay.
- P. griseum** Diet.
Rubus conduplicatus Duthie
R. crataegifolius Bge.
R. mingetsensis Hay.
R. morifolius Sieb.
R. sp.
- P. handelii** Petr.
Rosa glomerata Rehd. et Wils.
- P. hashiokai** Hirat.
Rosa transmorrisonensis Hay.
- P. montivagum** Arthur
Rosa davurica Pall.
R. sp.
- P. mucronatum** (Pers.) Schlecht.
Rosa davidii Crep.
R. microcarpa Lindl.
R. multiflora Thunb.
R. odocrata Sweet
R. rugosa Thunb.
R. sempervirens L. var.
scandens Nich.
R. xanthina Lindl.
R. sp.
- P. nambuianum** Diet.
Rubus phoenicolasius Max.
R. sp.
- P. okianum** Hara
Rubus sp.
- P. papillatum** Diet.
Potentilla cryptotaemiae Max.
- P. pauciloculare** (Diet.) Syd.
Rubus idaeus L.
R. parvifolius L.
R. rosaefolius Sm.
R. subornatus Focke
R. triphyllus Thunb.
R. sp.
- P. potentillae** (Pers.) Karst.
Potentilla chrysantha Triv.
P. conferta
P. discolor Bge
P. nivea L.
P. paradoxa Nutt.
P. supina L.

- P. rosae-davuricae** Miura
Rosa davurica Pall.
R. sp.
- P. rosae-multiflorae** Diet.
Rosa laevigata Michx.
R. multiflora Thunb.
R. polyantha Sieb. et Zucc.
 var. *genuina* Nakai
R. spinosissima L. var.
mandshurica Yabe
R. sp.
- P. rosae-rugosae** Kasai
Rosa omeiensis Rolfe
R. rugosa Thunb.
R. sp.
- P. rubi-fraxinifolii** Syd.
Rubus euphlebophyllus Hay.
R. fraxinifolius Poir.
R. fraxinifolius Poir. var.
yushunii Suzuki et Yamam.
R. taiwanianus Matsum.
- P. rubi-thunbergii** Kusano
Rubus thunbergii Sieb. et
 Zucc.
R. sp.
- P. shensianum** Tai et Cheo
Rubus idaeus L.
- P. sikangense** Petr.
R. pungens Camb.
- P. sinicum** Tai et Cheo
Rubus crataegifolius Bge.
- P. taipai-shanense** Wang
Rubus parvifolius L.
- P. tuberculatum** Muell.
Rosa odorata Sweet
R. sp.
- P. violaceum** (Schultz.) Wint.
Rubus sp.
- P. yamadanum** Hirat. f.
Rubus pungens Camb.
- Phragmocarpella japonica** Hara
Bambusa sp.
- Phragmodiaporthe aculeata**
 (Petch) Wehmeyer
Thea sinensis L.
- Phyllachora andropogonis** Karst.
 et Har.
Andropogon sp.

Phyllachora arthraxonis-hispidi
Saw.

- Arthraxon hispidus* (Thunb.)
Mak. var. *typicus* Honda
- P. arundinelliae** Saw.
Arundinella anomala Steud.
A. setosa Trin.
- P. arundinis** Saw.
Arundo formosana Hack.
- P. bauhiniae** Saw.
Bauhinia championi Benth.
- P. bromi** Zokl.
Bromus sp.
- P. cantonensis** Syd.
Litsea glutinosa (Lour.) C. B.
Rob.
- P. coelestis** P. Henn.
Coix lachryma-jobi L.
C. lachryma-jobi L. var.
susutama Honda
- P. cynodontis** (Sacc.) Niessl.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
C. sp.
- P. eragrostidis** Saw.
(= *P. eragrostidis* Petr.)
Eragrostis atrovirens Trin.
E. ferruginea (Thunb.) Beauv.
- P. eragrostidis** Petr.
(参看 *P. eragrostidis* Saw.)
- P. erianthi** Saw.
Erianthus pollinoides Rendle
- P. evansii** Syd.
Setaria palmifolia (Koenig)
Stapf.
- P. fici-beecheyanae** Saw.
Ficus beecheyana Hook et Arn.
- P. fici-septicae** Saw.
Ficus septica Burm. f.
- P. fici-variolosae** Petr.
Ficus variolosa Wall.
- P. fici-wightianae** Saw.
Ficus wightiana Wall.
- P. graminis** (Pers.) Fuck.
Agropyron ciliare (Trin.)
Franch.
A. cristatum (L.) Gaertn.
A. semicostatum Nees
Avena sp.
Cymbopogon citratus (D.C.)
Stapf. subsp. *marginatus* var.
goeringii Hack

Elymus dahuricus Turcz. var.
cylindricus Franch.

- E. sibiricus* L.
- Eragrostis ferruginea* (Thunb.)
Beauv.
- Miscanthus sinensis* Anders.
- Panicum repens* L.
- Paspalum scrobiculatum* L.
- Pennisetum* sp.
- Rottboellia japonica* Honda
- Setaria glauca* Beauv.
- Spodiopogon* sp.
- Themeda triandra* Forsk.
- Tripogon filiformis* Nees
- P. holcus fulvi** Saw.
Holcus fulvus Br. var. *genui-*
nus Honda
- P. indocalami** Saw.
Indocalamus nitakayamensis
Nakai
- P. lathyri** (Liev.) Theiss. et Syd.
Astragalus mahoschanicus
H.-M.
- P. leptotheca** Theiss. et Syd.
Microstegium sp.
- P. lespedezae** (Schw.) Sacc.
Camptolotris polyantha
(Franch.) Schindl.
C. sargentiana
- P. maculans** (Karst.) Theiss. et
Syd.
Bambusa stenostachys Hack.
- P. melastomae-candidae** Saw.
Melastoma candidum Don. var.
nobotan Mak.
- P. microstegii** Saw.
Microstegium ciliatum var.
wallichiana Hack.
- P. minuta** P. Henn.
Hibiscus tiliaceus L.
- P. miscanthi** Syd.
Miscanthus japonicus (Thunb.)
Anders.
M. sinensis Anders.
M. sp.
- P. miscanthi-japonici** Saw.
Miscanthus japonicus (Thunb.)
Anders.

- Phyllachora orbicula** Rehm.
Bambusa spinosa Roxb.
B. sp.
Phyllostachys sp.
- P. oplismeni-compositi** Saw.
Opismenus compositus (L.) Beauv.
- P. penniseti-japonici** Saw.
Pennisetum japonicum Trin.
- P. pennisetina** Syd.
Pennisetum alopeuroides (L.) Spreng.
- P. phaseolina** Syd.
Phaseolus minimus Roxb. f. *typicus* Hosok.
Vicia luteola Benth.
- P. phragmitis-karkae** Saw.
Phragmitis karka Trin.
- P. phyllostachydis** Hara
Arundinaria densiflora Rendle
Phyllostachys pubetula Munro
P. reticulata Koch.
- P. pogonatheri** Syd.
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack.
- P. pongamiae** (Berk. et Br.) Petch
Pongamia pinnata (L.) Merr.
- P. sacchari** P. Henn.
Saccharum arundinaceum Retz.
- P. sacchari-spontanei** Syd.
Saccharum officinarum L.
- P. scolopiae** Saw.
Scolopia oldhami Hance
- P. shiraiana** Syd.
Bambusa sp.
Ischurochloa stenostachya Nakai
Phyllostachys sp.
- P. sinensis** Sacc.
Bambusa pachinensis Hay.
B. sp.
Phyllostachys reticulata Koch.
Sinocalamus affinis (Rendle) McClure
- P. sorghi** Hoehn.
Sorghum vulgare Pers.
- P. syntherismae** Saw.
Syntherisma sanguinalis Dulac.
var. ciliaris Honda

- P. vanderystii** Theiss. et Syd.
Setaria plicata (Lam.) Cke.
- P. xylostei** (Fr.) Fuck.
Lonicera stephanocarpa Franch
- Phyllactinia corylea** (Pers.) Karst
Actinidia formosana Hay.
Ailanthus altissima (Mill.) Sw.
Alangium chinense (Lour.) Rehd.
A. platanifolium Harms.
Alnus cremastogyne Burk.
A. formosana (Burk.) Mak.
A. japonica Sieb. et Zucc.
A. nepalensis Don.
Betula davurica Pall.
B. luminifera Winkl.
Broussonetia kaempferi Sieb.
B. papyrifera L.-Herit
B. sp.
Caesalpinia sépiaria Roxb.
Callicarpa giraldiviana Hesse
Carica papaya Linn.
Carpinus sp.
Castanea mollissima Bl.
C. sp.
Catalpa ovata Don.
Cedrella chinensis Juss.
C. microcarpa DC.
C. sinensis Juss.
Celtis bungeana Bl.
Corylopsis sinensis Hemsl.
Crataegus scabrifolius (Fr.) Rehd.
Diospyros kaki L.
D. kaki L. *var. silvestris* Mak.
D. lotus L.
D. sp.
Elscholtzia sp.
Firmiana simplex Wight
Fortunearia sinensis Rehd. et Wils.
Fraxinus chinensis Roxb.
F. retusa Champ.
Gleditschia sinensis Lam.
Hemiptelea davidii Planch.
Juglans regia L.
Kalopanax pictum (Thunb.) Nakai
Lindera sp.
Litsea citrata Bl.

Phyllactinia corylea (Pers.) Karst.

- L. pungens* Hemsl.
Melia azedarach L.
Morus acidosa Griff.
M. alba L.
M. cathayana Hemsl.
M. latifolia Bur.
M. multicaulis Perr.
M. sp.
Platanus orientalis L.
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
Populus alba L.
P. laurifolia Ledeb.
P. maximowiczii Henry
P. simonii Carr.
P. suaveolens Fisch.
P. tomentosa Carr.
Principia utilis Royle
Pterocarya stenoptera DC.
Pteroceltis tartarinowii Max.
Pyracantha sp.
Pyrus betulifolia Bge.
P. bretschneideri Rehd.
P. communis L.
P. lindleyi Rehd.
P. pashia Buch.-Ham.
P. serotina Rehd.
P. sinensis Lindl. var. *culta* Mak.
P. ussuriensis Max.
P. sp.
Quercus aliena Bl.
Q. fabri Hance
Q. variabilis Bl.
Q. sp.
Rhus semilata Murr.
Sapium sebiferum Roxb.
Sassafras tzumu Hemsl.
Smilax herbacea L.
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
Trema orientalis Bl.
Vitis heterophylla Thunb.
imperialis Miyabe
 (= *P. Salmonii* Blumer)
Actinidia chinensis Planch.
A. lanata Hemsl.
A. latifolia Hemsl.
A. sp.
Paulownia fargesii (Thunb.) Schneid.

P. tomentosa (Thunb.) Schneid.

(參看 *P. imperialis* Miyabe)

P. salmonii Blumer

Phyllosticta abutilonis P. Henn.

Abutilon avicennae Gaertn.

P. acanthopanacis Syd.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.

Kalopanax pectus (Thunb.)

Nakai

K. pictus (Thunb.) Nakai

P. adusta Ell. et Mart.

Citrus sinensis (L.) Osb.

P. ailanthi Sacc.

Ailanthus altissima (Mill.) Sw.

P. alpiniae-kelungensis Saw.

Alpinia kelungensis Hay.

P. althaeina Sacc.

Althaea rosea Cav.

P. amaranthi Ell. et Keli.

Amaranthus mangostanus L.
A. tricolor L.

P. antirrhini Syd.

Antirrhinum majus L.

P. araliae Sacc. et Berl.

Aralia cordata Thunb.
Arisaema serratum Schott.

P. araliae-cordatae Saw.

Aralia cordata Thunb.

P. argyrea Speg.

Elaeagnus multiflora Thunb.
E. pungens Thunb.
E. sp.

P. artemisiae-lactiflorae Saw.

Artemisia lactiflora Wall.

P. aucubae Sacc. et Speg.

Aucuba sp.

P. azukiae Miura

Phaseolus mungo L.
P. radiatus L. var. *typicus* Prain.

P. batatae (Thunb.) Cke.

Ipomoea batatas (L.) Poir.

P. bauhiniae Cke

Bauhinia sp.

P. bellunensis Mart.

Alnus japonica Sieb. et Zucc.
Ulmus suberosa

- Phyllosticta beltranii** Penz.
Citrus nobilis Lour.
C. unshiu Marc.
- P. betae** Oud.
Beta vulgaris L.
- P. bolleana** Sacc.
Evonymus sp.
- P. brassicae** (Curr.) Westd.
Brassica oleracea L.
B. sp.
- P. cannabis** (Kirchn.) Speg.
Cannabis sativa L.
- P. caprifolii** (Opiz.) Sacc.
Lonicera vesicaria Kom.
- P. capsici** (Magn.) Sacc.
Capsicum annuum L.
- P. caricaecola** Saw.
Carica papaya Linn.
- P. caryotae** Shen
Caryota ochlandra Hance
- P. catechu** Saw.
Areca catechu L.
- P. chenopodii** Sacc.
Chenopodium album L.
C. ficifolium Sm.
Spinacia oleracea L.
- P. chrysanthemi** Ell. et Dearn.
Chrysanthemum indicum L.
C. sinense Sab.
- P. circumscissa** Cke.
Prunus persica Stokes var.
vulgaris Max.
- P. cirsii** Desm.
Cinnamomum sp.
Cirsium segetum Bge.
- P. citri** Hori
Citrus grandis Osb.
- P. corchori** Saw.
Corchorus capsularis L.
- P. coriariae** Saw.
Coriaria intermedia Matsum.
- P. crataegicola** Sacc.
Crataegus pinnatifida Bge.
C. pinnatifida Bge. var. *typica* Schneid.
- P. cruenta** (Fr.) Kickx.
Polygonatum lasianthum
P. sp.
Smilax herbacea L.
- P. cucurbitacearum** Sacc.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duch.
- P. cylindrospora** Saw.
Ficus wightiana Wall.
- P. cymbidii** Saw.
Cymbidium alodolium Sw.
- P. dalbergiicola** Syd.
Dalbergia hupeana Hance
- P. diapensiae** Pat.
Diapensia himalaica var. *acutifolia* (H.-M.) Evans.
- P. dioscoreae** Cke.
Dioscorea batatas Decne.
D. japonica Thunb.
- P. eriobotryae** Thuem.
Eriobotrya japonica Lindl.
- P. erratica** Ell. et Ev.
Pyrus calleryana Decne.
- P. fagopyri** Miura
Fagopyrum vulgare Hill.
- P. fici-wightianae** Saw.
Ficus wightiana Wall.
- P. forsythiae** Sacc.
Forsythia sp.
- P. fragaricola** Desm. et Rob.
Fragaria chiloensis Duch.
F. chiloensis Duch. var. *ananassa* Bail.
F. sp.
- P. fraxini** Ell. et Mart.
Fraxinus sp.
- P. gardeniicola** Saw.
Gardenia jasminoides Ell. var. *grandiflora* Hort.
- P. gentianaecola** (DC.) Pat.
Gentiana sp.
- P. ginkgo** Brun.
Ginkgo biloba L.
- P. gordoniiicola** Saw.
Gordonia axillaris Ditr.
- P. gossypina** Ell. et Mart.
Gossypium herbaceum L.
G. barbadense L.
G. hirsutum L.
G. sp.
- P. grandimaculans** Bubak et Krieg.
Fragaria chiloensis Duch. var. *ananassa* Bail.

Phyllosticta grossulariae Sacc.*Ribes rubrum* L.**P. hederacea** Allesch.*Hedera sinensis* Tobl.**P. heveae** Zimm.*Hevea brasiliensis* Muell.-Arg.**P. hokusiensis** Hara*Hibiscus cannabinus* L.**P. hydrangeae** Ell. et Ev.*Hydrangea* sp.**P. ipomoeae** Ell. et Kell.*Ipomoea aquatica* Forsk.**P. iteae** Saw.*Itea chinensis* Hook et Arn.**P. juglandis** (DC.) Sacc.*Juglans regia* L.**P. kawakamii** Saw.*Dioscorea alata* L.**P. kotoensis** Saw.*Stephania sasakii* Hay.**P. kuwaecola** Hara*Morus* sp.**P. lappae** Sacc.*Arctium lappa* L.**P. ligustrina** Sacc.*Ligustrum* sp.**P. liquidambaricola** Saw.*Liquidambar formosana*
Hance**P. lycopersici** Peck*Lycopersicum esculentum* Mill.**P. maculiformis** (Pers.) Sacc.*Castanea mollissima* Bl.**P. magnoliae** Sacc.*Magnolia* sp.*Michelia* sp.**P. magnoliae-pumilae** Saw.*Magnolia coco* DC.**P. mali** Pril. et Delacr.*Malus pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica*
schneid*M.* sp.**P. malkoffii** Bubak*Gossypium arboreum* L.*G. hirsutum* L.**P. melampyricola** Miura*Melampyrum roseum* Max.**P. melongenae** Saw.*Solanum melongena* L.**P. miurai** Miyake*Oryza sativa* L.**P. mussaendae** Saw.*Mussaenda parviflora* Miq.**P. napi** Sacc. (*Mycosphaerella*
brassicola (Duby) Lindau)*Brassica oleracea* L. var.
capitata L.**P. negundinis** Sacc.*Acer negundo* L.**P. noackiana** Allesch.*Phaseolus vulgaris* L.**P. nicotianae** Ell. et Ev.*Nicotiana rustica* L.*N. tabacum* L.**P. nigra** Saw.*Corchorus capsularis* L.**P. nobilis** Thuern.*Lindera communis* Hemsl.**P. oryzae** Hori(参看 *P. oryzaecola* Hara)**P. oryzaecola** Hara(= *P. oryzae* Hori)*Oryza sativa* L.**P. papyicola** Saw.*Carica papaya* Linn.**P. perseae** Ell. et Mart.*Persea gratissima* Gaertn.**P. persicae** Sacc.*Prunus persica* Stokes
P. sp.**P. peucedani** Saw.*Peucedanum decursivum* Max.**P. phaseolina** Sacc.*Canavalia gladiata* DC.*Glycine max* (L.) Merr.*Phaseolus aureus* Roxb.*P. mungo* L.*P. radiatus* L.*P. radiatus* L. var. *aurea*
Prain.*P. vulgaris* L.*Pisum sativum* L.*Vigna sinensis* Endl.**P. physaleos** Sacc.*Capsicum annuum* L.*Physalis alkekengi* L.**P. pirina** Sacc.*Malus asiatica* Nakai*M. pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domes-*
tica Schneid.*M.* sp.

Phyllosticta pirina Sacc.*Pyrus calleryana* Decne.*P. serotina* Rehd.*P. sp.***P. platanoidis** Sacc.*Acer mono* Max. var. *platanoides* Miyabe**P. polygoni-bungeanae** Miura*Polygonum bungeanum* Turcz.**P. polygonorum** Sacc.*Fagopyrum vulgare* Hill.**P. populea** Sacc.*Populus laurifolia* Ledeb.*P. sp.***P. populina** Sacc.*Populus pyramidalis* Borkh.**P. prunicola** Sacc.*Prunus armeniaca* L.**P. puerariicola** Saw.*Pueraria thunbergiana* Benth.**P. quercus** Sacc. et Speg. -*Quercus dentata* Thunb.**P. rhei** Ell. et Ev.*Rheum officinale* Bail.**P. ricini** Rostr.*Ricinus communis* L.**P. robiniella** Miura*Robinia pseudo-acacia* L.**P. rosarum** Pass.*Rosa sp.***P. rubi-adenotrichopodi** Saw.*Rubus adenotrichopodus* Hay.**P. rubiae** Miura*Rubia cordifolia* L.**P. rumicicola** Miura*Rumex acetosa* L.*R. crispus* L.*R. dentata* Capd.**P. sapindicola** Saw.*Sapindus mukorossi* Gaertn.**P. siameae** Saw.*Cassia siamea* Lamk.**P. sojaecola** Massal. (**Pleosphaerullina sojaecola** (Massal.) Miura)*Glycine max* (L.) Merr.**P. solitaria** Ell. et Ev.*Malus pumila* Mill.**P. sorghina** Sacc.*Andropogon sorghum* Brot.
var. *sudanensis* Piper.**Echinochloa crus-galli** (L.)

Beauv.

Panicum miliaceum L.*Sorghum vulgare* Pers.**P. stephaniae** Saw.*Stephania cepharantha* Hay.**P. stewartiae** Syd.*Stewartia sinensis* Rehd. et
Wils.**P. tabaci** Pass.*Nicotiana tabacum* L.**P. take** Miyake et Hara*Sinocalamus affinis* (Rendle)
McClure**P. theae** Spesch.*Camellia japonica* L.*Thea sinensis* L.**P. theicola** Petch*Thea sinensis* L.**P. theaefolia** Hara*Thea sinensis* L.**P. thladianthae** Saw.*Thladiantha formosana* Hay.**P. turmanensis** Miura*Malus pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica*
Schneid.**P. ulmicola** Sacc.*Ulmus japonica* Sarg.*U. macrocarpa* Hance*U. pumila* L.**P. vogelii** (Syd.) Diedicke*Tilia amurensis* Rupr.**P. vulgaris** Desm. var. **philadelphii**
Sacc.*Philadelphus tenuifolius* Rupr.
et Max.*Prunus pseudocerasus* Lindl.**P. wikstroemiae** Saw.*Wikstroemia indica* C. A. Mey.**P. yugokwa** Saw.*Magnolia coco* DC.**Phyllostictina paederiae** Petr.*Paederia scandens* (Lour.)
Merr.**Physalospora cleyerae** Saw.*Cleyera japonica* Thunb. var.
morii Masam.**P. commelinae** Saw.*Commelina nudiflora* L.**P. fici-formosanae** Saw.*Ficus formosana* Max.

Physalospora gossypina Stev.(参看 *Diplodia gossypina* Cke.)**P. granati** Tagaashi*Punica granatum* L.**P. ilicella** Teng*Ilex latifolia* Thunb.**P. ilicella** Teng var. **minor** Teng*Ilex cornuta* Lindl.**P. melastomatis** Saw.*Melastoma candidum* Don.var. *nobotan* Mak.**P. obtusa** (Schw.) Cke.(参看 *Sphaeropsis malorum* Pk.)**P. phylltaenoides** (Berk. et Curt.)

Sacc.

Dolichos sp.**P. piricola** Nose(参看 *Macrophoma kawatsukai* Hara)**P. rhodina** Berk. et Curt.(参看 *Diplodia natalensis* Evan.)**P. tranzschelii** Woron.*Caragana* sp.**P. tueumanensis** Speg.(参看 *Colletotrichum falcatum* Went)**Physoderma maydis** Miyabe*Zea mays* L.**Phytophthora allii** Saw.*Allium fistulosum* L.**P. boehmeriae** Saw.*Boehmeria nivea* Gaud.**P. cactorum** (Lebert et Cohn.)

Schroet.

Acer sp.*Boehmeria nivea* Gaud.*Citrus sinensis* (L.) Osb. f.
sekkan Hay.*C. tankan* Hay. f.*Impatiens balsamina* L.*Lilium davuricum* Ker.*Malus pumila* Mill.*Panax schinseng* Nees**P. capsici** Leon.*Capsicum frutescens* L.**P. carica** (Hara) Hori*Ficus carica* L.**P. cinchonae** Saw.*Cinchona succirubra* Pav.**P. citrophthora** (Smith et Smith)

Leon.

Citrus medica L.*C. sinensis* (L.) Osb.*C. sp.***P. colocasiae** Racib.*Colocasia esculenta* Schott.**P. cyperi** (Ideta) Ito*Cyperus malaccensis* Roxb.**P. cyperi-rotundati** Saw.*Cyperus rotundus* L.**P. formosana** Saw.*Ricinus communis* L.**P. infestans** (Mont.) de Bary*Lycopersicum esculentum* Mill.*Solanum melongena* L.*S. tuberosum* L.**P. lepironiae** Saw.*Lepironia mucronata* Rich.**P. lycopersici** Saw.*Lycopersicum esculentum* Mill.**P. melongenae** Saw.*Solanum melongena* L.**P. murrayae** Saw.*Murraya paniculata* (L.) Jack.**P. parasitica** Dastur.*Capsicum frutescens* L.*Citrus grandis* Osb.*C. nobilis* Lour.*C. sinensis* (L.) Osb.*C. sp.**Lycopersicum esculentum* Mill.*Malus pumila* Mill.*Ricinus communis* L.**P. parasitica** Dastur. var. **nico-****tianae** (Breda de Haan) Tucker*Nicotiana tabacum* L.**P. polygoni** Saw.*Polygonum japonicum* Meisn.**P. ricini** Saw.*Ricinus communis* L.**Pileolaria cotini-coggyriae** Tai et
Cheo*Cotinus coggygeria* Scop.**P. dietelliana** Syd.*Rhus hypoleuca***P. klugkistiana** (Diet.) Diet.*Rhus potanini* Max.*R. punjabensis* Steward var.*nucipersica* (L.) Schneid.*R. semilata* Murr.*R. sp.***P. pistaciae** Tai et Wei*Pistacia chinensis* Bge.

- Pileolaria shiraiana** (Diet. et Syd.) Ito
Rhus delavayi Franch. var. *quinquejuga* Rehd. et Wils.
R. succedanea L.
- P. shiraiana** (Diet. et Syd.) Ito
Rhus sylvestris Sieb. et Zucc.
R. verniciflua Stokes
R. sp.
- P. terebinthi** (DC.) Cast.
Pistacia chinensis Bge.
P. weinmannifolia J. Poiss.
- P. toxicodendri** (Berk. et Rav.) Arthur
Rhus intermedia Hay.
- Plicularia costii** (Saw.) Ito
Costus speciosus (Koen.) Smith
- P. grisea** (Cke.) Sacc.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
D. sanguinalis (L.) Scop. var. *commutatus* Hack.
D. sp.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Oryza sativa L.
Panicum sanguinale L.
Setaria italica Beauv.
S. viridis Beauv.
S. sp.
- P. leersiae** (Saw.) Ito
Leersia oryzoides Swartz. var. *japonica* Hack.
- P. oryzae** Cav.
Hordeum sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
Oryza sativa L.
Setaria italica Beauv.
Triticum vulgare Vill.
- P. panici-paludosi** (Saw.) Ito
Panicum repens L.
- P. setariae** Nisikado
Setaria italica Beauv.
S. viridis Beauv.
S. viridis Beauv. var. *purpurascens* Max.
- Pithya cupressi** (Batsch.) Rehm.
Juniperus chinensis L.
- Placosphaeria onobrychidis** Sacc.?
Astragalus frigidus (L.) A. Gr.
- P. viburni** P. Henn.
Viburnum sp.
- Placostroma ischaemi** Saw.
Andropogon micranthus Kunth.
- Plasmodiophora alni** (Woron.) Moll.
Alnus sp.
- P. brassicae** Woron.
Brassica cernua Thunb.
B. cernua Thunb. var.
B. chinensis L.
B. juncea L.
B. pekinensis Rupr.
B. sp.
- P. mori** Yendo
Morus alba L.
- Plasmopara halstedii** (Farlow) Bert. et de Toni
Siegesbeckia orientalis L.
- P. nivea** (Ung.) Schroet.
Angelica sp.
- P. obducens** Schroet.
Impatiens nolitangere L.
I. textori Miq.
- P. pygmaea** (Ung.) Schroet.
Aconitum yezoense Nakai
Adonis amurensis Regel. et Radd.
Anemone altaica Fisch.
A. dichotoma L.
A. raddeana Regel.
- P. skvortzivii** Miura
Abutilon avicennae Gaertn.
- P. viticola** (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni
Parthenocissus thunbergii Nakai
Vitis amurensis Rupr.
V. betulifolia Diels et Gilg.
V. flexuosa Thunb.
V. heterophylla Thunb.
V. labrusca L.
V. thunbergii Sieb. et Zucc.
V. thunbergii Sieb. et Zucc. var. *typica* Mak.
V. vinifera L.
V. sp.
- Plenophysa mirabilis** Syd.
Zea mays L.
- Plenotrichum peierae** Petr.
Symplocos decora Hance

- Pleomassaria agaves** Saw.
Agave rigida Mill. var. *sisalana* Pers.
- Pleosphaerulina abutilontis** Miura
Abutilon avicennae Gaertn.
- P. sojaecola** (Massal.) Miura
 (参看 *Phyllosticta sojaecola* Massal.)
- Pleospora calvescens** (Fr.) Tul.
 (参看 *Helminthosporium papaveris* Saw.)
- P. herbarum** (Pers.) Rabh.
 (参看 *Macrosporium commune* Rabh.)
- P. lespedezae** Miyake
Lespedeza bicolor Turcz.
- P. trichostoma** (Fr.) Ces. et de Not.
Avena sativa L.
- Podosphaera leucotricha** (Ell. et Ev.) Salm.
Malus asiatica Nakai
M. baccata Borkh. var. *mandshurica* Schneid.
M. pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
M. spectabilis Borkh.
- P. oxyacanthae** (DC.) de Bary
Crataegus cuneata Sieb. et Zucc.
C. pinnatifida Bge.
C. scabrifolius (Fr.) Rehd.
Malus pumila Mill.
M. sieboldii (Regel.) Rehd.
Pyrus sp.
Spiraea pubescens Turcz.
- P. tridactyla** (Wallr.) de Bary
Prunus communis Fritsch.
P. davidiana Franch.
P. persica Stokes
P. pseudocerasus Lindl.
P. salicina Lindl.
- Potielium hyalospora** (Saw.) Mains
Acacia richii A. Br.
- P. hispidus** (Bull.) Fr.
Morus alba L.
Sophora japonica L.
- P. robiniophilus** (Murr.) Lloyd
Robinia pseudo-acacia L.
- Polyporus schweinitzii** Fr.
Abies faberi Craib.
A. georgei Ou
A. sp.
Larix potaninii Batal.
L. sp.
Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast.
- P. squamosus** (Huds.) Fr.
Betula albo-sinensis Burk
B. japonica Sieb.
Juglans regia L.
Quercus sp.
Salix sp.
Ulmus sp.
- P. sulphureus** (Bull.) Fr.
Abies faberi Craib.
Juglans regia L.
Pinus yunnanensis Franch.
Quercus sp.
Tsuga yunnanensis (Franch.) Mast.
- Polystigma deformans** Syd.
Prunus armeniaca L.
- P. ochraceum** (Wahlenb.) Sacc.
Prunus sp.
- P. rubrum** (Pers.) DC.
Prunus salicina Lindl.
P. sp.
- Poria mucida** (Pers.) Fr.
Thuja sp.
Ulmus sp.
- Prosthemium bambusina** Syd.
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch.
- Protomyces lactucae** Saw.
Lactuca sp.
- P. macropus** Ung.
Angelica sp.
- Pseudoriospora castanopsidis** Keissler
Castanopsis tibetana Hance.
- Pseudocampthium fasciculatum** (Cke. et Mass.) Frag. et Cif.
Chamaerops humilis L.
- Pseudoperonospora cannabina** (Oth.) Curzi.
Cannabis sativa L.
- P. celtidis** (Waite) Wils.
Celtis sinensis Pers.

Pseudoperonospora cubensis (Berk.
et Curt.) Rostr.

Actinostemma lobatum Max.

var. *racemosum* Max.

Benincasa hispida Cogn.

Citrullus vulgaris Schrad.

Cucumis melo L.

C. melo L. var. *conomon* Mak.

C. melo L. var. *makuwa* Mak.

C. sativus L.

C. sp.

Cucurbita maxima Duch.

C. moschata Duch.

C. moschata Duch. var. *toonas*
Mak.

C. pepo L.

C. sp.

Lagenaria siceraria (Molina)
Stanley

L. siceraria (Molina) Stanley
var. *clavata* Ser.

Luffa acutangula Roxb.

L. cylindrica Roem.

Momordica charantia L.

M. charantia L. var. *senega-*
lensis Nakai

P. humuli (Miyabe et Takahashi)
Wils.

Humulus japonicus Sieb. et
Zucc.

H. lupulus L.

Pseudopeziza komarovi Gaez.

Rubia cordifolia L.

R. sp.

P. radians (Rob. et Desm.) Sacc.

Adenophora remotiflora Miq.

P. trifolii (Biv. et Bern.) Fuck.

Medicago edgeworthii

Pseudoplectania nigrella (Pers.)

Fuck.

Abies delavayi Franch. var.
forrestii Cheng

Puccinia absinthii (Hedw. f.) DC.

Artemisia annua L.

A. capillaris Thunb.

A. cina Berg.

A. desertorum Spreng.

A. dracunculus L.

A. dubia Wall.

A. eriopoda Bge

A. japonica Thunb.

A. mongolica Fisch.

A. sacrorum Ledeb.

A. sacrorum Ledeb. subsp.
manschurica Kitam.

A. sieversiana Ehrh.

A. vulgaris L.

A. sp.

P. abutili Berk. et Br.

Abutilon asiaticum G. Don.

A. gebauerianum H.-M.

P. acetosae Koern.

Rumex acetosa L.

R. dentata Capd.

R. sp.

P. achroa Syd.

Elaeagnus sp.

P. adenophorae Diet.

Adenophora jasionifolia
Franch.

A. remotiflora Miq.

P. adjuncta Mitter

Artemisia sp.

P. aequitatis Cummins

Benzoin sp.

P. aestivalis Diet.

Arthraxon lanceolatus (Roxb.)
Hochst.

P. agropyri-ciliaris Tai et Wei

Agropyron ciliare (Trin.)
Franch.

P. agrostico a Tai

Agrostis sp

P. agrostidis Plowr.

Agrostis flaccida Hack. var.
morrisonensis Honda

A. perennana Tuck.

P. allii (DC.) Rudolphi

Allium bakeri Regel.

A. fistulosum L.

A. longistylum Baker

A. nipponicum Fr. et Sav

A. sativum L.

A. scorodoprasum L.

A. scorodoprasum L. var.

viviparum Regel.

A. tuberosum Roxb

A. sp.

- Puccinia angelicae** Fuck.
Peucedanum terebinthaceum
 Fisch.
Seseli condensatum Reichb. f.
- P. angelicicola** P. Henn.
Angelica miqueliana Max.
A. polymorpha Max.
- P. anhweiensis** Cummins
Orchis sp.
- P. anomala** Rostr.
 (参看 **P. herdei** Otth.)
- P. anomoriensis** Syd.
Atractylis japonica Kitagawa
A. lyrata Sieb. et Zucc.
Atractylodes chinensis (Bge.)
 Koidz.
Carex lanceolata Boot.
- P. arachidis** Speg.
Arachis hypogaea L.
- P. argentata** (Schultz) Wint.
- P. aristolochiae** (DC.) Wint.
Aristolochia sp.
- P. artemisiae-keiskeanae** Miura
 (参看 **P. nolitangeris** Corda)
Artemisia frigida Willd.
A. keiskeana Miq.
A. vulgaris L.
- P. artemisiicola** Syd.
 (参看 **P. Millefolii** Fuck.)
- P. arthraxonis** (P. Henn.) Syd. et
 Butl.
Arthraxon hispidus (Thunb.)
 Mak.
A. sp.
- P. arthraxonis-ciliaris** Cummins
Arthraxon hispidus (Thunb.)
 Mak.
A. hispidus (Thunb.) Mak.
 var. *typicus* Honda
A. sp.
- P. arundinellae** Barcl.
Arundinella anomala Steud.
A. nepalensis Trin.
A. setosa Trin.
A. sp.
- P. arundinellae-anomala** Diet.
Arundinella anomala Steud.
A. sp.
- P. arundinellae-setosae** Tai
Arundinella setosa Trin.
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
- P. asaricola** Tai et Cheo
Asarum sp.
- P. asarina** Kuntze.
Asarum sp.
- P. asparagi** DC.
Asparagus officinalis L.
- P. asparagi-lucidi** Diet.
Asparagus cochinchinensis
 (Lour.) Merr.
A. officinalis L.
A. sp.
- P. asteris** Duby
Aster ageratoides Turcz.
Ligularia tussilaginea Mak.
- P. atrofusca** (Dudl. et Thomp.)
 Holw.
Artemisia lactiflora Wall.
A. vulgaris L.
Carex stenophylla Wahl.
- P. aucta** Berk. et Mull.
Lobelia sp.
- P. australis** Koern.
Cleistogenes serotina (L.) Keng
Sedum spinosum (L.) Willd.
S. sp.
- P. bardanae** (Wallr.) Corda
Arctium majus Bernh.
- P. baryi** (Berk. et Br.) Wint.
Brachypodium formosanum
 Hay.
B. sylvaticum (Huds.) Beauv.
- P. behenis** Otth.
Silene sp.
- P. belamcandae** (P. Henn.) Diet.
Belamcanda chinensis DC.
- P. benokiyamensis** Hirat. f.
Polygonum chinense L.
P. chinense L. var. *thunbergianum* Meisn.
P. nepalense Meisn.
P. sp.
- P. bistortae** DC.
Polygonum bistorta L.
P. viviparum L.
P. sp.
- P. bolleyana** Sacc.
Sambucus racemosa L.
S. sieboldiana Bl.
- P. brachybotrydis** Komarov.
Brachybotrys paridiformis
 Max.

- Puccinia bupleuri** Rud.
Bupleurum falcatum L.
B. falcatum L. var. *scorzonerifolium* (Willd.) Regel.
B. longeradiatum Turcz.
- P. cacao** McAlp.
H. sp.
Rottboellia japonica Honda
R. sp.
- P. calumnata** Syd.
Polygonum chinense L.
- P. campanumaeae** Pat.
Codonopsis pilosula Nannf.
- P. canaliculata** (Schw.) Lagerh.
Cyperus sp.
- P. cara** Cummins
Benzoin sp.
- P. carduorum** Jacky
Carduus acanthoides L.
- P. caricis** Relentisch
Carex cruciata Wahl.
C. filicina Nees.
C. lanceolata Boot.
Ribes fasciculatum Sieb. et Zucc.
Urtica angustifolia L. var. *abreviata* Wedd.
- P. caricis-filicinae** Barcl.
Carex filicina Nees
- P. carthami** (Hutz.) Corda
Carthamus tinctorius L.
- P. cesatii** Schroet.
Andropogon annulatus Forsk.
Bethriochloa ischaemum (L.) Keng
- P. chrysanthemi** Roze
Chrysanthemum indicum L.
C. lavandulifolium Mak.
C. sibiricum Fisch.
C. sinense Sab.
C. zawadzkii Herbach. var. *latilobum* Kitamura
C. sp.
- P. cicutae** Lasch.
Cicuta virosa L.
- P. cinnamomi** Tai
Cinnamomum sp.
- P. cinnamomicola** Cummins
Cinnamomum sp.
- P. cirsii** Lasch.
Cirsium arvensis Scop.
- C. japonicum* DC.
C. segetum Bge.
- P. cirsii-maritimi** Diet.
Cirsium chinense Champ.
- P. citrina** Syd.
Heterosmilax gaudichaudiana (Kunth.) Max.
Smilax gaudichaudiana Kunth.
S. glabra Roxb.
S. stenopetala Gray
S. sp.
- P. clematidicola** Tai
Clematis connata Fin. et Gagn.
C. sp.
- P. clematidis-hayatae** Saw.
Clematis henryi Oliv. var. *coptophylla* Hay.
- P. colletiana** Barcl.
Rubia cordifolia L.
- P. congesta** Berk. et Br.
Polygonum blumei Meisn.
P. chinense L.
P. chinense L. var. *thunbergianum* Meisn.
P. sp.
- P. constata** Syd.
Carex baccans Nees
- P. coronata** Corda
Agropyron chinense Ohwi
A. semicostatum Nees
Agrostis sp.
Arundinella arundinacea DC.
A. sp.
Avena fatua L.
A. sativa L.
A. sp.
Beckmannia syzigachne Fern.
Berchemia racemosa Sieb. et Zucc.
B. sp.
Brachypodium formosanum Hay.
B. sylvaticum (Huds.) Beauv.
B. sp.
Bromus aspera Thunb.
B. sp.
Calamagrostis arundinacea DC.
C. sp.
Glyceria sp.

- Puccinia coronata** Corda
Hiéochloa glabra Trin.
Lolium multiflorum L.
L. perenne L.
Paliurus sp.
Polypogon litoralis (With.)
 Smith
P. sp.
Rhamnella martini Levl.
R. obbovata Schneid.
R. sp.
Rhamnus crenatus Sieb. et
 Zucc.
R. globosus Bge.
R. japonicus Max.
R. kulingensis Schneid.
R. leptophylla Schneid.
R. parvifolia Bge.
R. utilis Decne.
R. sp.
- P. coronopsora** Cummins
Lindera sp.
- P. corylopsidis** Cummins
Corylopsis sp.
- P. cynodontis** Lacroix
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Plantago major L.
- P. cyperi** Arthur
Cyperus sp.
- P. dictipterae** Syd.
Dictiptera chinensis (L.) Nees
Strobilanthes flaccidifolius
 Nees
- P. dioscoreae** Koern.
Dioscorea quinqueloba Thunb.
- P. diplachnicola** Diet.
Cleistogenes serotina (L.) Keng
Sedum aizoon L.
S. selskianum Regel. et Maack.
- P. duthiae** Ell. et Tracy
Andropogon sp.
Bothriochloa pertusa (L.) A.
 Camus
- P. elaeagni** Yosh.
Elaeagnus lanceolata Warb
 subsp. *grandifolia* Serg.
- P. elymi** Westd.
Clinelymus sibiricus (L.)
 Nevski
Elymus sibiricus L.
- P. elymi-sibirici** Ito
Elymus sibiricus L.
- P. emaculata** Schw.
Eragrostis ferruginea (Thunb.)
 Beauv.
- P. epigejos** Ito
Calamagrostis epigejos (L.)
 Roth.
- P. epimedii** (P. Henn. et Shirai)
 Miyabe et Ito
Epimedium pubescens Max.
 E. sp.
- P. eragrostidis-ferrugineae** Tai
Eragrostis ferruginea (Thunb.)
 Beauv.
- P. erebia** Syd.
Clerodendron inermis Gaertn.
- P. erianthi** Padw. et Khan
Erianthus fastigiatus A. Henry
E. fulvus Nees
E. rufipilis (Steud.) Griseb.
- P. eriophori** Thuem.
Ligularia speciosa F. et M.
- P. erythropus** Diet.
Miscanthus japonicus (Thunb.)
 Anders.
M. sinensis Anders.
M. sp.
- P. exhausta** Diet.
Clematis grata Wall.
C. grata Wall. var. *grandidentata* Rehd. et Wils.
C. taiwaniana Hay.
- P. expansa** Link.
Ligularia sibirica Cass.
- P. extensicola** Plowr.
Aster harrowianus Diels
A. scaber Thunb.
A. sp.
- P. fagopyri** Barcl.
Fagopyrum vulgare Hill.
Polygonum capitatum Buch.-
 Ham.
- P. ferruginea** Lev.
Heterosmilax gaudichaudiana
 (Kunth.) Max.
Smilax china L.
S. davidiana DC.
S. glauca-china Warb.
S. longipes Warb.
S. sp.

Puccinia ferruginosa Syd.*Artemisia capillaris* Thunb.*A. japonica* Thumb.*A. vulgaris* L. var. *indica* Max.**P. festucae** (DC.) Plowr.*Festuca extremiorientalis*
Ohwi*Lonicera japonica* Thunb.*L. maackii* Max.**P. festucae-ovinae** Tai*Festuca ovina* L.**P. filipponia** Cummins(参看 *P. versicolor* Diet. et
Holw.)**P. funkiae** Diet.*Hosta coerulea* Tratt.**P. fushunensis** Hara*Leersia oryzoides* Swartz. var.
japonica Hack.**P. fusispora** Syd.*Boehmeria* sp.*Urtica angustifolia* L. var. *ab-*
breviata Wedd.**P. gentianae** Mart.*Gentiana macrophylla* Pall.*G. veitchiorum* Hemsl.*G. wutaiensis* Marquand*G.* sp.**P. glechomatis** DC.*Glechoma hederacea* L.*G. hederacea* L. var.*longituba* Nakai*G.* sp.**P. glumarum** (Schw.) Erikss. et
E. Henn.*Agropyron ciliare* (Trin.)
Franch.*A. semicostatum* Nees*Agrostis* sp.*Avena sativa* L.*Bromus inermis* Leyss.*B.* sp.*Calamagrostis* sp.*Dactylis glomerata* L.*D.* sp.*Elymus tianchanicus* Drobov*Festuca elatior* L.*F.* sp.*Hordeum bogdanii**H. murinum* L.*H. sativum* Jessen var. *vulgare*
Hack.*H. vulgare* L.*Poa* sp.*Secale cereale* L.*Triticum aestivum* L.*T. vulgare* Vill.**P. glycyrrhizae** Tai*Glycyrrhiza aspera***P. graminis** Pers.*Agropyron repens* P. Beauv.*Agrostis* sp.*Avena sativa* L. —*A.* sp.*Berberis acuminata* Fr.*B. amurensis* Rupr.*B. dielsiana* Fedde*B. gagnepainii* Schneid.*B. gilginana* Fedde*B. henryana* Schneid.*B. julianae* Schneid.*B. levis* Franch.*B. nepalensis* Spreng.*B. poiretii* Schneid.*B. pruinosa* Fr.*B. sargentiana* Schneid.*B. silva-taroucana* Schneid.*B. virgetorum* Schneid.*B. vulgaris* Linn.*B. wilsonae* Hemsl.*B.* sp.*Brachypodium formosanum*
Hay.*Bromus inermis* Leyss.*B.* sp.*Calamagrostis* sp.*Dactylis glomerata* L.*D.* sp.*Elymus dahuricus* Turcz.*E. sibiricus* L.*E. tianchanicus* Drobov*E.* sp.*Epimedium* sp.*Festuca elatior* L.*F.* sp.*Hordeum bogdanii**H. sativum* Jessen var. *vulgare*
Hack.*H. vulgare* L.*H.* sp.*Mahonia fortunei* Mouill*Poa* sp.

Puccinia graminis Pers.*Secale cereale* L.*Triticum aestivum* L.*T. sativum* L.*T. vulgare* Vill.**P. graminis tritici** Erikss. et E. Henn.*Epimedium* sp.*Mahonia fortunei* Mouill**P. gypsophilae** Liou et Wang*Gypsophila oldhamiana* Miq.**P. haleniae** Arthur et Holw.*Halenia sibirica* Borkh.**P. hashikoi** Hirat.*Epipremnum mirabile* Schott.**P. heitoensis** Ito et Muray.*Ipomoea* sp.**P. helianthi** Schw.*Helianthus annuus* L.*H. debilis* Nutt.*H. tuberosus* L.*H. sp.***P. hemerocallidis** Thuem.*Hemerocallis citrina* Baroni*H. disticha* Donn*H. disticha* Donn var. *kwanso* Nakai*H. dumortieri* Mors.*H. flava* L.*H. fulva* L.*H. minor* Mill.*H. sp.**Patrinia scabiosaeifolia* Link.**P. henryana** Syd.*Smilax menispermoides* A. DC.*S. sp.***P. heterophylla** Bge.*Patrinia scabra* Bge.*P. villosa* Juss.**P. heterospora** Berk. et Curt*Abutilon avicennae* Gaertn.*A. sp.**Sida humilis* Willd.*S. sp.***P. hieracii** (Schum.) Mart.(= *P. taraxaci* (Rebent.) Plowr.)*Atractylis ovata* Thunb.*Atractylodes chinensis* (Bge.) Koidz.*Taraxacum officinale* Web.*T. officinale* Web. var. *genuinum* Koch.*T. sinensis* H.-M.*T. sinicum* Kitagawa*T. sp.***P. hierochloae** Ito*Calamagrostis* sp.*Hierochloa odorata* Beauv.**P. hordei** Otth.(= *P. anomala* Rostr.)*Hordeum sativum* Jessen*H. sativum* Jessen var. *vulgare* Hack.*H. vulgare* L.*H. sp.***P. horiana** P. Henn.*Chrysanthemum indicum* L.*C. indicum* L. var. *acutum*

Uyeki

*C. sp.***P. hsinganensis** Miura*Fritillaria dagana* Turcz.**P. hypoestis** Saw.*Hypoestes cumingiana* Benth. et Hook f.**P. ignava** Arth.*Bambusa spinosa* Roxb.*Dendrocalamus* sp.**P. impatientis-uliginosae** Tai*Impatiens uliginosa* Franch.**P. invenusta** Syd.*Phragmitis karika* Trin.**P. iridis** (DC.) Wallr.*Iris dichotoma* Pall.*I. ensata* Thunb. var. *chinensis* Max.*I. japonicus* Thunb.*I. lactea* Pall. var. *chinensis* Koidz.*I. setosa* Pall.*I. sibiricus* L. vel. aff.*I. tectorum* Max.*I. tenuifolia* Fall. vel. aff.*I. sp.***P. kuehnii** (Krueger) Butl.*Saccharum arundinaceum* Retz.*S. officinarum* L.*S. spontaneum* L.*S. sp.***P. kusanoi** Diet.*Deutzia bartlettii* Yamam**P. kwangsiana** Cummins*Saussurea* sp.

- Puccinia kwangsiensis** Tai
Bambusa sp.
- P. kweichowana** Cummins
Polygonum campanulatum
Hook. f. var. *likiangensis*
(Smith) Steward
- P. kyllingiae-brevifoliae** Miura
Kyllingia brevifolia Rottb. var.
gracillima (Miq.) Kukenthal
- P. lactucae-repentis** Miyabe et
Miyake
Lactuca sp.
- P. lauricola** Cummins
Benzoin sp.
Lindera strychnifolia F. Vill.
- P. leucadis** Syd.
Leucas ciliata Benth.
- P. leucophaea** Syd. et Butl.
Colquhounia coccinea Wall.
- P. levigata** (Syd. et Butl.) Hirat.
f.
Oplismenus compositus (L.)
Beauv.
- P. levis** (Sacc. et Bizz.) Magn.
Digitaria henryi Rendle
D. sanguinalis (L.) Scop.
Syntherisma sanguinalis Dulac
var. *ciliaris* Honda.
- P. liberta** Kern.
Eleocharis dulcis (Burm. f.)
Trin. et Hensch.
- P. ligulariae** Thuem.
Ligularia sp.
- P. lomatogonii** Petr.
Lomatogonium bicoronatum
- P. longicornis** Pat. et Har.
Bambusa spinosa Roxb.
B. sp.
Phyllostachys sp.
- P. longinqua** Cummins
Phragmites sp.
- P. lophatheri** (Syd.) Hirat.
Lophatherum gracile Brongn.
var. *elatum* Hack.
L. gracile Brongn. var.
genuinum Hack.
- P. lycoctoni** Fuck.
Aconitum fischeri Reichb.
- P. machili** Cummins
Machilus sp.
- P. machilicola** Cummins
Machilus sp.
- P. magnusiana** Koern.
Anemone japonica S. et J.
A. vitifolia Buch.-Ham.
A. vitifolia Buch.-Ham. var.
elegans Ham.
A. sp.
Phragmites communis Trin.
P. longivalvis Steud.
P. sp.
Ranunculus arcuans Chien
R. cantoniensis DC.
R. japonicus Thunb.
- P. malvacearum** Mont.
Malva sylvestris L.
- P. mammillata** Schroet.
Polygonum viviparum L.
- P. melanocephala** Syd.
Phyllostachys makinoi Hay.
P. sp.
- P. melicae** (Erikss.) Syd.
Melica nutans L.
- P. menthae** Pers
Lycopus europaeus L.
Mentha arvensis L.
M. arvensis L. subsp.
haplocalyx Briq.
M. arvensis L. subsp. *haplo-*
calyx Briq. var. *sachalin-*
ensis Briq.
M. sachalinensis Kudo
M. sylvestris L.
M. sp.
Origanum vulgare L.
O. vulgare L. var. *formosanum*
Hay.
O. sp.
- P. microspora** Diet.
Imperata cylindrica (Linn.)
Beauv.
- P. millefolii** Fuck.
(= *P. artemisiicola* Syd.)
Artemisia eriopoda Bge.
A. japonica Thunb.
A. vulgaris L.
A. sp.
- P. minussensis** Thuem.
Lactuca brevirostris Champ.
L. sp.
- P. miscanthi** Miura
Miscanthus japonicus (Thunb.)
Anders

Puccinia miscanthi Miura*M. sinensis* Anders.*M. sp.**Plantago formosana* Tateishi
et Masamune*Saccharum narenga* (Nees)
Hack.*S. sp.**Sorghum vulgare* Pers.**P. miyoshiana** Diet.*Bupleurum falcatum* L.*Spodiopogon cotulifer* (Thunb.)
Hack.*S. sibiricus* Trin.**P. moliniae** Tul.*Cleistogenes serotina* (L.)
Keng**P. morata** Cummins*Litsea* sp.**P. morigera** Cummins*Eragrostis* sp.**P. moriokaensis** Ito*Phragmitis communis* Trin.*P. sp.***P. muehlenbeckiae** (Cke.) Syd.*Muehlenbeckia platyclada*
Meins.**P. mysorensis** Syd. et Butl.*Kyllingia monocephala* Rothb.**P. nakanishikii** Diet.*Andropogon intermedius* R.Br. var. *punctatus* Hack.*A. micranthus* Kunth.*Cymbidium* sp.*Cymbopogon tortilis* (Presl.) A.
Camus*Holcus fulvus* Br. var.
genuinus Honda**P. nanbuana** P. Henn.*Angelica dahurica* B. et H.*A. sinuata* Wolff.*A. tschiliensis* Wolff.*A. sp.**Peucedanum decursivum*
Max.*P. sp.***P. nokowensis** Saw.*Angelica morrisonicola* Hay.**P. nolitangeris** Corda(= *P. argentata* (Schultz.) Wint.)*Impatiens nolitangere* L.*I. sp.***P. oahuensis** Ell. et Ev.*Digitaria* sp.*Syntherisma formosana* Honda*S. ischaemum* Nash.*S. sanguinalis* Dulac.*S. sanguinalis* Dulac. var.
ciliaris Honda**P. oblecta** Peck*Scirpus lacustris* L.*S. triqueter* L.**P. obtegens** (Link.) Tül.*Cephalonoplos segetum*

Kitamura

C. setosum Kitamura*Cinnamomum* sp.*Cirsium arvensis* Scop.*C. arvensis* Scop. var. *setosum*
Ledeb.*C. segetum* Bge.**P. oenanthes-stoloniferae** Ito*Oenanthe javanica* (Bl.) DC.*O. sp.**Oenothera* sp.**P. okatamaensis** Ito*Phragmitis communis* Trin.**P. ophiopogonis** (Syd.) Cummins*Liriope minor* Mak.**P. pachycephala** Diet.*Veratrum nigrum* L.*V. sp.***P. pangasinensis** Syd.*Panicum* sp.**P. paspalina** Cummins*Paspalum formosanum* Honda*P. scrobiculatum* L.*P. scrobiculatum* L. var.
orbiculare (Forst.) Mak.*P. sp.***P. patriniae** P. Henn.*Patrinia heterophylla* Bge.*P. villosa* Juss.*P. sp.***P. phellopteri** Syd.*Glehnia littoralis* (Fr. Schm.)
Miq.*Phellopterus littoralis* Fr.

Schm.

P. phelloptericola Saw.*Phellopterus littoralis* Fr.

Schm.

Puccinia philippinensis Syd.*Cyperus rotundus* L.

C. sp.

P. phragmitis (Schum.) Koern.*Phragmitis communis* Trin.

P. sp.

P. phyllostachydis Kusano*Arundinaria* sp.*Phyllostachys* sp.**P. poae-pratensis** Miura*Poa pratensis* L.*Rhamnus davuricus* Pall.**P. poae-sudeticae** (West) Jorst.*Poa annua* L.*P. pratensis* L.

P. sp.

P. pogonatheri Petch*Pogonatherum crinitum*

(Thunb.) Kunth.

P. paniceum (Lam.) Hack.

P. sp.

P. pollinae Barcl.*Microstegium vimineum* A.

Camus

M. sp.

Strobilanthes dryadum

Benoist

P. pollinae-imberbis Hirat. f.*Microstegium ciliatum* var.*wallichiana* Hack.*M. vimineum* A. Camus*M. vimineum* A. Camus var.*imberbe* Honda*M. vimineum* A. Camus var.*typicum* Honda**P. pollinae-quadrinervis** Diet.*Eulalia quadrinervis* (Hack.)

Kuntze.

E. sp.

P. polliniicola Syd.*Microstegium vimineum* A.

Camus

P. polygoni-amphibii Pers.*Persicaria lapathifolia* Gray*Polygonum blumei* Meisn.*P. chinense* L.*P. convolvulus* L.*P. cuspidatum* Sieb. et

Zucc.

P. multiflorum Thunb.*P. perfoliatum* L.*P. sagittatum* L. var. *ameri-**canum* f. *sieboldi* Mak.*P. thunbergii* Sieb. et Zucc.

P. sp.

P. polygoni-wojrichii Miyake*Polygonum* sp.**P. polygonicola** Tai*Polygonum chinense* L.*P. nepalense* Meisn.**P. polystegia** Syd.*Eranthemum nervosum* (Vahl.)

R. Br.

P. porri (Sow.) Wint.*Allium fistulosum* L.*A. sativum* L.

A. sp.

P. primulae Grev.*Primula forbesii* Fr.**P. pringsheimiana** Kleb.*Ribes grossularioides* Max.**P. punctata** Link.*Galium aparine* L.*G. verum* L.

G. sp.

P. punctiformis Diet. et Holw.*Galium aparine* L.*G. asperifolium* Wall.*Rumex crispus* L.*R. nepalensis* Spreng.

R. sp.

P. purpurea Cke.*Andropogon citratus* DC.*A. sorghum* Brot. var. *vulgaris*

Hack.

Holcus halepensis L.*Sorghum halepense* Pers.var. *muticum* Honda*S. vulgare* Pers.**P. pusilla** Syd.*Andropogon micranthus*

Kunth.

Capillepedium glaucopsis

(Steud.) Stapf.

C. parviflorum Stapf.**P. pygmaea** Erikss.*Berberis amurensis* Rupr.*Calamagrostis arundinacea* DC.*C. epigejos* (L.) Roth.**P. rangiferina** Ito*Agropyron repens* P. Beauv.*A. semicostatum* Nees*Calamagrostis arundinacea* DC.

Puccinia rangiferina Ito*C. langsdorffii* Trin.*C. sp.**Melica sp.***P. romagnoliana** Maire et Sacc.*Cyperus rotundus* L.*C. sp.***P. roscoeae** Barcl.*Camptandra yunnanensis*

Gagn.

Roscoeia intermedia Gagn.**P. rubigo-vera** (DC.) Wint.*Aconitum volubile* Pall.*Agropyron semicostatum* Nees*Anemone sp.**Brachypodium sp.**Bromus sp.**Cimicifuga sp.**Clematis chinensis* Osb. f.*vestita* Rehd. et Wils.*C. heracleaefolia* DC.*C. montana* (Buch.-Ham.) DC.*C. paniculata* Thunb.*C. uncinata* Champ.*C. sp.**Dactylis glomerata* L.*Delphinium sp.**Elymus sibiricus* L.*Secale cereale* L.*Thalictrum aquilegifolium* L.*T. minus* L.*T. minus* L. var. *elatum*

Lecoyer

T. thunbergii A. DC.*Triticum aestivum* L.*T. sativum* L.*T. turgidum**T. vulgare* Vill.**P. ruelliae** (Berk. et Br.) Lagerh.*Ruellia repens* L.**P. rufipes** Diet.*Imperata cylindrica* (Linn.)

Beauv.

I. cylindrica (Linn.) Beauv.var. *koenigii* Dur. et Schinz.**P. salvia** Ung.*Salvia sp.***P. saniculae** Grev.*Sanicula europaea* L.**P. saussureae-ussuriensis** Liou et Wang*Saussurea sp.***P. schizonepetae** Tranzsch.*Schizonepeta lavendulacea* (L.) Brip.**P. scimitriformis** Cummins*Persea sp.***P. scirpi** DC.*Scirpus lacustris* L.**P. scirpi-terssatani** Hirat. f.*Scirpus sp.***P. scirpi-triqueteris** Saw.*Scirpus triqueter* L.**P. scorzonerae** (Schum.) Jocky*Scorzonera austriaca* L.*S. sp.***P. sessilis** Schneid.*Phalaris arundinacea* L.*P. arundinacea* L. var. *genuina* Hack.**P. setariae-forbesianae** Tai*Setaria forbesiana***P. sileris** Voss.*Siler divaricatum* Benth. et Hook f.**P. sinica** Syd.*Muhlenbergia hugelii* Trin.**P. smilacinae** Syd.*Polygonatum sp.**Smilacina formosana* Hay.*Smilax japonica* A. Gray**P. smilacis-sempervirentis** Wang*Smilax sempervirens* Wang**P. smilacis-sieboldii** Hirat*Smilax china* L.*S. sp.***P. sonchi** Rob.*Sonchus arvensis* L.*S. arvensis* L. var. *uliginosus* Trautv.*S. brachyotus* DC.**P. sorghi** Schw.*Oxalis corniculata* L.*Zea mays* L.**P. stauntoniae** Tranzsch. et Diet.*Stauntonia hexaphylla* Decne**P. stipae-sibiricae** Ito*Sedum kamtschaticum* Fisch et Mey.*Stipa effusa* Nakai*S. extremiorientalis* Hara

- Puccinia stipina** Tranzsch.
Stipa splendens Trin.
- P. strobilanthis-flexicaulis** Hirat.
et Muray
Strobilanthes flexicaulis Hay.
- P. swertiae** Wint.
Swertia sp.
- P. taihokuensis** Saw.
Kylingia monocephala Roth.
- P. taliensis** Tai
Polygonum paleaceum Will.
var. *pubifolium* Samuels
P. viviparum L.
- P. tangkuensis** Liou et Wang
Aeluropus littoralis Parl. var.
sinensis Debeaux
- P. taraxaci** (Rebent.) Plowr.
(参看 **P. hieracii** (Schum.)
Mart.)
- P. tenuis** (Schw.) Burr.
Eupatorium sp.
- P. thwaitesii** Berk.
Justicia gendarussa L.
- P. tokyensis** Syd.
Cryptotaenia japonica Hassk.
C. sp.
- P. tosoensis** Tokunaga et Kawai
Synurus deltoides (Ait.) Nakai
S. hondae Kitagawa
- P. triseti** Erikss
Cimicifuga simplex Wormesk.
C. *simplex* Wormesk. var.
ramosa Max.
Trisetum bifidum Ohwi
T. flavescens (L.) Beauv.
T. macranthum (Hack.) Keng
- P. variiformis** Pat.
Hoya carnosae R. Br.
- P. veratri** Duby
Veratrum dolichopetalum
Loesn. f.
- P. veratricola** Tai
Veratrum taliense Loesn. f.
- P. versicolor** Diet. et Holw.
(= **P. filipodia** Cummins)
Heteropogon contortus (L.)
Beauv.
Themeda triandra Forsk.
- P. violae** (Schum.) DC.
Viola patrinii DC.
- V. patrinii** DC. var. *chinensis*
Ging.
- V. sp.**
- P. wattiana** Barcl.
Clematis meyeniana Walp.
C. peterae H.-M.
C. sp.
- P. zoysiae** Diet.
Aeluropus littoralis Parl. var.
sinensis DeBeaux
Paederia chinensis Hance
P. sp.
Zoysia matrella (L.) Merr.
- Pucciniastrum actinidiae** Hirat. f.
Actinidia formosana Hay.
- P. agrimoniae** (Schw.) Tranzsch.
Agrimonia eupatoria L.
A. pilosa Ledeb. var. *japonica*
Nakai
A. zeylanica Moon
A. sp.
- P. boehmeriae** Syd.
Boehmeria zollingeriana
Wedd.
- P. castaneae** Diet.
Castanea cruenta Sieb. et
Zucc.
C. *mollissima* Bl.
C. sp.
- P. clemensiae** Arthur et
Cummins
Vitex negundo L.
- P. coriariae** Diet.
Coriaria intermedia Matsum.
C. *sinica* Max.
C. sp.
- P. coryli** Kom.
Corylus heterophylla Fisch.
- P. epilobii** Otth.
Chamaenerion angustifolium
Scop.
- P. formosana** a Saw.
Boehmeria formosana Hay.
- P. hikosanense** Hirat. f.
Acer rubescens Hay.
- P. hydrangeae-petiolaridis**
Hirat.
Hydrangea anomala Don.
H. kawakamii Hay.
H. sp.

Pucciniastrum malloti Hirat.

Mallotus japonicus Muell.-
Arg.

P. potentillae Kom.

Fragaria sp.
Potentilla fragurioides L. var.
sprengeliana Max.

P. styracinum Hirat.

Styrax formosanum Matsum.

P. tiliæ (Miyabe) Hirat.

Tilia amurensis Rupr.
T. mandshurica Rupr. et Max.
T. tuan Szysz.

Pucciniosira clemensiae Arthur et Cummins

Berberis kawakamii Hay.

Pucciniospora tremæ Saw.

Trema orientalis Bl.

Pucciniostele clarkiana (Barcl.)

Diet.

Astilbe longicarpa Hay

Pyrenochaeta oryzae Shirai

Oryza sativa L.

Pyrenopeziza medicaginis (Lib.)

Fuck.

Medicago sativa L.

Pyrenophora avenae (Eidam.) Ito et Kurib.

(*Helminthosporium avenae*
Eidam.)

P. graminea (Rabh.) Ito et Kurib.

(参看 *Helminthosporium*
gramineum (Rabh.) Erikass.)

P. teres (Sacc.) Drechsler

(参看 *Helminthosporium*
teres Sacc.)

Pythium aphanidermatum (Eds.)

Fitz.

Benincasa hispida Cogn.
Beta vulgaris L.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duch.
C. moschata Duch.
C. pepo L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Gossypium sp.
Luffa cylindrica Roem.

Lycopersicum esculentum
Mill.

Malva sylvestris L.

Nicotiana tabacum L.

Phaseolus vulgaris L.

Solanum melongena L.

P. artotrogus (Mont.) de Bary

Boehmeria nivea Gaud.

P. deBaryanum Hesse

Brassica oleracea L.

Cucumis melo L.

C. sativus L.

Gossypium hirsutum L.

Lycopersicum esculentum
Mill.

Nicotiana tabacum L.

Solanum melongena L.

Sorghum vulgare Pers.

Zea mays L.

P. irregulare Buisman

Pachyrhizus tuberosus
Spreng.

P. spinosum Saw.

Pachyrhizus tuberosus Spreng.

Vicia faba L.

P. ultimum Trow.

Pachyrhizus tuberosus
Spreng.

Vicia faba L.

Ramularia aequivoca (Ces.) Sacc.

Ranunculus japonicus Thunb.

R. angustissima Sacc.

Cornus sp.

R. areola Atk. (*Mycosphaerella*

areola (Atk.) Ehrlich et Wolf)

Gossypium arboreum L.

G. herbaceum L.

G. hirsutum L.

G. sp.

R. armoraciae Fuck.

Raphanus sativus L.

R. citrifolia Saw.

Citrus tankan Hay.

R. clerodendri Saw.

Clerodendron fragrans Vent.

R. decipiens Ell. et Ey.

Rumex acetosa L.

R. dentata Capd.

R. enecans Magn.

Epilobium angustifolium L.

- Ramularia harai** P. Henn.
Phytolacca sp.
- R. leonuri** Sacc. et Penz.
Leonurus sibiricus L.
- R. lobellae** Saw.
Lobelia pyramidalis Wall.
- R. puerariae** Saw.
Pueraria thunbergiana Benth.
- R. punctiformis** (Schlecht.)
Hoehn.
Epilobium angustifolium L.
- R. ranunculi** (Schroet.) Peck
Ranunculus japonicus Thunb.
- R. rufomaculans** Peck
Fagopyrum vulgare Hill.
- R. rumicis-crispi** Saw.
Rumex crispus L.
R. sp.
- R. sagittariae** Bres.
Sagittaria sagittifolia L.
- R. viticis** Syd.
Vitex negundo L.
- Ramulispora sorghi** (Ell. et Ev.)
Olive et le Febure
(= *Titaospora andropogonis*
(Miura) Tai)
Andropogon sorghum Brot.
var. *sudanensis* Piper
Sorghum vulgare Pers.
- Ravenella brevispora** Hirat. f. et
Hash.
Phyllanthus reticulatus Poir.
- R. formosana** Syd.
Acacia farnesiana Willd.
- R. hobsoni** Cke.
Pongamia pinnata (L.) Merr.
- R. indigoferae** Tranzsch.
Indigofera sp.
- R. indigoferae-scabridae** Tai
Indigofera scabrida Dunn.
- R. japonica** Diet. et Syd.
Albizzia julibrissin Dur.
A. kalkora Prain.
A. sp.
- R. laevis** Diet. et Holw.
Indigofera cinerascens Fr.
I. sp.
- R. macrocapitula** Tai
Indigofera hancockii Craib.
I. dielsiana Craib.

- R. millettiae** Hirat. et Hash.
Millettia reticulata Benth.
- R. minima** Cke.
Albizzia fastigiata
- R. ornata** Syd.
Abrus mollis Hance
A. precatorius L.
- R. tephrosiicola** Hirat. f.
Tephrosia candida DC.
- Rehmiella ulmicola** Miyake
Ulmus sp.
- Rhabdospora decipiens** (B. et C.)
Sacc.
Lonicera cyanocarpa Franch.
- R. longispora** Ferr.
Populus nigra L.
- R. melongenae** Hanzawa
Solanum melongena L.
- R. smilacinicola** Keissler
Smilacina oleracea Hook f. et
Thoms.
- R. umbrosa** Boum.
Polygonatum sibiricum Red.
P. sp.
- Rhizoctonia crocorum** DC.
Asparagus officinalis L.
- Rhizopus delemar** (Boidin)
Wehmer et Hanzawa
Ipomoea batatas (L.) Poir.
- R. necans** Mass.
Lilium sp.
- R. nigricans** Ehrb.
Artocarpus integra Merr.
Carica papaya Linn.
Eragaria chiloensis Duch. var.
ananassa Bail.
Gossypium sp.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
Lycopersicum esculentum
Mill.
Malus pumila Mill.
Musa sp.
Prunus persica Stokes
P. persica Stokes var. *vulgaris*
Max.
Pyrus serotina Rehd.
P. sp.
Solanum tuberosum L.

- Rhizopus nigricans** Ehrb.
Stephania cepharantha Hay.
S. sphaerantha Hay.
Vitis vinifera L.
Zizyphus sativa Gaertn.
- Rhopoglyphus formosanus** Saw.
Erianthus pollinoides Rendle
- Rhynchostoma lageniforme** Teng
Cocos nucifera L.
- Rhyncosporium scealis** (Oud.)
 Davis
Hordeum vulgare L.
- Rhytidhysterium prosopidis** Peck
Rubus sp.
- R. scortechinii** Sacc. et Berl.
Zanthoxylum sp.
- Rhytisma acerinum** (Pers.) Fr.
 (参看 *Melasmia acerina* Lev.)
- R. lonicericola** P. Henn.
Lonicera maackii Max.
L. trichosantha Bur. et
 Franch.
L. sp.
- R. punctatum** (Pers.) Fr.
 (参看 *Melasmia punctata* Sacc.
 et Roun.)
- R. rhododendri** Fr.
Rhododendron simsii Planch.
- R. salicinum** Fr.
Salix babylonica L.
S. sp.
- R. shiraiana** Hemmi et Kurata
 (参看 *Melasmia rhododendri*
 P. Henn. et Shirai)
- R. necatrix** (Hart.) Berl.
Malus pumila Mill.
Morus alba L.
M. latifolia Bur.
Pyrus sp.
Thea sinensis L.
- Scaphidium ischurochloae** Saw.
Ischurochloa stenostachya
 Nakai
- Schizothyrium annuliforme** Syd.
 et Butl.
Acer buergerianum Miq.
- S. rhododendri** Pat.
Rhododendron sp.
- Sclerophthora macrospora** (Sacc.)
 Thirum., Shaw et Narss.
Agropyron semicoctatum Nees
Agrostis palustris Huds.

- Alopecurus agrestis* L.
Arundinella hirta Koidz. var.
ciliata Koidz.
Calamagrostis arundinacea
 DC. var. *sciuroides* Hack.
Echinochloa crus-galli (L.)
 Beauv. subsp. *submutica*
 Honda var. *typica* Honda
Eragrostis ferruginea (Thunb.)
 Beauv.
- S. macrospora** (Sacc.) Thirum.,
 Shaw et Narss.
Eragrostis ferruginea (Thunb.)
 Beauv.
E. niwahokeri Honda
Glyceria acutiflora Tpr.
Hordeum vulgare L.
Imperata cylindrica (Linn.)
 Beauv. var. *koenigii* Dür. et
 Schinz.
Leersia oryzoides Swartz. var.
japonica Hack.
Miscanthus sinensis Anders.
Oryza sativa L.
Pennisetum purpurascens
 Mak.
Phalaris arundinacea L.
Phragmites longivalvis Steud.
Poa nipponica Koidz.
Rottboellia japonica Honda
Syntherisma sanguinalis
 Dulac. var. *ciliaris* Honda
Triticum aestivum L.
T. vulgare Vill.
Zea mays L.
- Sclerospora graminicola** (Sacc.)
 Schroet.
Phleum pratense L.
Setaria glauca Beauv.
S. italica Beauv.
S. italica Beauv. var. *germ-*
anica Trin.
S. lutescens (Wiegel) F. E.
 Hubb. var. *genuina* Honda
S. viridis Beauv.
S. sp.
- S. miscanthi** Miyake
Miscanthus japonicus (Thunb.)
 Anders.
- S. sacchari** Miyake
Zea mays L.

Sclerospora sorghi (Kulk.) West.
et Upp.

Sorghum vulgare Pers.

Sclerotinia allii Saw.

Allium cepa L.

A. fistulosum L.

S. arachidis Hanzawa

Arachis hypogaea L.

S. ariae Schell.

Sorbus sp.

S. carunculoides Siegl. et Jenk.

Morus alba L.

S. ciborioides (Hoffm.) Noack.

(= *S. trifoliorum* Erikss.)

Astragalus sinicus L.

Medicago sativa L.

Trifolium hybridum L.

T. incarnatum L.

T. pratense L.

T. repens L.

Trigonella sp.

Vicia sativa L.

S. fructigena Aderh. et Ruhl.

Chaenomeles lagenaria (Lois.)

Koidz.

Malus pumila Mill.

Pyrus betulifolia Bge.

P. communis L.

P. serotina Rehd.

P. sinensis Lindl. var. *culta*
Mak.

P. ussuriensis Max. var.

P. sp.

S. kenjiana Miura

Malus pumila Mill. var. *domestica*
Schneid.

S. kusanoi P. Henn.

Prunus pseudocerasus Lindl.

S. laxa Aderh. et Ruhl.

Eriobotrya japonica Lindl.

Prunus ansu Kom.

P. armeniaca L.

P. armeniaca L. var. *ansu*
Max.

P. cerasus L.

P. communis Fritsch.

P. domestica Linn.

P. manshurica Koehne.

P. persica Stokes

P. salicina Lindl.

P. sp.

Pyrus sp.

S. laxa Aderh. et Ruhl. f. *malii*
(Worm.) Harr.

Malus pumila Mill.

S. mall Takahashi

Malus pumila Mill.

S. minor Jagger

Vicia faba L.

S. miyabeana Hanzawa

Arachis hypogaea L.

S. nicotianae Oud. et Kon.

Nicotiana tabacum L.

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary

Acalypha australis L.

Allium cepa L.

A. fistulosum L.

Alternanthera sessilis R. Br.

Amaranthus viridis L.

A. sp.

Apium graveolens L.

Arctium lappa L.

Aster indicus L.

Astragalus sinicus L.

Beta vulgaris L.

Boehmeria nivea Gaud.

Brassica campestris L.

B. campestris L. var. *purpuraria*
Bail.

B. cernua Thunb.

B. chinensis L.

B. juncea L.

B. juncea L. var. *thumida*

Tsen et Lee

B. oleracea L.

B. oleracea L. var. *capitata* L.

B. oleracea L. var. *cauliflora*

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

Calendula arvensis L.

Campanula medium L.

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.

Capsicum annuum L.

C. annuum L. var.

longum Sendt.

C. frutescens L.

Cardamine flexuosa With.

subsp. *debilis* (Don.) Schulz.

C. hirsuta L.

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Carum petroselinum Benth.
Centaurea cyanus L.
Centella asiatica (L.) Urb.
Chenopodium album L.
C. ficifolium Sm.
Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
C. coronarium L.
C. indicum L.
Cirsium japonicum DC.
Citrus sinensis (L.) Osb.
C. sp.
Commelina nudiflora L.
Coriandrum sativum L.
Crotalaria juncea L.
C. lonchophylla H.-M.
Cryptotaenia japonica Hassk.
Cucurbita moschata Duch.
Dahlia variabilis Desf.
Datura alba Nees
Daucus carota L.
Dianthus chinensis L.
Dolichos sp.
Eclipta alba (L.) Hassk.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Eupatorium formosanum Hay.
Foeniculum officinale Allesch.
Gaillardia pulchella Foug.
Galium aparine L.
Glycine max (L.) Merr.
Gnaphalium indicum L.
G. luteo-album L.
G. multiceps Wall.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
Hibiscus esculentus L.
H. rosa-sinensis L.
H. sabdariffa L.
H. schizopetalus Hook f.
Hydrocotyle rotundifolia Roxb.
Indigofera arrecta Hochst.
Ipomoea aquatica Forsk.
I. batatas (L.) Poir.
Lactuca brevirostris Champ.
L. sativa L.
L. sativa L. var. *angustana* Hort.

L. sativa L. var. *crispa* L.
L. scariola L. var. *sativa* Bisch.
L. sp.
Lathyrus odoratus L.
Leonurus macranthus Max.
Lobelia radicans Thunb.
Lycopersicum esculentum Mill.
Malva sylvestris L.
M. verticillata L.
Manihot utilisima Pohl.
Medicago sativa L.
Mentha arvensis L. var. *piperrascens* Malinv.
Morus alba L.
Nasturtium montanum Wall.
Nicotiana tabacum L.
Oenanthe javanica (Bl.) DC.
Oxalis corniculata L.
Panicum repens L.
Passiflora ceorulea L.
Petunia violacea Lindl.
Phaseolus trinervius Heyne.
P. vulgaris L.
Phyllanthus niruri L.
Pisum sativum L.
Plantago major L. var. *asiatica* Decne.
Polygonum aviculare L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus cantoniensis DC.
Raphanus sativus L.
Ricinus communis L.
Rorippa montana (Wall.) Small.
Saussurea affinis Spreng.
Siegesbeckia orientalis L.
Solanum melongena L.
S. tuberosum L.
Sonchus arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Stellaria media (L.) Cyrill.
Stephania hernandifolia Walp.
Tagetes patula L.
Tetragonia expansa Myrr.
Vicia cracca L.
V. faba L.
V. faba L. var. *equina* Pers.
Vinca rosea L.
Xanthium strumarium L.

Sclerotinia shiraiana P. Henn.*Morus acidosa* Griff.*M. alba* L.**Sclerotium ambiguum** Duby*Narcissus tazetta* L. var. *chinensis* Roem.**S. cepivorum** Bark.*Allium fistulosum* L.*A. odorum* L.**S. cinnamomi** Saw.*Cinnamomum camphora* Nees et Ebern.**S. fumigatum** Nakata*Oryza sativa* L.**S. hydrophilum** Sacc.*Oryza sativa* L.**S. oryzae-sativae** Saw.*Oryza sativa* L.**S. paspali** Schw.*Paspalum thunbergii* Kunth**Scolecotrichum graminis** Fuck.*Miscanthus sinensis* Anders.**S. iridicola** Miura*Iris dichotoma* Pall.**S. musae** Saw.*Musa cavendishii* L.**S. phyllostachydis** Teng*Phyllostachys* sp.**Scorias capitata** Saw.*Thea sinensis* L.**S. communis** Yamam.*Coffea liberica* Bull.**S. cylindrica** Yamam.*Gardenia jasminoides* Ell. var. *ovalifolia* (Curt.) Hort.**Septobasidium acaciae** Saw.*Acacia richii* A. Br.*Citrus sabon* Sieb.*C. sp.**Thea sinensis* L.**S. albidum** Pat.*Cinnamomum camphora* Nees et Ebern.*Citrus limonia* Osb.*C. sinensis* (L.) Osb.*C. sp.***S. bogoriense** Pat.*Ardisia sieboldi* Miq.*Broussonetia papyrifera* L.-Herit.*Citrus sabon* Sieb.*Hovenia culcis* Thunb.*Juglans regia* L.*Ligustrum ibota* Sieb.*L. lucidum* Ait.*Lithocarpus uraiianus* Hay.*Morus alba* L.*Prunus armeniaca* L.*P. cerasus* L.*P. communis* Fritsch.*P. mume* Sieb. et Zucc.*P. persica* Stokes*P. salicina* Lindl.*Pyrus* sp.*Quercus serrata* Thunb.*Thea sinensis* L.*Zanthoxylum simulans* Hance**S. carbonaceum** Pat.*Citrus grandis* Osb.**S. citricolum** Saw.*Citrus grandis* Osb.*C. poonensis* Tanaka*C. tankan* Hay.**S. leucostemum** Pat.*Citrus* sp.**S. sinense** Couch*Citrus limonia* Osb.*C. sinensis* (L.) Osb.**S. tanakae** (Miyabe) Boed. et Steinm.*Morus alba* L.*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Schneid.*Prunus armeniaca* L.*P. armeniaca* L. var. *ansu* Max.*P. cerasus* L.*P. communis* Fritsch.*P. domestica* Linn.*P. donarum* Sieb.*P. mume* Sieb. et Zucc.*P. persica* Stokes*P. salicina* Lindl.*Pyrus* sp.**Septocylindrosporium areola**

(Atk.) P. et C.

Gossypium sp.**Septocytella bambusina** Syd.*Bambusa* sp.**Septogloeum anemones** Miyake*Anemone* sp.

- Septogloeum mori** Bri. et Cav.
(= *Cylindrosporium mori* (Lev.) Berl.)
Broussonetia papyrifera L.-Herit.
Morus alba L.
M. sp.
- Septoria abortiva** (Ell. et Kell.)
Tehon et Daniels
Stephania sp.
- S. acerina** Speg.
Alangium platanifolium Harms
- S. aconiti** Bacc.
Aconitum sp.
- S. adenophorae** Thuem.
Adenophora verticillata Fisch.
- S. allii** Möesz.
Allium odorum L.
- S. alnifolia** Ell. et Ev.
Alnus japonica Sieb. et Zucc.
- S. ampelina** Berk. et Curt.
Vitis sp.
- S. ampelopsidis-heterophyllae**
Miura
Ampelopsis humulifolia Bge.
- S. amphigena** Miyake
Bupleurum falcatum L.
- S. antirrhini** Rob. et Desm.
Antirrhinum majus L.
- S. api** (Bnosì et Cav.) Chester
Apium graveolens L.
- S. argyreae** Sacc.
Elaeagnus pungens Thunb.
- S. artemisiae** Pass.
Artemisia vulagris L.
- S. astericola** Ell. et Ev.
Aster indicus L.
- S. astragali** Desm.
Astragalus nokoensis Sasaki
- S. bataticola** Taub.
Ipomoea batatas (L.) Poir.
- S. buchtormensis** Peter.
Seseli buchtormense Koch.
- S. callistephi** Gloyer
Callistephus chinensis Nees
- S. cannabìs** (Lasch.) Sacc.
Cannabis sativa L.
- S. centellae** Wint.
Centella asiatica (L.) Urb.
- S. chelidonii** Mesm.
Chelidonium majus L.
- S. chinensis** Miura
Betula chinensis Max.
- S. chrysanthemella** Sacc.
Chrysanthemum cinerariaefolium Bocc.
C. indicum L.
C. sinense Sab. var. *hortensis* Mak.
C. sp.
- S. chrysanthemi-indici** Bubak et Kabat.
Chrysanthemum sinense Sab. var. *hortensis* Mak.
- S. cirsii** Niessl.
Cirsium arvensis Scop.
C. segetum Bge.
- S. coricola** Desm.
Cornus sp.
- S. cucurbitacearum** Sacc.
Cucumis sativus L.
Cucurbita moschata Duch.
C. moschata Duch. var. *toonae* Mak.
- S. dianthi** Desm.
Dianthus chinensis L.
- S. dianthicola** Sacc.
Dianthus superbus L.
- S. divaricata** Ell. et Ev.
Phlox drummondii Hook
- S. dolichi** B. et C.
Vigna sinensis Endl.
- S. dulcamarae** Desm.
Solanum dulcamara L.
- S. elymicola** Died.
Elymus dasystachys Trin.
- S. expansa** Niessl.
Geranium nepalense Sweet
- S. ficariae** Desm.
Ranunculus japonicus Thunb.
- S. frangulae** Guép.
Rhamnus sp.
- S. gentianae** Thuem.
Gentiana macrophylla Pall.
G. scabra Bge.
- S. glycines** Hemmi.
Glycine max (L.) Merr.
- S. gnaphalii-indici** Saw.
Gnaphalium indicum L.
- S. helianthi** Ell. et Kell.
Helianthus annuus L.

Septoria hemerocallidis Teng*Hemerocallis* sp.**S. hydrangeae** Brigg.*Hydrangea opuloides* K. Koch.*H.* sp.**S. inulae** Sacc. et Speg.*Inula* sp.**S. jenissensis** Sacc.*Clematis* sp.**S. kishitai** Fukui*Perilla ocimoides* L.**S. kuwaeicola** Yendo*Morus alba* L.**S. lablabina** Sacc.*Dolichos lablab* L.**S. lactucae** Pass.*Lactuca sativa* L.*L. scariola* L.*L. scariola* L. var. *sativa* Bisch.*L.* sp.**S. leguminum** Desm.*Phaseolus radiatus* L.**S. lonicerae-maackii** Miura*Lenicera maackii* Max.**S. lychnidis** Desm.*Lychnis cognata* Max.*L. senno* Sieb. et Zucc.*Melandryum apricum* Rohrb.*Silene aprica* Turcz. var.*firma* Wills.**S. lycoctoni** Speg.*Aconitum bulbilliferum* H. -M.*A. forrestii* Stapf.**S. lycopersici** Sepeg.*Capsicum anuum* L.*Lycopersicum esculentum* Mill.*Solanum melongena* L.**S. manshurica** Miura*Chrysanthemum boreale* Mak.*C. sinense* Sab.**S. melampyri** Straas.*Melampyrum roseum* Max.**S. melastomatis** Pat.*Osbeckia crinita* Benth.**S. melongenae** Saw.*Solanum melongena* L.**S. menispermi** Thuem.*Menispermum dahuricum* DC.*M. diversifolium* (Miq.) Gagn.**S. menthae** (Thuem.) Oud.*Mentha arvensis* L. var. *vul-**garis* Benth.**S. merrillii** Syd.*Buddleia asiatica* Lour.**S. microspora** Speg.*Gentiana scabra* Bge.**S. miscanthi** Petr.*Miscanthus sinensis* Anders.**S. modonia** Sacc. var. **Brevispora**

Saw.

Sonchus arvensis L.**S. mougeotii** Sacc. et Roum.*Picris hieracioides* L.**S. nodorum** Berk.*Triticum aestivum* L.*T. vulgare* Vill.**S. noli-tangeris** Gerard*Impatiens nolitangere* L.**S. obtusa** Heald et Wolf*Sorghum vulgare* Pers.**S. oenanthis-stoloniferae** Saw.*Oenanthe javanica* (Bl.) DC.**S. oxalidis-japonicae** Pat.*Oxalis japonica* Fr. et Sav.**S. paraphysoidis** Speg*Stellaria* sp**S. patriniae** Miura*Patrinia villosa* Juss.**S. perillae** Miyake*Perilla frutescens* (L.) Brit.*P. ocimoides* L.**S. pertusa** Heald et Wolf*Sorghum vulgare* Pers.**S. peucedanicola** Saw.*Peucedanum decursivum*

Max.

S. Phaseoli Maulb.*Phaseolus radiatus* L. var*aurea* Prain.*P. vulgaris* L.**S. piri** Miyake*Pyrus lindleyi* Rehd.**S. piricola** Desm. (*Mycosphaerella**sentina* (Fr.) Schroet.)*Pyrus calleryana* Decne.*P. communis* L.*P. serotina* Rehd.*P. sinensis* Lindl. var. *culta*

Max.

P. ussuriensis Max.*P.* sp.**S. piriformis** Miura*Aster chinensis* L.*A. scaber* Thunb.

- Septoria pirottae** Tassi
Ficus hirta Vahl.
- S. pisi** West
Pisum sativum L.
- S. platycodonis** Syd.
Platycodon glaucum (Thunb.) Nakai
P. grandiflorum DC. var.
glaucum Sieb. et Zucc.
- S. platycodontis** Petr.
Platycodon glaucum (Thunb.) Nakai
- S. plectranthi** Miura
Plectranthus glaucocalyx Max.
- S. polygonicola** (Lasch.) Sacc.
Polygonum bungeanum Turcz.
P. orientale L.
P. orientale L. var. *pilosum* Meisn.
- S. polygonina** Thuem.
Polygonum bungeanum Turcz.
P. orientale L. var. *pilosum* Meisn.
- S. polygonorum** Desm.
Polygonum orientale L.
- S. populicola** Pk.
Populus sp.
- S. posekersis** Sacc.
Sorghum vulgare Pers.
- S. potentillica** Thuem.
Potentilla kleiniana W. et A.
- S. ribis** Desm.
Ribes rubrum L.
- S. rubi** West. (*Mycosphaerella rubi* (West.) Roark.)
Rubus morifolius Sieb.
R. sp.
- S. rubi** West var. *brevispora* Sacc.
Rubus conduplicatus Duthie
- S. saccharina** Ell. et Ev.
Acer saccharum Wangenh.
- S. siegesbeckiae** Saw.
Siegesbeckia orientalis L.
- S. sinarum** Speg.
Dianthus chinensis L.
- S. sojae** Thuem.
Glycine max (L.) Merr.
- S. sonchinea** Thuem.
Sonchus arvensis L.
- S. arvensis* L. var. *uliginosus* Trautv.
- S. streptopii** Mura
Streptopus ajanensis Tiling
- S. swertiae** Pat.
Swertia sp.
- S. sydowi** P. Henn.
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq.
- S. taiana** Syd.
Alangium chinense (Lour.) Rehd.
- S. taraxacicola** Miura
Taraxacum officinale Web.
- S. tatarica** Syd. (*Mycosphaerella tatarica* (Syd.) Miura)
Aster tataricus L.
- S. theaeicola** Hara
Thea sinensis L.
- S. tilliae** West.
Tilia sp.
- S. tritici** Desm.
Triticum aestivum L.
T. vulgare Vill.
- S. trollii** Sacc. et Wint.
Trollius chinensis Bge.
- S. typhae** Saw.
Typha capensis Rohrb.
- S. ulmi** Hara
Ulmus japonica Sarg.
U. pumila L.
U. sp.
- S. viciae** West.
Vicia sp.
- S. violae** West.
Viola patrinii DC.
- S. xanthicola** Saw.
Xanthium strumarium L.
- S. yokohawai** Hara
Ulmus japonica Sarg.
- Shiraia bambusicola** P. Henn.
Bambusa sp.
Phyllostachys sp.
- Shiraella phyllostachydis** Hara
Phyllostachys sp.
- Sklerka nephelii** (Saw.) Ito et Murayama
Litchi chinensis Sonn.

- Sorosperium andropogonis-
aciculati** Petch
Chrysopogon aciculatus Trin.
S. andropogonis-micranthi Ling et
Chen
(参看 *Sphacelotheca
capillipedii* Ling)
S. anthistiriae (Cobb.) Ling
Cymbopogon tortilis (Presl) A.
Camus
Heteropogon contortus (L.)
Beauv.
Themeda gigantea (Cav.)
Hack.
T. triandra Forsk.
S. caledonicum Pat.
Heteropogon contortus (L.)
Beauv.
S. cantonensis Zundel
Cymbopogon hematutus Nees
C. tortilis (Presl) A. Camus
S. cymbopogonis-distantis Ling
Cymbopogon distans (Nees)
Duthie.
S. flagellatum Syd. et Butl.
Ischaemum timorense Kunth.
var. *peguense* Hack.
I. sp.
S. formosanum Saw.
Panicum repens L.
S. paspali-thunbergii (P. Henn.)
Ito
Paspalum scrobiculatum L.
P. thunbergii Kunth.
P. sp.
S. syntherismae (Peck) Farlow
Panicum miliaceum L.
Sphaceloma ampelinum de Bary
(*Elsinoe ampelina* (de Bary)
Shear)
Vitis amurensis Rupr.
V. labrusca L.
V. vinifera L.
V. sp.
S. batatas Saw (*Elsinoe batatas*
Jenk. et Vieg.)
Ipomoea batatas (L.) Poir.
S. fawcetti Jenk.
(*Elsinoe fawcetti* Bit. et Jenk.)
Citrus aurantium Linn.
C. deliciosa Tenore
C. erythrosa (Hort.) Tanaka
var. *chu-sha*
C. grandis Osb.
C. granatis Osb. f. *buntan*
C. kinokuni Tanaka
C. lemon (Burm. f.) Tanaka
C. lemon (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka*
C. limonia Osb.
C. limonia Osb. var.
C. microcarpa Bge.
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sabon Sieb.
C. sinensis (L.) Osb.
C. sunki Sakurai
C. tangerina Tanaka
C. tankan Hay.
C. unshiu Marc.
C. sp.
Fortunella crassifolia Sw.
F. obovata Tanaka
S. fawcetti Jenk. var. *scabiosa*
Jenk. (*Elsinoe australis* Bit. et
Jenk.)
Citrus lemon (Burm. f.) Tana-
ka var. *eureka*
S. ricini Jenk. et Cheo
Ricinus communis L.
S. rosarum (Pass.) Jenk.
Rosa brunonii Lindl.
R. rugosa Thunb.
R. sp.
Sphacelotheca andropogonis
(Opiz.) Bubak
Heteropogon contortus (L.)
Beauv.
S. anthistiriae (Petch) Ling
Themeda triandra Forsk.
S. anthistiriae (Petch) Ling var.
punctata Ling
Themeda triandra Forsk.
S. apludae (Syd.) Pavgi et
Mundk.
Apluda mutica L.
A. mutica L. var. *aristata* Hack.
S. capillipedii Lin
(=*Sorosporium andropogonis-
micranthi* Ling et Chen)
Andropogon micranthus Kunth.
Capillepedium parviflorum
Stapf.

Sphacelotheca cruenta (Kuehn.)
Potter

Sorghum vulgare Pers.

S. destruens (Schlecht.) Stevenson
et A.

Panicum miliaceum L.

S. hydropiperis (Schum.) de Bary

Polygonum blumei Meisn.

P. hydropiper L.

P. sagittatum L.

P. sp.

S. hydropiperis (Schum.) de

Bary var. *borealis* Clint.

Polygonum bistorta L.

P. sp.

S. isachnes (Syd.) Ling

(= *Ustilago isachnes* Syd., = *U. isachnes* Saw.)

Isachne australis R. Br.

S. miscanthi Yen

Miscanthus anomala Steud.

S. monilifera (Ell. et Ev.) Clint.

Heteropogon contortus (L.)

Beauv.

S. nankinensis Zundel

Imperata cylindrica (Linn.)

Beauv.

Paspalum scrobiculatum L.

var. *orbiculare* (Forst.) Mak.

S. ophiuri (P. Henn.) Ling

Ophiurus monostachys Presl

S. penniseti-japonici (P. Henn.)

Ito

Pennisetum alopecuroides (L.)

Spreng.

P. purpurascens Mak.

P. sp.

S. reiliana (Kuehn.) Clint.

Sorghum vulgare Pers.

Zea mays L.

S. rottboelliae (Syd. et Butl.)

Mundk.

Rottboellia japonica Honda

S. sacchari (Rab.) Cif.

Saccharum arundinaceum Retz.

S. officinarum L.

S. sinense Roxb.

S. sp.

S. sorghi (Link.) Clint.

Sorghum vulgare Pers.

S. vulgare Pers. subsp. *japonicus* Hack.

S. taiana (Syd.) Ling

(= *Ustilago taiana* Syd.)

Andropogon micranthus

Kunth.

Capillepedium parviflorum

Stapf.

Sorghum nitidum (Vahl.) Pers.

S. tanglinensis (Tracy et Earle)

Zundel

Ischaemum akoense Honda

I. aristatum L.

I. ciliare Retz.

I. ciliare Retz. var. *genuinum*

Hack.

I. sp.

S. tanglinensis (Tracy et Earle)

Zundel var. *hainanae* (Zundel)

Ling

Ischaemum rugosum Salisb.

Sphaerella gentianae Niessl.

(参看 *Mycosphaerella gentianae* (Niessl.) Lindau)

S. (Mycosphaerella) salicina Ell.
et Ev.

Salix sp.

Sphaerophragmium acaciae (Cke.)

Magn.

Albizia julibrissin Dur.

A. lebbek (L.) Benth.

Sphaeropsis ampelos (Schw.) Cke.

Vitis vinifera L.

S. amlorum Pk. (*Physalospora*

obtusa (Schw.) Cke.

Chaenomeles japonica Pers.

Eriobotrya japonica Lindl.

Malus pumila Mill.

M. pumila Mill. var. *domestica* Schneid.

M. sp.

Pyrus bretschneideri Rehd.

P. communis L.

P. ussuriensis Max.

P. sp.

S. oryzae (Catt.) Sacc.

Oryza sativa L.

S. ponciri Teng

Poncirus trifoliata Raf.

S. salicicola Pass.

Salix sp.

Sphaerostilbe repens Berk. et Br.
Hevea brasiliensis Muell. -Arg.
Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.)
 Poll.
Arctium lappa L.
Artemisia japonica Thunb.
Boehmeria nigea Gaud.
Cirsium arvensis Scop.
C. segetum Bge.
Citrullus vulgaris Schrad.
Corchorus capsularis L.
Coreopsis drummondii Torr.
 et Gray
Cosmos bipinnatus Cav.
Cucumis melo L.
C. melo L. var. *canomon* Mak.
C. melo L. var. *makuwa* Mak.
C. sativus L.
Cucurbita maxima Duch.
C. moschata Duch.
C. moschata Duch. var. *toonas*
 Mak.
C. sp.
Glycine max (L.) Merr.
Helianthus annuus L.
H. debillis Nutt.
Hibiscus abelmoschus L.
H. mutabilis L.
H. syriacus Linn.
Impatiens balsamina L.
I. nolitangere I.
Lactuca sp.
Lagenaria siceraria (Molina)
 Stanley
L. siceraria (Molina) Stanley
 var. *clavata* Ser.
L. siceraria (Molina) Stanley
 var. *gourda* Ser.
Ligularia hodgsoni Took
Luffa cylindrica Roem.
Melothria sp.
Momordica charantia L.
Myoporum bontiodides A. Gray
Phaseolus angularis Wight
P. aureus Roxb.
P. mungo L.
P. pendulus
P. radiatus L.
P. radiatus L. var. *aurea* Prain.

P. radiatus L. var.
typicus Parain.
P. vulgaris L.
P. sp.
Piper betle L.
Rosa rugosa Thunb.
Sanguisorba officinalis L.
Scabiosa sp.
Siegesbeckia orientalis L.
Solanum melongena L.
Solidago sp.
Taraxacum officinale Web.
Vigna sinensis Endl.
Zinnia elegans L.
S. humuli (DC.) Burr.
Cucurbita moschata Duch.
Humulus lupulus L. var. *cor-*
difolius Max.
Lagenaria siceraria (Molina)
 Stanley
Rosa microcarpa Lindl.
R. rugosa Thunb.
Sanguisorba officinalis L.
S. sp.
S. japonica (Salm.) Homma
Stephanandra chinensis Hance
S. lanestris Harkn.
Lithocarpus dealbata (Hook f.
 et Thoms.) Rehd.
Quercus acutissima Carr.
Q. delavayi Franch.
Q. serrata Thunb.
S. mors-uvæ (Schw.) Berk. et
 Curt.
Ribes grossularia L.
S. pauciflora (Wallr.) Lev.
Rosa centifolia L.
R. davurica Pall.
R. multiflora Thunb.
R. rugosa Thunb.
R. sp.
S. wrightii (Berk. et Curt.)
 Hoehn.
Quercus glauca Thunb.
Sphaerulina intermixta Sacc. f.
jasmini Keissler
Jasminu primulinum Hemsl.
S. rhodæe P. Henn. et Shirai
Liriope graminifolia Baker
Rhodea japonica Roth.

- Spondylocadium atrovirens** Harz.
Solanum tuberosum L.
- S. mori** Saw.
Morus alba L.
- S. tremae** Saw.
Trema orientalis Bl.
- Spongospora subterranea** (Wallr.) John.
Solanum tuberosum L.
- Stagnospora erythrinae** Saw.
Erythrina variegata L. var. *orientalis* Merr.
- S. machili** Saw.
Machilus makinoi Hay.
M. thunbergii Sieb. et Zucc.
- S. mali** Delacr.
Pyrus sp.
- S. narcissi** Hallos
Narcissus tazetta L. var. *chinensis* Roem.
- S. prominula** (Bork. et Curt.) Sacc
Malus pumila Mill
- Steganosporium castaneae** Lib
Castanea mollissima Bl.
- Stegophora aemula** Syd.
Ulmus davidiana Planch.
- Stemphylium botryosum** Wallr.
Medicago sativa L.
- S. sarcinaeforme** (Cav.) Wiltsh.
Trifolium hybridum L.
T. incarnatum L.
T. pratense L.
T. repens L.
- S. solani** Weber (Thyrospora solani (Weber) Saw.)
Lycopersicum esculentum Mill.
- Stereosorus monochoriae** Saw.
Monochoria vaginalis Presl
- Stereostratum corticioides** (Berk. et Br.) Magn.
Arundinaria densiflora Rendle
A. sp.
Bambusa sp.
- S. corticioides** (Berk et Br.) Magn.
Phyllostachys puberula Munro
P. sp.
- S. purpureum** Pers.
Ailanthus sp.
Prunus sp.
- Stigmatea armandi** Pat.
Clematis armandi Franch.
- Stilbonectria lateritia** (Berk.) Karst.
Manihot utilissima Pohl.
- Stilbum cinnabarina** Mont.
Eriobotrya japonica Lindl.
- Streptothrix fusca** Corda
Keteleeria davidiana (Fr.) Beissner.
- Stylina disticha** (Ehr.) Syd.
Livistona chinensis R. Br.
- Synchytrium dolichi** (Cke.) Gaum.
 (= *Woroninella dolichi* (Cke.) Syd.)
Dolichos lablab L.
- S. minutum** (Pat.) Gaum.
Pueraria phaseoloides Benth.
P. thunbergiana Benth.
- Systremma natans** (Tode) Theiss. et Syd.
Cudrania sp.
Plactycarya sp.
- S. sambuci** (F. et F.) Miller
Plactycarya sp.
- S. ulmi** (Schleich.) Theiss. et Syd.
Ulmus pumila L.
- Taphrina bullata** (B. et Br.) Tul.
Pyrus serotina Rehd.
P. sp.
- T. carpinii** Rostr.
Carpinus turczaninowii Hance
- T. cerasi** (Fuck.) iet.
Prunus sp.
- T. deformans** (Berk.) Tul.
Prunus persica Stokes
P. persica Stokes var. *vulgaris* Hax.
- T. mume** Nishila
Prunus armeniaca L.
P. manshurica Koehne.
P. mume Sieb. et Zucc.
- T. pruni** (Fuck.) Tul.
P. brachypoda Batal.
P. salicina Lindl.
P. tomentosa Thunb.
- T. truncicola** Kusano
Prunus glandulosa Thunb.
P. humulis Bge.

Tellimena graminis (Hoehn.)

Theiss. et Syd.

Digitaria sanguinalis (L.)

Scop.

*D. sp.***Teloconia kamtschatkae** (Anders.)

Hirat.

Rosa icicularis Lindl.*R. davurica* Pall.*R. marretii* Levl.*R. rugosa* Thunb.*R. sp.***Thekopsora brachybotrydis**

Tranzsch.

Brachybotrys paridiformis

Max.

T. guttata (Schroet.) Syd.*Galium verum* L.**T. rubiae** Kom.*Rubia cordifolia* L.*R. cordifolia* L. f. *pratensis*

Max.

R. sylvatica Nakai**Thielaviopsis paradoxa** (de Seynes)Hoehn. (*Ceratocystis paradoxa*

(Dode) Moreau)

*Musa sp.**Saccharum officinarum* L.**Thyrospora gossipicola** Nisikado*Gossypium herbaceum* L.**T. solani** (Weber) Saw(参看 *Stemphylium solani*

Weber)

Tilletia alopecuri (Saw.) Ling*Alopecurus geniculatus* L.**T. arundinellae** Ling*Arundinella anomala* Steud**T. caries** (DC.) Tul.*Triticum aestivum* L.*T. sativum* L.*T. turgidum**T. vulgare* Vill.**T. foetida** (Wallr.) Liro*Triticum aestivum* L.*T. vulgare* Vill.**T. okudairae** (Miyabe) Ling(= *T. taiana* Mundk.)*Coix agrostis* Lour.**T. pennisetina** Syd.*Pennisetum alopecuroides* (L.)

Spreng.

P. triflorum Nees*P. sp.***T. pulcherrima** Ell. et Gall.*Digitaria sanguinalis* (L.)

Scop.

Echinochloa crus-galli (L.)

Beauv

Syntherisma sanguinalis Dulacvar. *ciliaris* Honda**T. rhei** Zundel*Rheum franzenbachii* Muent.**T. setariae** Ling(参看 *Neovossia setariae* (Ling)

Yu et Lou)

T. taiana Mundk.(参看 *T. okudairae* (Miyabe)

Ling)

Titaeospora andropogonis (Miura)

Tai

(参看 *Ramulispora sorghi* (Ell.

et Ev.) Olive et le Febure)

Tolyposporium bullatum (Schroet.)

Schroet.

Echinochloa colonum (L.)

Link.

E. crus-galli (L.) Beauv.*E. crus-galli* (L.) Beauv.subsp. *submutica* Honda*E. crus-galli* (L.) Beauv. var.*mitis* (Pursn.) Peterm.**T. evernium** Syd.*Paspalum distichum* L.**T. globuligerum** (Berk. et Br.)

Ricker

Leersia oryzoides Swartz. var.*japonica* Hack.**Torula rhododendri** Ces.*Rhododendron sp.***Trabutia chinense** Yates*Ficus sp.***T. elmeri** Theiss. et Syd.*Ficus sp.***Trametes hispida** Bagl.*Populus sp.**Salix sp.***T. suaveolens** (L.) Fr.*Populus tremula* L. var.*dauidiana* Schneid.*Salix matsudana* Koidz.*S. sp.*

Tranzschelia pruni-spinosae

(Pers.) Diet.

Anemone chinensis Bge.*Prunus armeniaca* L.*P. glandulosa* Thunb.*P. manshurica* Koehne.*P. mume* Sieb. et Zucc. var.*formosana* Masam.*P. persica* Stokes*P. salicina* Lindl.*P. salicina* Lindl. var. *typica*
Nakai*P. sp.**Pulsatilla chinensis* (Bge.)

Regel.

T. pulsatillae (Opiz.) Diet.*Anemone chinensis* Bge.*Pulsatilla cernua* Spreng.*P. chinensis* (Bge.) Regel.*P. koreana* Nakai**T. thalietri** (Chev.) Diet.*Thalictrum minus* L.*T. sp.***Trematosphaerella oryzae**

(Miyake) Padw.

(=*Phaeosphaeria oryzae*
Miyake)*Oryza sativa* L.**T. padwickii** Gamg.*Oryza sativa* L.**Trichoderma viride** Tul.*Citrus nobilis* Lour.*C. sinensis* (L.) Osb.*C. sp.***Trichothecium roseum** (Pers.)

Link.

Citrus grandis Osb.*Colocasia esculenta* Schott.*Gossypium arboreum* L.*G. herbaceum* L.*G. hirsutum* L.*G. sp.**Ipomoea batatas* (L.) Poir.*Juglans regia* L.*Lycopersicum esculentum*

Mill.

Malus pumila Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica*
Schneid.*Oryza sativa* L.*Phaseolus vulgaris* L.*Prunus persica* Stokes*Pyrus communis* L.*P. sinensis* Lindl. var. *culta*
Mak.*P. ussuriensis* Max.*P. sp.***T. roseum** (Bull.) Link.*Solanum tuberosum* L.*Vitis vinifera* L.*Wistaria sinensis* Sweet**Triphragmiopsis jeffersoniae**

Naumov

Jeffersonia dubia Max.**T. laricinum** (Chou) Wang*Larix olgensis* Henry**Triphragmium ulmariae** (Schw.)

Link.

Filipendula angustiloba Max.*F. kiraishiensis* Hay.*F. nuda* Grubav.*F. palmata* (Pall.) Max.**Triposporiopsis spinigera** (Hoehn.)

Yamam.

Achras sapota L.*Callicarpa formosana* Rolfe*Castanea cruenta* Sieb. et

Zucc.

Ceratonia siliqua L.*Citrus chrysocarpa**C. grandis* Osb.*C. lemon* (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka**C. paradisi**C. poonensis* Tanaka*C. tankan* Hay.*Clerodendron fragrans* Vent*Coffea liberica* Bull.*Dendrocalamus latiflorus*

Munro

*Eugenia malaccensis**Euphoria longana* Lam.*Ficus bengalensis**F. retusa* Linn.*F. septica* Burm. f.*F. wightiana* Wall.*Gardenia angustifolia**Holarrhena antidysenterica**Ixora chinensis* Lam.*I. coccinea* Linn.*Leleba oldhami* Nakai

- Triposporiopsis spinigera** (Hoehn.) Yamam.
Michelia alba DC.
Murraya paniculata (L.) Jack.
Myrica rubra Sieb. et Zucc.
Photinia taiwanensis
Phyllostachys makinoi Hay.
Psidium guayava L.
Quercus glauca Thunb.
Q. variabilis Bl.
Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.
Thea sinensis L.
Trema orientalis Bl.
- Tubercularia abutilonis** Katsura
Abutilon avicennae Gaertn.
- T. fici** Edg.
Ficus carica L.
- T. puerariae** Saw.
Rhus semilata Murr.
- T. phyllophila** Syd.
Pueraria thunbergiana Benth.
- T. vulgaris** Tode (Nectria cinnabarina (Tode) Fr.)
Cudrania tricuspidata Bur.
- Tuberculina nomuraina** Sacc.
Astragalus sinicus L.
- Tubeufia javanica** Penz. et Sacc.
Ischurochloa stenostachya Nakai
- Typhula itoana** Imai
Triticum aestivum L.
- Typhulochaeta japonica** Ito et Hara
Castanopsis sp.
Quercus aliena Bl.
Q. baronii Skan.
Q. sp.
- T. koelreuteriae** (Miyake) Tai
Koelreuteria bipinnata Franch.
- Uncinula acalyphae** Tai
 (参看 *Orthochaeta acalyphae* Saw.)
- U. aceris** (DC.) Sacc.
Acer catalpifolium Rehd.
A. caudatum Wall. var. *georgei*
A. mono Max. var. *platanoides* Miyabe
A. sp.
- U. aceris** (DC.) Sacc. var. *tulasnei* (Fuck.) Salm.
Acer mono Max var. *platanoides*

- des Miyabe
A. sp.
- U. australiana** McAlp.
Lagerstroemia indica L.
L. subcostata Koehne.
- U. bischoffiae** Wei
Bischofia trifoliata Hook
- U. bulbosa** (Tai et Wei) Tai
Koelreuteria paniculata Laxm.
- U. clandestina** (Biv.) Schroet.
Ulmus parvifolia Jacq.
U. pumila L.
U. sp.
- U. clintoni** Peck
Celtis biondii Pamp.
C. bungeana Bl.
C. sinensis Pers.
Cudrania tricuspidata Bur.
Firmiana simplex Wight
Paulownia tomentosa (Thunb.) Schneid.
Ulmus sp.
Vanieria sp.
- U. zelkova serrata** Mak.
Zelkova serrata Pat.
- U. Ailanthus altissima** (Mill.) Sw.
A. sp.
Cedrela sinensis Juss.
- U. delavayi** Pat. var. *cedrelae* Tai
Cedrela chinensis Juss.
C. sinensis Juss.
- U. delavayi** Pat. var. *nodulosa* Tai
Cedrela sinensis Juss.
- U. ehretiae** Keissler
Ehretia corylifolia Wright
E. sp.
- U. fraxini** Miyabe
Fraxinus chinensis Roxb.
F. sp.
Lindera sp.
- U. kenjiana** Homma
Ulmus pumila L.
U. sp.
- U. mandshurica** Miura
Populus laurifolia Ledeb.
P. simonii Carr.
- U. miyabei** (Salm.) Sacc. et Syd.
Alnus japonica Sieb. et Zucc.
Cudrania tricuspidata Bur.
Heimiptelea davidii Planch.

- Uncinula miyabei** (Salm.) Sacc. et Syd. var. *aleuritis* Wei
Aleurites fordii Hemsl.
- U. mori** Miyake
Morus alba L.
- U. nankinensis** Tai
Acer buergerianum Miq.
- U. necator** (Schw.) Burr.
Actinidia kolomicta Max.
Vitis amurensis Rupr.
V. vinifera L.
V. sp.
- U. polyfida** Wei
Acer catalpifolium Rehd.
- U. salicis** (DC.) Wint.
Populus adenopoda Max.
P. simonii Carr.
P. sp.
Salix babylonica L.
S. cinerea L.
S. daphnoides Vill.
S. gymnolepis Levl. et Vant.
S. matsudana Koidz.
S. phanera Schneid.
- U. salicis** (DC.) Wint.
Salix viminalis L.
S. wallichiana Anders.
S. sp.
- U. salici-gracilistylae** Hemma
Salix gracilistyla Miq.
- U. salmoni** Syd.
Fraxinus chinensis Roxb.
var. *rhynchophylla* Hemsl.
F. mandshurica Rupr.
F. sp.
- U. sengokui** Salm.
Celastrus articulatus Thunb.
- U. septata** Salm.
Quercus fabri Hance
Q. vafiabilis Bl.
- U. simulans** Salm.
Rosa sp.
- U. sinensis** Tai et Wei
Acer buergerianum Miq.
Rhus trichocarpa Miq.
- U. verniciferae** P. Henn.
Carpinus turczaninowii Hance
Chionanthus retusus Lindl.
Cotinus coggygeria Scop.
C. coggygeria Scop. var.
cinerea Engl.
Liquidambar formosana Hance

- Pistacia chinensis* Bge.
Rhus semilata Murr.
R. succedanea L.
R. verniciflua Stokes
- Uncinulopsis polychaeta** (Berk. et Curt.) Wei
Campylotropis polyantha
(Franch.) Schindl.
Celtis bungeana Bl.
C. sinensis Pers.
C. sp.
Pueraria peduncularis Grah.
- Uredo alocasiae** Syd.
Alocasia odora C. Koch.
- U. alpestris** Schroet.
Viola sp.
- U. artabotrydis** Syd.
Artabotrys odoratissimus
R. Br.
- U. arundinis-donacis** Tai
Arundo donax L.
- U. broussonetiae** Saw.
Broussonetia papyrifera
L.-Herit
- U. caricis-baccantis** Saw.
Carex baccans Nees
- U. cassiae-glaucæ** Syd.
Cassia surattensis Burm. f.
- U. cudraniae** Saw.
Cudrania cochinchinensis Ma-samune var. *gerontogea* Ma-samune
- U. cynodontis-dactylis** Tai
Cynodon dactylon (L.) Pers.
- U. cyperi-tagetiformis** P. Henn.
Cyperus sp.
- U. daphnicola** Diet.
Daphnes sp.
- U. desmodii-pulchellii** Syd.
Desmodium pseudo-triquetrum DC.
D. pulchellum Benth.
D. triquetrum (L.) DC.
- U. deutziae** Barcl.
Deutzia discolor Hemsl.
- U. deutziiicola** Hirat.
Deutzia pulchra Vidal. var.
formosana Nakai
D. taiwanensis Schneid.
- U. dianellae** Diet.
Dianella ensifolia DC.
D. sp.

- Uredo ehretiae** Barcl.
Ehretia dicksoni Hance var.
japonica Nakai
E. macrophylla Wall.
E. taiwaniana Nakai
E. thyrstiflora Nakai
- U. garanbiensis** Hirat. et Hash.
Ehretia dicksoni Hance var.
typica Nakai
- U. guettardae** Hirat. et Hash.
Kuettarda speciosa L.
- U. houttuyniae** Saw.
Houttuynia cordata Thunb.
- U. iyoensis** Hirat. f. et Yosh.
Viola sp.
- U. leucaenae-glaucæ** Hirat. et Hash.
Leucaena glauca Benth.
- U. malloti** P. Henn.
Mallotus japonicus Muell.-Arg.
- U. miscanthi-sinensis** Saw.
Miscanthus sinensis Anders.
var. *variegatus* Bael.
- U. morifolia** Saw.
Morus alba L.
- Uredo nervicola** Tranzsch.
Potentilla fragarioides L.
- U. orientalis** Racib.
Blechnum orientale L.
- U. paederiae** Syd.
Paederia chinensis Hance
P. sp.
- U. panici-plicati** Saw.
Setaria plicata (Lam.) Cke.
- U. panicis** Syd.
Panax pseudo-ginseng
C. A. Mey.
- U. phragmitis-karkae** Saw.
Phragmitis Karka Trin.
- U. rubi-lasiniato-stipulati** Saw.
Rubus laciniato-stipulatus
Hay.
- U. rubi-swinhoei** Saw.
Rubus swinhoei Hance
- U. sawadae** Ito
Ficus carica L.
F. nervosa Heyne
- U. scolopiae** Syd.
Scolopia chinensis Clos
S. crenata Clos
S. sp.
- U. sinensis** (Syd.) Trott.
Cudrania sp.
- U. sonchi-arvensis** Saw.
Sonchus arvensis L.
- U. swerticicola** Hirat.
Swertia arisanensis Hay.
- U. tephrosiae** Rabenh.
Tephrosia purpurea Pers.
- U. tholopsora** Cummins
Populus nigra L.
P. tomentosa Carr.
P. sp.
- U. verecunda** Syd.
Achyranthes aspera L.
- U. vernoniicola** Petch
Vernonia patula Merr.
- Urocystis agropyri** (Preuss.)
Schroet. (= *U. tritici* Koern.)
Agropyron sp.
Triticum aestivum L.
T. turgidum
T. vulgare Vill.
- U. anemones** (Pers.) Wint.
Anemone chinensis Bge.
A. raddeana Regel.
- U. dioscoreae** Syd.
Dioscorea quinqueloba Thunb.
- U. japonica** (P. Henn.) Ling
Anemone japonica S. et J.
A. sp.
- U. tritici** Koern.
(参看 *U. agropyri* (Preuss.)
Schroet.)
- Uromyces aconiti** Fuck.
Aconitum delavayi Fr.
A. delavayi Fr. var.
coreana Lev
A. lycoctonum L.
- U. acori** Ramak. et Rang.
Acorus calamus L.
A. calamus L. var.
angustatus Bess.
- U. alopecuri** Seym.
Alopecurus aequalis Sobol.
A. amurensis Kom.
A. arundinaceus Poir.
A. fulvus L.
A. geniculatus L.
A. japonicus Steud.
A. pratensis L.
A. sp.

Uromyces amurensis Kom.*Maackia amurensis* Rupr. et Max.*Millettia reticulata* Benth.**U. appendiculatus** (Pers.) Link.(= *U. phaseoli* (Pers.) Wint.
var. *typica* Arthur)*Dolichos lablab* L.*Phaseolus angularis* Wight*P. aureus* Roxb.*P. chrysantha* Savi*P. coccineus* L.*P. mungo* L.*P. mungo* L. var.*subtrilobata* Fr. et Sav.*P. radiatus* L.*P. radiatus* L. var. *aurea*

Prain.

P. radiatus L. var. *typicus*

Prain.

P. vulgaris L.*P. sp.***U. baeumlerianus** Bubak*Melilotus alba* Desr.*M. indica* (L.) Allesch.*M. officinalis* Desr.**U. callicarpae** Fujikuro*Callicarpa cana* L.*C. formosana* Rolfe*C. longiloba* Merr.*C. sp.***U. capitatus** Syd.*Desmodium yunnanense*

Franch.

U. commelinae Cke.*Commelina nudiflora* L.*C. undulata* R. Br.*C. sp.**Pollia japonica* Thunb.**U. coronatus** Miyabe et Nishida*Oryza sativa* L.*Zizania caduciflora* H.-M.*Z. sp.***U. craccae** L.*Vicia cracca* L.**U. crassivertex** Diet.*Lychnis* sp.**U. decipiens** Syd.*Lithocarpus uraiianus* Hay.**U. decoratus** Syd.*Crotalaria juncea* L.*C. verrucosa* L.**U. dianthi** Niessl.*Dianthus caryophyllus* L.*D. chinensis* L.*D. longicalyx* Miq.**U. diclepterae** Syd.*Strobilanthes flaccidifolius*
Nees**U. dolicholi** Arthur*Cajanus cajan* (L.) Millsp.**U. eriochloae** Syd. et Butl.*Eriochloa villosa* (Thunb.)
Kunth.**U. ervi** (Opiz.) West.*Vicia kulingiana* Bail.*V. sativa* L.*V. tetrasperma* (L.) Moench**U. erythronii** (DC.) Pass.*Tulipa edulis* Baker**U. fabae** (Pers.) de Bary*Pisum sativum* L.*P. sativum* L. var. *arvense*
Poir.*Vicia amoena* Fisch. var.
oblongifolia Regel.*V. cracca* L.*V. cracca* L. var. *japonica* Miq.*V. faba* L.*V. faba* L. var. *ascendens* Mak.*V. kulingiana* Bail.*V. sativa* L.*V. sepium* Linn.*V. unijuga* Al. Br.*V. sp.***U. flectens** Lagh.*Trifolium repens* L.**U. garanbiensis** (Hirat. f. et Hash.) Saw.*Ehretia dicksoni* Hance**U. geranii** (DC.) Lev.*Geranium nepalense* Sweet*G. sibiricum* L.*G. sp.***U. glycyrrhizae** (Rabh.)

Magn.

Glycyrrhiza echinata L.*G. glabra* L.*G. uralensis* Fisch.**U. halstedii** de Toni*Leersia* sp.

- Uromyces helmerlianus* Magn.
Lathyrus davidii Hance
Vicia gigantea Bge.
V. unijuga Al. Br.
 U. *hyalospora* Saw.
Acacia richii A. Br.
 U. *hyperici* Curt.
Hypericum japonicum Thunb.
 H. sp.
 U. *inaequalitus* Lasch.
Silene fortunei Vis.
S. kiiruninsularis Masamune
 U. *inayati* Syd.
Apluda mutica L.
 U. *kalmusii* Sacc.
Euphorbia esula L.
 U. *laburni* (DC.) Otth.
Caragana frutex Koch.
C. microphylla Lamb.
C. rosea Turcz.
C. sinica (Buchoz.) Rehd.
 C. sp.
 U. *leptaleus* Syd.
Stellaria sp.
 U. *leptodermus* Syd.
Isachne firmula Buse
Setaria sp.
 U. *lespedezae-bicoloris* Tai et
 Cheo
Lespedeza bicolor Turcz.
 U. *lespedezae-macrocarpae* Liou
 et Wang
Campylotropis macrocarpa
 (Bge.) Rehd.
 U. *lespedezae-procumbentis*
 (Schw.) Curt.
Kummerowia striata (Thunb.)
 Schindl.
Lespedeza bicolor Turcz.
L. bicolor Turcz. var. *japonica*
 Nakai
L. chinensis G. Don.
L. sericea Miq.
L. cystoides Nakai
L. dahurica Schindl.
L. floribunda Bge.
L. formosa (Vog.) Koehne.
L. hedysaroides (Pall.) Kita-
 gawa
L. hedysaroides (Pall.) Kita-
 gawa var. *inschanica* Kita-
 gawa
L. pubescens Hay.
L. striata Hook et Arn.
L. tomentosa Sieb.
 L. sp.
 U. *ligulariae* Hirat. et Hash.
Ligularia tussilaginea Mak.
 var. *formosana* Hay.
 U. *lilli* (Link.) Fock.
Fritillaria maximowiczii
 Freyn.
 F. sp.
 U. *limonii* (DC.) Lev.
Statice aurea L.
S. bicolor Bge.
S. sinensis Girard
 U. *linearis* Bark. et Br.
Panicum repens L.
 U. *mercurialis* P. Henn.
Mercurialis leiocarpa Sieb. et
 Zucc.
 U. *minor* Schroet.
Trifolium lupinaster L.
 U. *mucunea* Rabb.
Glycine max (L.) Merr.
Stizolbium capitatum (Sweet)
 Kuntze.
 U. *oblongisporus* Ell. et Ev.
Artemisia sp.
 U. *orobi* Lev.
Vicia unijuga Al. Br.
 U. *phaseoli* (Pers.) Wint. var.
typica Arthur
 (参看 U. *appendiculatus*
 (Pers.) Link.)
 U. *phaseoli-vignae* (Barcl.)
 Arthur
 (参看 U. *vignae* Barcl.)
 U. *polygoni-aviculariae* (Pers.)
 Karst.
Polygonum aviculare L.
P. multiflorum Thunb.
 P. sp.
 U. *proeminens* (DC.) Lev.
Euphorbia humifusa Willd.
E. humifusa Willd. var. *pilosa*
 Thellung
E. sieboldiana Morr. et Decne.
 U. *punctatus* Schroet.
Astragalus dahuricus (Pall.)
 DC.
A. nokoensis Sasaki
A. otosemius Kitagawa

Uromyces punctatus Schroet.*A. scaberrimus* Bge.*A. sinicus* L.*A. sp.***U. rudbeckiae** Arthur et Holw.*Solidago virgaurea* L.**U. rugulosus** Pat.*Campylotropis balfouriana*
(Diels) Schindl.*C. hirtella* (Franch.) Schindl.*C. polyantha* (Franch.)

Schindl.

Lespedeza bicolor Turcz.*L. buegeri* Miq.*L. yunnanensis* (Franch.)

Schindl.

*L. sp.***U. rumicis** (Schum.) Wint.*Rumex* sp.**U. saururi** P. Henn.*Saururus chinensis* (Lour.)

Bail.

U. setariae-italicae Yosh.*Setaria glauca* Beauv*S. italica* Beauv.*S. lutescens* (Wiegel) F. E.

Hubb.

S. lutescens (Wiegel) F. E.Hubb. var. *genuina* Honda*S. viridis* Beauv.**U. solidaginis** (Sommf.) Niessl.*Solidago virgaurea* L.**U. sophorae-flavescentis** Kusano*Sophora angustifolia* Sieb. et
Zucc.*S. flavescens* Ait.*S. flavescens* Ait. var. *angus-*
tifolia Kitagawa**U. sophorae-viciifoliae** Tai*Sophora viciifolia* Hance**U. sphaerocarpus** Syd.*Indigofera* sp.**U. striatus** Schroet.*Medicago lupulina* L.*M. sativa* L.*M. sp.**Trifolium repens* L.**U. striolatus** Tranzsch.*Euphorbia* sp.**U. suzukii** Saw.*Siegesbeckia orientalis* L.**U. tenuicutis** McAlp.*Sporobolus elongatus* R. Br.*S. indicus* (L.) R. Br.**U. trifolii** (Hedw. f.) Lev.*Trifolium fragiferum* L.**U. truncicola** P. Henn. et Shirai*Sophora japonica* L.*S. sp.***U. valerianae** (Schum.) Fuck.*Valeriana dubia* Bge.**U. valerianae-wallichii** Arthur et
Cummins*Valeriana flaccidissima* Max.**U. veratri** (DC.) Schroet.*Veratrum nigrum* L.**U. viciae-craccae** Const.*Vicia cracca* L.**U. vignae** Barcl.(= *U. phaseoli-vignae* (Barcl.)
Arthur)*Vigna lutea* Gray*V. sinensis* Endl.*V. vexillata* Benth.*V. sp.***U. vignae-sinensis** Miura*Vigna sinensis* Endl.**Uropyxis arisanensis** (Hirat. et

Hash.) Ito et Muray.

Melothria mucronata Cogn.*M. indica* Sour.*M. sp.***U. fraxini** (Kom.) Magn.*Fraxinus chinensis* Roxb. var.
rhynchophylla Hemsl.**Ustilaginoides arundinellae** P.
Henn.*Arundinella anomala* Steud.**U. penniseti** Miyake*Eragrostis ferruginea* (Thunb.)
Beauv.*Pennisetum alopecuroides* (L.)
Spreng.**U. sacchari-narengae** Saw.*Saccharum narenga* (Nees)
Hack.**U. virens** (Cke.) Tak.*Oryza sativa* L.*O. sp.**Zea mays* L.

- Ustilago aculeata** (Ule) Liro
Agropyron ciliare (Trin.) Franch.
 A. sp.
- U. anhweiana** Zundel
Polygonum sp.
- U. avenae** (Pers.) Rostr.
Avena fatua L.
A. sativa L.
 A. sp.
- U. bothriochloae** Ling
Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus
- U. bullata** Berk.
Bromus unioloides H. B. K.
- U. coicis** Bref.
Coix lachryma-jobi L.
- U. cordai** Liro
Polygonum blumei Meisn.
P. bungeanum Turcz.
P. hydropiper L.
P. hydropiper L. var. *flaccidum* (Meisn.) Steward
P. hydropiper L. var. *maximowiczii* Mak.
P. nodosum Pers.
 P. sp.
- U. crameri** Koern.
Setaria italica Beauv.
S. italica Beauv. var. *germanica* Trin.
S. viridis Beauv.
- U. crus-galli** Tracy et Earle
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
E. crus-galli (L.) Beauv. subsp. *submutica* Honda
E. crus-galli (L.) Beauv. var. *edulis* Honda
- U. cynodontis** P. Henn.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
- U. eleocharidis** Saw.
Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. et Hensch.
- U. emodensis** Berk.
Polygonum chinense L.
P. nepalense Meisn.
 P. sp.
- U. esculenta** P. Henn.
 (参看 *Yenia esculenta* (P. Henn.) Liou)
- U. filamenticola** Ling
Polygonum japonicum Meisn.
- U. heuffleri** Fuck.
Tulipa edulis Baker
- U. hordei** (Pers.) Lagerh.
Avena fatua L.
A. sativa L.
 A. sp.
Hordeum sativum Jessen
H. sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
H. vulgare L.
- U. isachnes** Saw., *U. isachness* Syd.
 (参看 *Sphacelotheca isachnes* (Syd.) Ling)
- U. kenjiana** Ito
Sorghum vulgare Pers.
- U. kusanoi** Syd.
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb.
M. sinensis Anders.
- U. maydis** (DC.) Corda
Zea mays L.
- U. neglecta** Niessl.
Setaria glauca Beauv.
S. lutescens (Wiegel) F. E. Hubb.
S. viridis Beauv.
- U. nuda** (Jessen) Rostr.
Hordeum sativum Jessen
H. sativum Jessen var. *vulgare* Hack.
H. vulgare L.
Triticum aestivum L.
T. turgidum
T. vulgare Vill.
- U. ocrearum** Berk.
Polygonum campanulatum Hook f. var. *fulvidium* Hook f.
 P. sp.
- U. panici-frumentacei** non Bref., Ling
 (参看 *U. sphaerogena* Burr.)
- U. rapenhorstiana** Kuehn.
Digitaria chinensis Hornem.
D. ischaemum (Schreb.) Muhl.
D. sanguinalis (L.) Scop.
D. sanguinalis (L.) Scop. var. *ciliaris* Retz.
D. ternata (Rich.) Stapf.
 D. sp.

- Ustilago reticulata** Liro
(= *U. utriculosa* auct.)
Polygonum btumei Meisn.
P. bungeanum Turcz.
P. lapathifolium L. var. *incanum* Ledeb.
P. lapathifolium L. var. *ianatum* (Roxb.) Steward
P. nodosum Pers.
P. sp.
- U. rumicis** (Berk.) Clint.
Rumex sp.
- U. scitaminea** Syd.
Saccharum officinarum L.
S. sinense Roxb.
- U. shiraiana** P. Henn.
Phyllostachys congesta Rendle
P. makinoi Hay.
P. reticulata Koch.
P. sp.
- U. sparsa** Underw.
Dactyloctenium aegypticum (L.) Willd.
- U. spermophora** Berk. et Curt.
Eragrostis cilianensis (Allesch.) Link.
E. ferruginea (Thunb.) Beauv.
E. japonica (Thunb.) Trin.
E. tenella (L.) Beauv.
- U. sphaerogena** Burr.
(= *U. panici-frumentacei* non Bref., Ling)
Echinochloa colonum (L.) Link.
E. crus-galli (L.) Beauv.
E. crus-galli (L.) Beauv. subsp. *submutica* Honda
E. crus-pavonis (H. B. K.) Schult.
E. frumentacea Link
E. sp.
- U. sporobol-indici** Ling
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
- U. striiformis** (Westd.) Niesl.
Hierochloa glabra Trin.
- U. superba** Liro
(参看 *U. violacea* (Pers.) Fuck.)
- U. taiana** Syd.
(参看 *Sphacelotheca taiana* (Syd.) Ling)
- U. utriculosa** auct.
(参看 *U. reticulata* Liro)
- U. vaillantii** Tul.
Scilla chinensis Benth.
- U. violacea** (Pers.) Fuck.
(= *U. superba* Liro, fide Ling, 1953)
Dianthus superbus L.
Silene tatarinowii Regel
S. tenuis Willd. var. *rubescens* Franch.
- U. warmingii** Rostr.
Rumex aquaticus L.
- Ustilina zonata** (Lev.) Sacc.
Hevea brasiliensis Muell.-Arg.
- Valsa ambiens** Fr.
Pyrus bretschneideri Rehd.
P. communi L.
P. serotina Rehd.
P. sinensis Lindl. var. *culta* Mak.
P. ussuriensis Max.
P. sp.
- V. coronata** (Hoffm.) Fr.
Rosa sp.
- V. japonica** Miyabe et Hemmi
Prunus armeniaca L.
- V. leucostoma** (Pers.) Fr.
(参看 *Leucostoma persoonii* (Nit.) Tagashi)
- V. mali** Miyabe et Yamada
Malus asiatica Nakai
M. prunifolia Borkh.
M. pumila Mill.
M. pumila Mill. var. *domestica* Schneid.
M. sp.
- V. populina** Fuck.
Populus sp.
- V. sordida** Nitsch.
(参看 *Cytospora chrysosperma* (Pers.) Fr.)
- V. subclypeata** C. et Peck
Rhododendron sp.
- Venturia geranii** (Fr.) Wint.
Geranium pratense L.
- V. inaequalis** (Cke.) Wint.
(参看 *Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fuck.)
- V. pirina** Aderh.
(参看 *Fusicladium pirinum* (Lib.) Fuck.)
- V. populina** (Vuill.) Fabr.
Populus laurifolia Ledeb.

- Vermicularia capsici* Syd.
 (参看 *Colletotrichum nigrum*
 Ell.-et Halst.)
- V. *graminicola* West.
Sorghum vulgare Pers.
- V. *liliacearum* West.
Iris collettii Hook f.
I. japonicus Thunb.
Liriope sp.
Tupistra sp.
- V. *nigronitensis* Saw.
Phyllostachys makinoi Hay.
- V. *ophiopogonis* Pat.
Liriope graminifolia Baker
Ophiopogon japonicus Ker-
 Gawl.
- V. *tofieldiae* Pat.
Tofieldia yunnanensis Franch.
- Verticillium albo-atrum* Reinke
 et Berth.
Gossypium arboreum L.
G. hirsutum L.
Solanum melongena L.
S. tuberosum L.
- V. *dahliae* Kleb.
Gossypium hirsutum L.
G. barbadense L.
G. sp.

- Solanum melongena* L.
S. nigrum L.
- Wageria tremae* Saw.
Trema orientalis Bl.
- Woroninella dolichi* (Cke.) Syd.
 (参看 *Synchytrium dolichi*
 (Cke.) Gaum.)
- Xenodochus carbonarium*
 Schlecht.
Sanguisorba canadensis L.
S. officinalis L.
- Xenostele litseae* (Pat.) Syd.
Neolitsea acuminata Kanehira
 et Sasaki
- Yenia esculenta* (P. Henn.) Liou
 (= *Ustilago esculenta* P. Henn.)
Zizania caduciflora H.-M.
- Zaghouania phillyreae* Pat.
Osmanthus fragrans Lour.
- Zukalia nantoensis* Saw.
Thea sinensis L.
- Z. *theae* Saw.
Thea sinensis L.
- Zukallopsis gardeniae* Saw.
Gardenia jasminoides Ell.
Ligustrum japonicum Thunb.
- Z. *versioniana* Sacc.
Punica granatum L.

細菌

Actinomyces scabies (Thaxt.)

Gussow

(=*Oospora scabies* Thaxter)*Solanum tuberosum* L.**Agrobacterium rhizogenes** (Riker et al.) Conn.)*Malus pumila* Mill.**A. tumetaciens** (Smith et Towns.) Conn.*Abutilon avicennae* Gaertn.*Beta vulgaris* L. var. *rapacea* Koch.*Canarium album* Raeusch.*Malus pumila* Mill.*M. pumila* Mill. var. *domestica* Schneid.*Prunus armeniaca* L.*P. persica* Stokes*P. persica* Stokes var. *vulgaris* Max.*P. pseudocerasus* Lindl.**Bacillus brassicae** Hara*Brassica campestris* L.*B. chinensis* L. var. *oleifera* Mak.**B. sorghi** Burr.*Sorghum vulgare* Pers.**B. theae** Hori et Bokura*Thea sinensis* L.**Bacterium colocasiae** Takim.*Colocasia esculenta* Schott.*Nicotiana tabacum* L.**B. stewarti** Smith*Zea mays* L.**B. zeae** Comes.*Zea mays* L.**B. sp.***Hibiscus cannabinus* L.*Setaria italica* Beauv.*Triticum aestivum* L.**Corynebacterium sepedonicum**

(Spieck et Kotth.) Skaptason et Burkh.

Solanum tuberosum L.**C. tritici** (Hutch.) Burkh.*Triticum aestivum* L.**Erwinia amylovora** (Burr.) Winsl. et al.*Pyrus communis* L.*P. serotina* Rehd.*P. sp.***E. aroideae** (Townsend) Holl.*Allium cepa* L.*Apium graveolens* L.*Benincasa hispida* Cogn.*Brassica cernua* Thunb.*B. chinensis* L.*B. juncea* L.*B. oleracea* L.*B. oleracea* L. var. *capitata* L.*B. oleracea* L. var. *gongylodes* L.*B. pekinensis* Rupr.*B. rapa* L.*B. sp.**Capsicum annuum* L.*C. frutescens* L.*Colocasia esculenta* Schott.*Cucumis sativus* L.*Daucus carota* L.*Lactuca sativa* L.*Lycopersicum esculentum* Mill.*Nicotiana rustica* L.*N. tabacum* L.*Raphanus sativus* L.*Solanum tuberosum* L.**E. atroseptica** (Hall.) Jenn.*Solanum tuberosum* L.**E. carotovora** (Jones) Holl.*Amorphophallus konjac* K. Koch.*Beta vulgaris* L.*Brassica chinensis* L.*B. oleracea* L.*B. oleracea* L. var. *gongylodes* L.*B. pekinensis* Rupr.*Cichorium endivia* L.*Cymbidium ensifolium* Sw.*Dahlia variabilis* Desf.*Daucus carota* L.*Lycopersicum esculentum* Mill.*Raphanus sativus* L.*Solanum tuberosum* L.

- Erwinia tracheiphila** (Smith) Holl.
Cucumis sativus L.
- Oospora citri-aurantii** (Ferr.) Sacc.
 et Syd.
Citrus deliciosa Tenore
C. grandis Osb.
C. lemon (Burm. f.) Tanaka
 var. *eureka*
C. nobilis Lour.
C. poonensis Tanaka
C. sinensis (L.) Osb.
C. sp.
- O. lactis** Fr. var. *parasitica*
 Pritch. et Porte
Lycopersicum esculentum
 Mill.
- O. scabies** Thaxter
 (参看 *Actinomyces scabies*
 (Thaxt.) Gussow)
- Phylobacter lycopersicum** Groe.
Lycopersicum esculentum
 Pers.
- Pseudomonas andropogoni** (Smith)
 Stapp
Sorghum vulgare Pers.
Zea mays L.
- P. angulata** (Fromme et Murr.)
 Holl.
Nicotiana tabacum L.
- P. apii** Jagg.
Apium graveolens L.
- P. aptata** (Brown et Jamies.)
 Stev.
Beta vulgaris L. var. *rapacea*
 Koch.
- P. atrofaciens** (McCul.) Stev.
Triticum aestivum L.
- P. cichorii** (Sw.) Stapp.
Cichorium intybus L.
Nicotiana tabacum L.
- P. coronafaciens** (Ell.) Stapp
Avena sativa L.
- P. eriobotryae** (Takim.) Dowson
Eriobotrya japonica Lindl.
- P. fabae** (Yu) Burkh.
Vicia faba L.
- P. gladioli** Sever.
Gladiolus gandavensis van
 Houtt.
- P. glycinea** Coerp.
Glycine max (L.) Merr.
- P. glycinea** Coerp. var. *japonica*
 (Takim.) Bergey et al.
Glycine max (L.) Merr.
- P. helianthi** (Kawam.) Salv.
Helianthus annuus L.
- P. indicola** (Takim.) Stapp
Iris tectorum Max.
- P. lachrymans** (Smith et Bryan)
 Carsn.
Cucumis melo L.
C. sativus L.
Cucurbita moschata Duch.
C. moschata Duch. var. *toonas*
 Mak.
C. pepo L.
Lagenaria siceraria (Molina)
 Stanley
Luffa acutangula Roxb.
- P. maculicola** (McCul.) Stev.
Brassica albo-glabra Bail.
B. chinensis L.
B. juncea L.
B. hapsus L.
B. oleracea L.
B. oleracea L. var. *gongylodes*
 L.
B. rapa L.
B. sp.
Raphanus sativus L.
- P. marginalis** (Brown) Stev.
Lactuca sativa L.
 L. sp.
- P. medicagenis** Sack.
Medicago sativa L.
- P. mori** (Boyer et Lamb.) Stev.
Morus alba L.
- P. panicis-miliacei** (Ikata et
 Yamauchi) Sav.
Panicum miliaceum L.
- P. sesami** Malkoff.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
- P. setariae** (Okabe) Sav.
Setaria italica Beauv.
- P. syringae** van Hall
Fortunella crassifolia Sw.
Hibiscus sp.
Melilotus indica (L.) Allesch.
M. sp.
Sorghum vulgare Pers.

Pseudomonas tabaci (Wolf et Forster) Stev.

Nicotiana rustica L.

N. tabacum L.

P. tomato (Okabe) Breed et al.
Lycopersicum asculentum Mill.

P. viciae Uyeda
Vicia faba L.

P. sp.
Canavalia sp.
Capsicum annuum L.
C. annuum L. var. *grossum* Bail.

Castanea sp.

Citrus sinensis (L.) Osb.

Fagopyrum vulgare Hill.

Juglans regia L.

Malus pumila Mill.

Punica granatum L.

Pyrus sp.

Ricinus communis L.

Sagittaria sagittifolia L.

Sesamum indicum L.

Vicia faba L.

Streptomyces scabies (Thaxt.)

Waksm. et Henr.

Solanum tuberosum L.

Xanthomonas alfalfae (Rik., Jones et Dav.) Dowson

Medicago sativa L.

X. antirrhini (Takim.) Dowson
Antirrhinum majus L.

X. begoniae (Takim.) Dowson
Begonia evansiana Andr.

X. campestris (Parn.) Dowson
Brassica campestris L. var. *oleifera* Diels.

B. oleracea L.

B. oleracea L. var. *capitata* L.

B. pekinensis Rupr.

B. rapa L.

B. sp.

Raphanus sativus L.

X. citri (Hasse) Dowson
Citrus aurantifolia Sw.
C. aurantium Linn.
C. deliciosa Tenore
C. erythrosa (Hort.) Tanaka
var. *chu-sha*

C. grandis Osb.

C. hotokan Hay.

C. junos Tanaka

C. lemon (Burm. f.) Tanaka

C. lemon (Burm. f.) Tanaka
var. *eureka*

C. limonia Osb.

C. medica L.

C. medioglobosa (Hort.)
Tanaka

C. microcarpa Bge.

C. nobilis Lour.

C. poonensis Tanaka

C. sinensis (L.) Osb.

C. sinensis (L.) Osb. var.
brassiliensis Tanaka

C. suhoiensis Tanaka

C. sunki Sakurai

C. tankan Hay.

C. unshiu Marc.

C. weberi

C. sp.

Fortunella crassifolia Sw.

Poncirus trifoliata Raf.

X. holcicola (Ell.) Starr.
Sorghum vulgare Pers.

X. juglandis (Pierce) Dowson
Juglans regia L.

X. leersiae Fang et al.
Leersia hexandra Swartz.
L. oryzoides Swartz. var.
japonica Hack.

X. nigromaculans (Takim.)
Dowson

Arctium lappa L.

Daucus carota L.

Dioscorea japonica Thunb.

X. oryzae (Uyeda et Ishiy.)
Dowson

Oryza sativa L.

X. oryzicola Fang et al.
Oryza sativa L.

X. malvecearum
(Smith) Dowson

Gossypium arboreum L.

G. barbadense L.

G. herbaceum L.

G. hirsutum L.

G. sp.

X. nakatae (Okabe) Dowson
Corchorus capsularis L.

- Xanthomonas pelargonii** (Brown) Starr. et Burkh.
Pelargonium hortorum Bail.
- X. phaseoli** (Smith) Dowson
Phaseolus mungo L.
P. radiatus L. var. *aurea* Prain.
P. radiatus L. var. *typicus* Prain.
P. vulgaris L.
Pisum sativum L.
Vigna sinensis Endl.
- X. phaseoli** (Smith) Dowson var. *sojense* (Hedges) Starr. et Burkh.
Glycine max (L.) Merr.
Phaseolus vulgaris L.
- X. pruni** (Smith) Dowson
Prunus armeniaca L.
P. cerasus L.
P. domestica Linn.
P. manshurica Koehne.
P. persica Stokes
P. pseudocerasus Lindl.
P. salicina Lindl.
- X. ricinicola** (Ell.) Dowson
Perilla frutescens (L.) Brit.
Ricinus communis L.
Sesamum indicum L.
- X. solanacearum** (Smith) Dowson
Arachis hypogaea L.
Benincasa hispida Cogn.
Capsicum annuum L.
C. frutescens L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicotiana tabacum L.
Ricinus communis L.
Sesamum indicum L.
S. orientale L.
Solanum melongena L.
S. tuberosum L.
- X. translucens** (Jones, John et Reddy) Dowson
Hordeum vulgare L.
Triticum aestivum L.
- X. vesicatoria** (Doidge) Dowson
Capsicum annuum L.
C. annuum L. var. *longum* Sendt.
Lycopersicum esculentum Mill.
- X. vignicola** Burkh.
Vigna sinensis Endl.
- X. vitians** (Brown) Starr. et Weiss.
Lactuca sativa L.
- X. zingiberi** (Uyeda) Sal.
Brassica sp.
Zingiber officinale Rosc.

病 毒

Arachis virus 1

Arachis hypogaea L.

Brassica virus 1

Brassica chinensis L.

B. oleracea L. var. *capitata* L.

B. pekinensis Rupr.

B. rapa L.

B. virus 2

Brassica chinensis L.

B. juncea L.

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

B. virus 4

Brassica chinensis L.

Callistephus virus 1

Apium graveolens L.

Cucumis virus 1

Brassica chinensis L.

B. juncea L.

B. oleracea L. var. *gongylodes* L.

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

Cucumis sativus L.

Cucurbita moschata Duch.

C. pepo L.

Lagenaria siceraria (Molina) Stanley

Lycopersicum esculentum Mill.

Spinacia oleracea L.

Vigna sinensis Endl.

Delphinium virus 1

Cucumis sativus L.

Lycopersicon virus 1

Lycopersicum esculentum Mill.

L. virus 3

Lycopersicum esculentum Mill.

Chrysanthemum sp.

Lycopersicum esculentum Mill.

Vicia faba L.

L. virus 6

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicotiana virus 1

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicotiana rustica L.

N. tabacum L.

Solanum melongena L.

N. virus 12

Nicotiana rustica L.

N. tabacum L.

Oryza virus 1

Oryza sativa L.

Phaseolus virus 1

Phaseolus mungo L.

P. vulgaris L.

P. virus 2

Phaseolus vulgaris L.

Soja virus 1

Glycine max (L.) Merr.

Solanum virus 1

Nicotiana tabacum L.

Solanum tuberosum L.

S. virus 2

Nicotiana tabacum L.

Solanum tuberosum L.

S. virus 3

Solanum tuberosum L.

S. virus 4

Solanum tuberosum L.

S. virus 9

Solanum tuberosum L.

S. virus 12

Solanum tuberosum L.

S. virus 14

Solanum tuberosum L.

S. virus 15

Solanum tuberosum L.

Zea virus 1

Sorghum vulgare Pers.

Zea mays L.

Z. virus 2

Zea mays L.

Complex of Solanum virus 1 and

Nicotiana virus 1

Lycopersicum esculentum Mill.

Complex of Solanum virus 1 and

Solanum virus 2

Solanum tuberosum L.

線 虫

Anguillulina tritici (Steinb.) G. et B.

Triticum aestivum L.

A. sp.

Setaria italica Beauv.

Aphelenchoides oryzae Yokoo

Oryza sativa L.

Heterodera radicum (Greef.) Cobb.

Cobb.

Corchorus capsularis L.

Lycopersicum esculentum Mill.

H. **schachtii** A. Schmidt.

Arachis hypogaea L.

Brassica juncea L.

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

Citrullus vulgaris Schrad.

Colocasia esculenta Schott.

Cucumis melo L.

C. sativus L.

Cucurbita maxima L.

Dolichos lablab L.

Glycine max (L.) Merr.

Gossypium sp.

Ipomoea batatas (L.) Poir.

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicotiana tabacum L.

Phaseolus aureus Roxb.

P. vulgaris L.

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L.

Setaria italica Beauv.

Solanum melongena L.

S. tuberosum L.

Sorghum vulgare Pers.

Triticum aestivum L.

Zea mays L.

Meloidogyne sp.

Abelmoschus esculentus L.

Ageratum conyzoides L.

Allium cepa L.

Apium graveolens L.

Arachis hypogaea L.

Beta vulgaris L.

Brassica albo-glabra Bail.

B. juncea L.

B. pekinensis Rupr.

B. sp.

Canavalia gladiata DC.

Carica papaya Linn.

Catalpa sp.

Citrullus vulgaris Schrad.

Colocasia esculenta Schott.

Cucumis melo L.

C. sativus L.

C. sp.

Cucurbita maxima Duch.

C. maximum L.

Daucus carota L. var. *sativa* DC.

Dolichos lablab L.

Gossypium sp.

Ipomoea batatas (L.) Poir.

I. reptans (Linn.) Poir.

Lactuca sativa L.

Lycopersicum esculentum Mill.

Morus alba L.

Nicotiana tabacum L.

Oxalis martiana Zucc.

Petroselinum hortense Hoffm.

Phaseolus aureus Roxb.

P. vulgaris L.

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L.

Setaria italica Beauv.

Solanum melongena L.

S. tuberosum L.

Sorghum vulgare Pers.

Spinacia oleracea L.

Triticum aestivum L.

Vigna sinensis Endl.

Viola sp.

Zea mays L.

Pratylenchus pratensis (De Man)

Filipjev.

Solanum tuberosum L.

Tylenchulus semipenetrans Cobb

Citrus erythroa

(Hort.) Tanaka

C. grandis Osb.

C. limonia Osb.

C. microcarpa Bge.

C. nobilis Lour.

C. sinensis (L.) Osb.

Fortunella sp.

T. **tritici** Needh.

Secale cereale L.

寄生种子植物

Balanophora sp.

Quercus sp.

Cuscuta chichymum L.

Rumex sp.

C. chinensis Lamb.

Glycine max (L.) Merr.

C. epilinum Weihe

Linum usitatissimum L.

C. japonica Choisy

Acer buergerianum Miq.

A. sp.

Achyranthes bidentata Bl.

Actinostemma lobatum Max.

var. *racemosum* Max.

Agropyron semicostatum Nees

Akebia quinata Decne.

Alangium platanifolium

Harms.

Albizzia julibrissin Dur.

Allium nipponicum Fr. et Sav.

Amaranthus caudatus L.

A. mangostanus L.

A. spinosus L.

Aphanathe aspera (Fh.) Pl.

Artemisia capillaris Thunb.

A. japonica Thunb.

A. vulgaris L.

A. vulgaris L. var.

parviflora Max.

Asteromaea sp.

Boehmeria nivea Gaud.

B. platanifolia Fr. et Saw.

Bromus japonicus Thunb.

Broussonetia kaempferi Sieb.

Bupleurum falcatum L.

Callicarpa japonica Thunb.

C. sp.

Carpesium abrotanoides L.

Celtis sinensis Bge.

Chionanthus retusus Lindl.

Cirsium japonicum DC.

Cocculus trilobus DC.

Columella japonica

(Willd.) Merr.

Cryptotaenia japonica Hassk

Cudrania triloba Hance

Dalbergia hupeana Hance

Desmodium caudatum

(Thunb.) DC.

Echinocloa crus-galli

(L.) Beauv. subsp.

submutica Honda

Eupatorium chinensis L.

E. japonicum Thunb.

Evonymus alata Regel.

E. europaea L. var.

hamiltoniana Max.

Flueggea capillipes Pax.

Fraxinus bungeana DC.

Gardenia jasminoides Ell.

Hemiptelea davidii Planch.

Hibiscus sylvestris L.

Humulus japonicus

Sieb. et Zucc.

Imperata cylindrica

(Linn.) Beauv.

Koelreuteria integrifoliola

Merr.

Ligustrum vulgare L.

Liquidambar formosana Hance

Lycoris radiata Herb.

Mahonia repandus Muell.-Arg.

Miscanthus sinensis Anders.

Nelumbo nucifera Gaertn.

Perilla ocimoides L.

Peucedanum decursivum Max.

Phyllostachys quilioi Rir.

Polygonum cuspidatum

Sieb. et Zucc.

Populus alba L.

P. sp.

Prunus persica Stokes

Pterocarya stenoptera DC.

Pueraria thunbergiana Benth.

Rhus semilata Murr.

R. sylvestris Sieb. et Zucc.

Rosa acicularis Lindl.

R. multiflora Thunb.

Rubus lambertianus Ser.

R. parvifolius L.

Salix babylonica L.

S. wilsonii Seem.

S. sp.

Cuscuta japonica Choisy*Sasa albo-marginata*

Mak. et Shib.

Saururus loureiri Decne.*Saussurea affinis* Spreng.

S. sp.

Thea sinensis L.*Torilis anthriscus* Gmel.*Vitex trifolia* L.*Xylosma congestum*

(Lour.) Merr.

Zanthoxylum alatum Roxb.

Z. sp.

C. major Choisy*Salix* sp.**C. sp.***Citrus* sp.*Clematis* sp.*Salix* sp.**Elytranthe ampullacea** Don.*Aleurites fordii* Hemsl.*Artocarpus integra* Merr.**E. biracteolata** (Hance) le Comte*Cunninghamia lanceolata*

(Lamb.) Hk.

E. bibracteolata (Hance) leComte var. *sinensis* le Comte*Castanea mollissima* Bl.*Cinnamomum camphora*

Nees et Ebern.

E. fordii (Hance) Merr.*Camellia* sp.*Castanea mollissima* Bl.*Celtis sinensis* Pers.*Hovenia dulcis* Thunb.*Liquidambar formosana*

Hance

Xylosma congestum

(Lour.) Merr.

Loranthus chinensis DC.*Eucalyptus tereticornis* Smith*Hevea brasiliensis* Muell.-

Arg.

Pinus massoniana Lamb.*Xylosma congestum* (Lour.)

Merr.

L. maclurei Merr.*Cladrastis platycarpa*

(Max.) Mak.

Loropetalum chinense Oliv.*Ulmus parvifolia* Jacq.**L. parasiticus** (Linn.) Merr.*Acacia richii* A. Br.*Adina rubella* Hance*Alangium platanifolium*

Harms

Albizzia julibrissin Dur.*Bauhinia championi* Benth.*Bischofia trifoliata* Hook.*Broussonetia papyrifera*

L.-Herit

Camellia oleifera Abel*Castanea mollissima* Bl.*Castanopsis cuspidata*

Schottk.

Celtis sinensis Pers.*Citrus deliciosa* Tenore*C. grandis* Osb.*C. grandis* Osb. var.*shatinyu* Hort.*C. medica* L.*C. sinensis* (L.) Osb.*Cladrastis platycarpa*

(Max.) Mak.

Clausena lansium

(Lour.) Skeels

Cudrania tricuspidata Bur.*Diospyros kaki* L.*Euphoria longana* Lam.*Firmiana simplex* Wight*Fraxinus chinensis* Roxb.*Gleditschia sinensis* Lam.*Hevea brasiliensis*

Muell.-Arg.

Hibiscus syriacus Linn.*Ilex cornuta* Lindl.*I. rotunda* Thunb.

I. sp.

Lagerstroemia indica L.*Ligustrum lucidum* Ait.*L. sinense* Lour.*Liquidambar formosana*

Hance

Magnolia grandiflora Linn.*Morus alba* L.*Nerium indicum* Mill.*Osmanthus fragrans* Lour.*Paulownia fortunei*

(Seem.) Hemsl.

Populus pyramidalis Borkh.*Prunus persica* Stokes

Loranthus parasiticus (Linn.)

Merr.

- P. salicina* Lindl.
Pterocarya stenoptera DC.
Punica granatum L.
Pyrus serotina Rehd.
Quercus glauca Thunb.
Rhus verniciflua Stokes
Rosa laevigata Michx.
Salix babylonica L.
S. matsudana Koidz.
Sophora japonica L.
Trema orientalis Bl.
Ulmus parvifolia Jacq.
Wistaria sp.
Xylosma congestum
 (Lour.) Merr.
Zanthoxylum alatum Roxb.
 var. *planispinum*
 Rehd. et Wils.
Zizyphus sativa Gaertn.
- L. sampsoni** Hance
Camellia oleifera Abel
- L. yadoriki** Sieb.
Alnus cremastogyne Burk.
Bauhinia championi Benth.
Camellia oleifera Abel
Castanea mollissima Bl.
Cinnamomum camphora
 Nees et Ebern.
Citrus sp.
Diospyros kaki L. var.
silvestris Mak.
Ligustrum compactum
 Hook et Thoms.
L. robustum Bl.
Liquidambar formosana
 Hance

Paulownia fortunei

(Seem.) Hemsl.

- Populus simonii* Carr.
Psidium guayava L.
Pterocarya stenoptera DC.
Pyrus serotina Rehd.
P. sp.
Quercus acutissima Carr.
Q. glauca Thunb.
Q. serrata Thunb.
Salix babylonica L.
S. bockii Seem.
Spondias axillaris Roxb.
Ulmus parvifolia Jacq.

L. sp.

- Citrus poonensis* Tanaka
C. tangerina Tanaka
C. sp.

Orobanche sp.*Miscanthus* sp.**Phoradendron sp.***Acer* sp.

Cinnamomum camphora
 Nees et Ebern.

Viscum album Mistel.*Populus* sp.*Pterocarya stenoptera* DC.**V. angulatum** Heyne.

Aleurites fordii Hemsl.
Hevea brasiliensis
 Muell.-Arg.
Hovenia dulcis Thunb.

V. articulatum Birm. f.

Aleurites fordii Hemsl.
Liquidambar formosana
 Hance


V. japonicum Thunb.*Castanea mollissima* Bl.

其 它

Cephaeleuros virescens Kunze.*Adinandra chingii* Metcalf.*Canarium album* Raeusch.*Castanea molliissima* Bl.*Cinnamomum cassia* Blume*Diospyros kaki* L.*Eugenia jambos* Linn.*Euphoria longana* Lam.*Litchi chinensis* Sonn.*Lithocarpus uvariifolia*

(Hance) Rehd.

Mangifera indica L.*Michelia figo* (Lour.) DC.*Persea gratissima* Gaertn.*Psidium guayava* L.**C. virescens** Kunze.*Thea drupifera* Pierre*T. sinensis* L.**Pleurococcus** sp.*Mangifera indica* L.**Eriophyes piri** Nal.*Pyrus bretschneideri* Rehd.*P. communis* L.*P. sinensis* Lindl. var.*culta* Mak.*P. ussuriensis* Max.*P. sp.***E. vitis** Nal.*Vitis amurensis* Rupr.*V. labrusca* L.*V. vinifera* L.*V. sp.*



引 用 文 献

- [1] 卜蕙华, 1949. 山西中南部作物調查簡报. 华北农业科学研究所工作通訊, 1(3):8—9.
- [2] ———.
- [3] 广东制糖工业公司甘蔗試驗場. 1954. 广东珠江三角洲順德县区甘蔗病害調查. 甘蔗試驗研究所工作總結报告.
- [4] 广州市农事处. 1954. 广州市郊 1953 年早稻白叶枯病調查. 植物保护通訊, 1954. 3:18—21.
- [5] 山西省农业科学研究所. 1955. 山西省馬鈴薯晚疫病調查报告. 杂粮作物病虫害防治参考資料.
- [6] 王云章. 1938. *Les Puccinia des Smilax de Chine*. (中国菝葜屬上的锈病菌). *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2:522—525.
- [7] ———. 1949. *Uredinales of Shensi*. (陕西之锈菌). *Contr. Inst. Bot., Nat. Acad. Peiping*, 6:221—232.
- [8] 王兆泰. 1934. 民国 23 年 4 月杭州重要植物发病記載. 昆虫与植病, 2:531—536, 552—561, 576—580.
- [9] 王清和. 1945. 福建之茶树病害(一). 协大农报, 6:59—68.
- [10] ———. 1947. 福建栽培植物病害名录. 福建省农事試驗場病虫害系. (未发表).
- [11] ———. 1954. 山东果树病害調查簡报. 中国植物病理学会会訊, 9—10:62—67.
- [12] 王就光. 1953. 广东潮汕柑桔病害調查. 新科学, 1953. 2:38—41.
- [13] 王鸣岐. 1950. 河南植物病害名录. 华北农业科学研究所研究专刊, 2:1—23.
- [14] 王銘新. 1932. 山东省立第一农事試驗場病虫害部試驗报告. 1—48.
- [15] ———. 1937. 莱阳梨病虫害初步調查报告. 中华农学会报, 162:27—42.
- [16] 仇元. 1955. 西安夏季蔬菜病害調查摘要. 中国植物病理学会会訊, 11—12:56—63.
- [17] 方中达, 陈迺用. 1951. 南京近郊的黃麻病害. 中国植物病理学会会訊, 1—5:30.
- [18] ———, 刘繆芬, 张明厚, 沈淑琳. 1956. 陽山梨树的腐烂病. 华东农业科学通报, 1956. 4:232—234.
- [19] ———. 袁賢熔, 李传道, 王开明. 1956. 银杏茎腐病的防治試驗植物病理学报, 2:43—54.
- [19a] ———. 任欣正, 陈泰英, 朱有钰, 范恆忠, 伍尙忠. 1957. 水稻白叶枯病及条斑病和李氏禾条斑病原細菌的比較研究. 植物病理学报, 3:99—124.
- [20] 邓叔羣. 1933. *Fungi of Peiping I*. (北平真菌之記載, 一) *Bull. Fan. Mem. Inst. Biol.*, 4:279—290.
- [21] ———. 1934. *Notes on Hysteriales from China*. (中国纵裂菌志略). *Sinensia*, 4:129—144.
- [22] ———. 1934. *Notes on Sphaeriales from China*. (中国黑壳菌志略). *Sinensia*, 4:259—433.
- [23] ———. 1934. *Notes on Hypocreales from China*. (中国赤壳菌志略). *Sinensia*, 4:269—298.
- [24] ———. 1934. *Notes on Polyporaceae from China*. (中国多孔菌志略). *Sinensia*, 5:173—224.

- [25] 邓叔羣. 1934. Notes on Discomycetes from China. (中国盘果菌志略). *Sinensia*, 5:431—465.
- [26] ———. 1935. Supplementary notes on Ascomycetes from China. (中国囊菌杂录). *Sinensia*, 6:185—220.
- [27] ———. 1936. Additional fungi from China, I. (中国真菌續志, 一). *Sinensia*, 7:212—265.
- [28] ———. 1936. Additional fungi from China, II. (中国真菌續志, 二). *Sinensia*, 7:490—527.
- [29] ———. 1936. Additional fungi from China, V. (中国真菌續志, 五). *Sinensia*, 7:752—818.
- [30] ———. 1938. Additional fungi from China, VIII. (中国真菌續志, 八). *Sinensia*, 9:219—258.
- [31] ———. 1939. Studies of the Hunba forest. (西康龙县洪坝森林). *Sinensia*, 10:249—268.
- [32] ———. 1939. A contribution to our knowledge of the higher fungi of China. (中国高等菌类誌). *Nat. Inst. Zool. and Bot. Acad. Sinica*, 1—614.
- [33] ———. 1940. Supplement to higher fungi of China. (中国真菌补志). *Sinensia*, 11:105—130.
- [34] ———. 1940. Studies of Chinese timber trees in reference to forest management, I. [我国天然林管理法之研究(一)]. *Sinensia*, 11:363—395.
- [35] ———. 1947. Additions to the Myxomycetes and the Carpomycetes of China. (中国粘菌及真菌补遺). *Bot. Bull. Acad. Sinica*, 1:25—44.
- [36] ———, 欧世璠. 1937. Additional fungi from China, VI. (中国真菌續志, 六). *Sinensia*, 8:227—296.
- [37] ———, ———. 1938. Diseases of economic plants in China, I. (中国经济植物之病害, 一). *Sinensia*, 9:181—217.
- [38] 邓煜生. 1954. 防治水稻恶苗病的几个技术问题. 植物保护通訊, 1954, 3:3—5.
- [39] 尹華耘. 1953. 松类幼苗立枯病的研究. 农业学报, 3, 4:293—319.
- [40] ———. 1954. 棉花黄萎病. 中国科学院.
- [41] ———. 1956. 棉花茎枯病. 农业科学通訊, 1956, 6:374—376.
- [42] 中国植物病理学会南京分会. 1951. 各地病情简报, 华东麦病简报. 中国植物病理学会会訊, 1—5:22—23.
- [43] 中南农业科学研究所, 湖北省农业厅. 1955. 黄崗专区水稻发瘠调查报告摘要. 植物保护通訊, 1955, 7:1—4.
- [43a] 白金鑑. 1957. 中国东北霜霉菌. 植物病理学报, 3:137—154.
- [44] 叶飞. 1955. 甘肅馬鈴薯病害調查简报. 中国植物病理学会会訊, 11—12:63—70.
- [45] 叶鸣高. 1943. 崇安茶树煤病之初步調查及鑑定. 福建农业, 3:110—118.
- [46] 北京农业大学, 兴城园艺試驗場. 1956. 苹果锈果花脸病研究(总结报告). (油印文件).
- [47] ———. 1927. 中国植物病菌所見. 中华农学会报, 54:23—43.
- [48] ———. 1932. 杭产蘆锈所見. 新农业, 2:1—8.
- [49] ———. 1933. 中华民国 21 年浙江省植病概况之回顾. 昆虫与柞病, 1:32—40.
- [50] ———. 1933. Notes on the presence of *Sclerotinia miyabeana* in Chiaa with special reference to the comparison of this fungus with *Sclerotinia*

- arachidis*. (*Sclerotinia miyabeana* 于我国境内之发现并其与 *S. arachidis* 之比較研究). 浙江省昆虫局 1932 年年刊 :1—58.
- [51] 朱凤美. 1935. 民国24年秋考查冀、鲁、苏、皖铁路沿线各地植病見聞录. 农报, 2:1293—1304.
- [52] ———. 1945. 小麦綫虫病之分布及其重要性(二). 农业推广通訊, 7(9):36—44.
- [53] ———, 朱恒紀. 1944. 贵州省境之麦病及其防治. 武汉大学理科季刊, 8(2):1—12.
- [54] ———, 严錦兰. 1934. 1934 年浙江省春季重要作物病害之一班. 农报, 1:281—284.
- [55] 朱学曾. 1934. 1932 年中国植产輸入日本檢得之病虫害名录. 昆虫与植病, 2:273—375.
- [56] ———. 1947. 台湾蔗病之見知. 台湾省糖业試驗所病理科. (油印本).
- [57] 朱健人. 1941. 西康植病所見. 中华自然科学社西康科学考察团报告书, 农林組 :93—115.
- [58] 朱暢功. 1951. 各地病情簡报. 内蒙病情簡报. 中国植物病理学会会訊, 1—5:11—13.
- [59] 刘汉文. 1955. 陝南君子蚕豆之死亡原因与今后防治意見摘要. 中国植物病理学会会訊, 11—12:76—80.
- [59a] 刘存信. 1957. 水稻干尖綫虫病. 植病知識, 1(3):27—30.
- [60] 刘克济, 邵力平. 1950. 哈尔滨附近的真菌类. 哈农学报, 1:121—128.
- [61] 刘慎謩. 1931. Note sur un *Microsphaera* du *Quercus*. (寄生于櫟樹之 *Microsphaera*). *Contr. Lab. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 1:19—22.
- [62] 刘慎謩, 王云章. 1934. Materials for study on rusts of China, I. (研究中国銹菌之材料, 其一). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 2:151—164.
- [63] ———, ———. 1935. Materials for study on rusts of China, II. (研究中国銹菌之材料, 其二). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 3:17—40.
- [64] ———, ———. 1935. Materials for study on rusts of China, III. (研究中国銹菌之材料, 其三). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 3:347—363.
- [65] ———, ———. 1935. Materials for study on rusts of China, IV. (研究中国銹菌之材料, 其四). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 3:403—411.
- [66] ———, ———. 1935. Materials for study on rusts of China, V. (研究中国銹菌之材料, 其五). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 3:433—451.
- [67] ———, ———. 1936. Materials for study on rusts of China, VI. (研究中国銹菌之材料, 其六). *Chinese Jour. Bot.*, 1:69—82.
- [68] 刘經芬, 方中达. 1956. 南京牧草試栽中病害的觀察. 南京农学院学报, 1956, 1:9—15.
- [69] 刘錫璣. 1948. Seed-borne diseases of soybean. (种子传播之大豆病害). *Bot. Bull. Acad. Sinica*, 2:69—80.
- [70] 江彦亭. 1953. 山东省小麦丸网腥黑穗病分布情况簡报. 中国植物病理学会会訊, 6—8:100.
- [71] 过崇俭, 罗张. 1951. 1950年华东棉作病害概况. 华东农业科学研究所工作通訊, 2(1):1—4.
- [72] 江苏省杂谷試驗場. 1954. 江苏省甘薯貯藏及黑斑病調查. 华东区农业技术会議資料汇编, 第2輯:26—30.
- [73] ———. 1951. 各地病情簡报. 川西病情簡报. 中国植物病理学会会訊, 1—5:19—21.
- [74] 西南农业科学研究所. 1956. 重庆市附近馬鈴薯綫虫病調查研究工作簡报. 西南农业科学.

- [75] 西南农学院植物保护系,植物病理教研组. 1954. 四川植物病害标本名录. (未发表).
- [76] 华南垦殖局, 华南热带林业科学研究所. 1954. 中国科学院华南工作队植病分队 1954 年上半年度工作总结. 上册: 1—22, 下册: 1—12. (油印本).
- [77] 何文俊, 余永年, 向登仁. 1951. 除虫菊根腐病研究初步报告. 中国农业研究, 2:93—106.
- [78] 何畏冷. 1935. 广东甘蔗病害汇志. 岭南农刊, 1(3):53—101.
- [79] ———. 1935. 广东果树病害汇志, (一). 岭南农刊, 1(4):1—86.
- [80] ———. 1936. 广东果树病害汇志, (二). 岭南农刊, 2(1):35—104.
- [81] ———. 1937. 广东果树病害汇志, (三). 岭南学报, 3(1):1—54.
- [82] ———, 李来荣. 1936. Preliminary note on the virus diseases of some economic plants in Kwangtung province. (广东数种实用植物毒素病之初步记载). *Lingnan Sci. Jour.*, 15:67—78.
- [83] 吴友三. 1936. 小麦病害调查报告. 农报, 3:1835—1839.
- [84] ———. 1938. 小麦病害调查报告(其二). 农林新报, 15(28—29):24—30.
- [85] ———. 1938. 小麦病害调查报告(其三). 农林新报, 15(30—31):1—12.
- [86] ———, 朱有虹. 1956. 玉米干腐病发现简报. 沈阳农学院学报, 1956, 1:129—130.
- [87] 吴昌济. 1940. 浙东茶树之重要病害. 浙江农业, 22—25:58—66.
- [88] 吴治身. 1956. 新疆已知的主要作物的主要真菌病害. (1953—1955 年的初步了解). (未发表).
- [88a] ———. 1957. 瑪納斯河流域国营军垦农场 1954 年棉花角斑病的初步调查. 植病知识, 1(1):21—24.
- [89] 陈其保, 邱瑞珍. 1945. 漳州柑桔之病害(第一次报告). 福建省研究院动植物研究所研究汇报, 1:77—84.
- [90] 余永年. 1953. 水稻种子寄藏真菌的初步分析. 农业学报, 4:139—153.
- [91] ———. 1956. 四川植物真菌性病害名录补遗. (未发表).
- [92] 余茂助. 1937. 烟草炭疽病防除试验. 山东省建设所烟草改良场研究报告, 第 1 号: 1—15.
- [93] ———. 1939. 成都平原烟草病害调查报告. 农林新报, 16, 32—36:6—10.
- [94] ———, 戴垣, 束鸿烈. 1955. 烟草黑胥病防治工作初步总结. 中国植物病理学会会讯, 11—12:46—55.
- [95] 邱玉怀. 1955. 青岛郊区作物根结病线虫调查报告. 中国植物病理学会会讯, 11—12:81—89.
- [96] 毕志树. 1956. 熊岳果树病害调查. 沈阳农学院学报, 1956, 1:63—88.
- [97] 吕国植. 1939. 稻粒上通常发现的几种真菌. 农林新报, 16, 32—36:41—44.
- [98] 李来荣. 1935. A preliminary report on the occurrence of *Tylenchulus semi-penetrans* Cobb. in the roots of *Citrus* nursery plants of South China. (中国南部柑桔苗木之根线虫). *Lingnan Sci. Jour.*, 14:331—333.
- [99] ———. 1955. 龙眼树的病毒病害的初步研究. 植物病理学报, 1:211—216.
- [100] ———, 李德铨. 1938. Notes on *Heterodera marioni* as root parasites in some Kwangtung economic plants and weeds. (广东经济植物和杂草的根线虫). *Lingnan Sci. Jour.*, 17:533—537.
- [101] 李明. 1951. 各地病情简报. 山东今年上半年病情简报. 中国植物病理学会会讯, 1—5:15—18.
- [101a] 李铁肩. 1957. 花生的细菌性青枯病. 华南农业科学, 1957, 4:36—38.
- [101b] 李振岐, 刘汉文. 1957. 陕甘青小麦条锈病发生发展规律之初步研究. 西北农学院学报, 1957, 1:33—45.

- [102] 沈其益. 1932. Species of *Pestalozzia* and *Monochaetia* in China, I. (中国二属半知菌之研究). *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot.*, 7:131—141.
- [103] ———. 1932. Fungi of Nanking, IV. (南京真菌誌, 四). *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot.*, 8:153—161.
- [104] ———. 1934. Notes on Ustilaginales from China. (中国黑粉菌誌略) *Sinensia*, 4:299—320.
- [105] ———, 周脉增. 1937. 中国棉病調查报告(民国 23—25 年). 中央棉产改进所丛刊, 第 2 号: 1—128.
- [106] 邹鍾琳. 1922. 南京植物病菌名录. 科学, 7:184—195.
- [107] 林孔湘. 1943. Convex gum, a new disease of citrus in China. (中国柑桔一种新病害: 胶肿病). *Phytopathology*, 33:394—397.
- [108] ———. 1944. Algal leaf blotch of tea. (茶树藻斑病). *Lingnan Univ. Coll. Agr. Tech. Bull.*, 1:1—6.
- [109] ———. 1947. Observations on citrus diseases in China. (中国柑桔病害之观察). *Plant Dis. Repr.*, 31:107—111.
- [110] ———. 1956. 柑桔黄梢(黄龙)病研究. I. 病情調查; II. 关于病原的探討. 植物病理学报, 2:1—12; 13—42.
- [111] 林亮东. 1942. 云南潞江县农作物病害之概况. 农声, 222:12—19.
- [112] ———, 黎毓干. 1949. 滇湘桂粤之农作物病害. 农声, 232:20—44.
- [113] 林传光. 1937. 福建重要植物病害简报. 农林新报, 14(12): 347—350.
- [114] 林鏊, 陈青蓮. 1944. 福建产黑粉菌科数种真菌之研究. 福建省研究院研究彙报, 1944: 1—24.
- [115] 周以良. 1955. 中国东北三孢锈菌属的研究. 植物分类学报, 3:369—372.
- [116] 周家熾. 1936. 河北栽培植物病害誌略. 中国植物学杂志, 3:977—1011.
- [117] ———. 1944. 云南棉枯病. 科学农业, 1:258—263.
- [118] ———. 1946. A note on the relation of nematode (*Tylenchus tritici*) to the development of the bacterial disease of wheat caused by *Bacterium tritici*. (小麦线虫病与蜜穗病的关系). *Ann. Appl. Biol.*, 33:446—449.
- [119] ——— and A. E. Jenkins. 1945. *Elsinoe* and *Sphaceloma* diseases in Yunnan, China, particularly hyacinth bean scab and scab of castor bean. (中国云南扁豆、蓖麻及其他植物的疮痂病). *Phytopathology*, 35:339—352.
- [120] 范怀忠, 刘朝祜. 1957. 广东省落花生丛枝病 (Groundnut resette) 初步調查报告. 植病知識, 1:(3):21—25.
- [120a] ———, 柯冲. 1955. 广州及其附近十字花科蔬菜花叶病毒的鑑定. 植物病理学报, 3:155—168.
- [121] 罗清泽. 1941. 邵武城郊植物病害之初步調查研究. 协大农报, 3: 357—369.
- [122] 俞大綬. 1934. Notes on the storage and market diseases of fruits, I. (貯藏中及市場上果实之病害). *Jour. Agr. Assoc. China*, 123:16—27.
- [123] ———. 1934. Notes on the storage and market diseases of fruits, II. *Diplodia* stem end rot of citrus fruits (*Diplodia natalensis* E.) (貯藏中及市場上水果之病害, 其二. 柑桔之 *Diplodia* 蒂腐病). *Jour. Agr. Assoc. China*, 126—127: 171—202.
- [124] ———. 1934. *Pythium* damping off of cucumber. (黃瓜之猝倒病). *Agr. Sinica*, 1:91—106.
- [125] ———. 1935. 本年江苏龙县一带之小麦枯叶病. 昆虫与植病, 3:620.
- [126] ———. 1937. On the occurrence of *Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Eri. et Cav. in broad bean seeds. (蚕豆种子上炭疽病菌的發見). *Bull. Chinese Bot. Soc.*, 3:1—24.

- [127] 俞大綬. 1939. A list of plant viroses observed in China. (中国植物病毒病害名录). *Phytopathology*, 29:459—461.
- [128] ———. 1940. A list of important crop diseases occurring in Kiangsu province (1934—1937). (民国 23—25 年江苏省之作物病害名录). *Lingnan Sci. Jour.*, 19:67—78.
- [129] ———. 1945. The red-spot disease of broad bean (*Vicia faba* L.) caused by *Botrytis fabae* Sardina in China. (中国蚕豆之紅斑病). *Phytopathology*, 35:945—954.
- [130] ———. 1946. A mosaic disease of cowpea (*Vigna sinensis* Endl.) (豇豆之花叶病). *Ann. appl. Biol.*, 33:450—454.
- [131] ———. 1947. *Cercospora* leaf spot of broad bean in China. (中国蚕豆之 *Cercospora* 叶斑病). *Phytopathology*, 37:174—179.
- [132] ———. 1947. Spotted wilt of broad bean. (蚕豆的斑枯病). *Phytopathology*, 37:191—192.
- [133] ———. 1947. *Ascochyta* blight and leaf and pod spot of broad bean in China. (中国蚕豆 *Ascochyta* 叶斑病). *Phytopathology*, 37:207—214.
- [134] ———. 1950. Notes on some weakly parasitic fungi associated with diseased roots of broad bean. (蚕豆根部的弱寄生菌). *Peking Nat. Hist. Bull.*, 18:281—288.
- [135] ———. 1955. 中国镰刀菌属菌种的初步名录. 植物病理学报, 1:1—18.
- [136] ———. 1955. 地瓜黑心病. 植物病理学报, 1:177—182.
- [137] ———, 方中达. 1950. 云南省蚕豆枯萎病和茎腐病的研究, (其一). 科学通报, 1:73—77.
- [138] ———, ———. 1956. 中国植物病原细菌的初步名录. 农业学报, 7:359—363.
- [139] ———, 姜隆后. 1949. A seedling blight of foxtail millet caused by *Fusarium nivale* (Fr.) Ces. var. *setariae* var. nov. (粟的一种新病害——幼苗枯萎病). *Chinese Jour. Agr.*, 1:13—22.
- [139a] ———, 裴美云, 許順根. 1957. 小米紅叶病的研究. I. 紅叶病, 小米的一个新的病毒病害. 植物病理学报, 3:1—18.
- [140] 姜广正. 1953. 华北小麦上的一种秆枯病. 农业学报, 4:198—200.
- [140a] 张志光. 1957. 广东省发现对内植检对象玉米干腐病初报. 植病知識, 1(3):35—37.
- [140b] 张志雍, 郭翼奋. 1957. 玉米穗及秆上玉米干腐病症状的識別和鑑定. 植病知識, 1(3):31—35.
- [140c] 洪若豪. 1957. 福州大量发生馬鈴薯粉痂病. 植病知識, 1(3):37—38.
- [141] 涂治. 1932. Notes on diseases of economic plants in South China. (广东經濟植物病害調查). *Lingnan Sci. Jour.*, 11:489—504.
- [142] 相望年. 1948. Notes on some diseases of proso-millet in North China. (华北黍之病害). *Acta Agr.* 2:69—74.
- [143] 陕西汉中农业試驗站. 1955. 汉中区水稻主要病虫害調查. 西北农业科学技术集刊, 1:43—48.
- [144] 1954. 陕西郿县梨黑星病的防治. 中国植物病理学会会訊, 9—10:71—72.
- [145] 翁心桐, 于成哲, 赵学源, 齐春暄, 张荷生. 1956. 对于柿和君迁子角斑病 (*Cercospora Kaki* Ell. et Ev.) 的研究. 植物病理学报, 2:67—79.
- [146] 凌立. 1932. Enumeration of the fungi in the herbarium of National University of Peking. (北京大学植物标本室之真菌之記載). *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot.*, 8:183—191.

- [147] 凌立. 1933. Studies of the genus *Peria* of China, I. (中国多孔菌中一属之研究, 一). *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot.*, 8:222—232.
- [148] ———. 1945. Aecial hosts of *Puccinia graminis* in China. (中国稈锈病菌的轉主寄主). *Phytopathology*, 35:417—420.
- [149] ———. 1945. A contribution to the knowledge of the Ustilaginales in China. (中国黑粉菌的初步研究). *Imp. Mycol. Inst. Mycol. Pap.* 11:1—12.
- [150] ———. 1948. Host index of the parasitic fungi of Szechuan. (四川寄生真菌寄主索引). *Plant Dis. Repr. Suppl.*, 173:1—38. (金陵学报, 11:117—142, 1941).
- [151] ———. 1949. Taxonomic notes on asiatic smuts, I. (亚洲黑粉菌的分类研究, I). *Sydowia*, 3:123—134.
- [152] ———. 1949. A second contribution to the knowledge of the Ustilaginales of China. (中国黑粉菌之研究, 第二报). *Mycologia*, 41:252—269.
- [153] ———. 1953. The Ustilaginales of China. (中国之黑粉菌). *Farlowia*, 4:305—351.
- [154] ———, 楊演. 1941. 油菜毒素病. 金陵学报, 9:293—304.
- [155] ———, 戴銘傑. 1946. New Peronosporaceae from China. (中国霜霉菌新种). *Lloydia*, 9:144—145.
- [156] 夏禹甸. 1943. 滇省麦病調查及防治經過. 农报, 8:374—381.
- [157] 殷恭毅. 1941. 成都甘薯之主要貯藏病害及其防治之商榷. 农林新报, 18(16—18):28—33.
- [158] 黃齐望. 1955. 1955 年江西境内所发现的几种作物病害. 江西植物保护通訊, 1955, 2:21—28; 3—4:24—28.
- [159] ———, 欧阳諒, 汪英傑. 1955. 江西十字花科根肿病的观察和防治意見. 江西植物保护通訊, 1955, 8:1—4.
- [160] 黃作杰. 1955. 广西地区的桑寄生科植物. 植物病理学报, 1:217—230.
- [161] 黃亮. 1933. A preliminary study on bacterial soft rot of *Brassica pekinensis* and other vegetables in China. (中国結球白菜及其他蔬菜軟腐病之初步研究). *Bull. Coll. Agr. Univ. Nanking*, 33(n. s.).
- [162] ———. 1935. Lima bean anthracnose. (洋扁豆炭疽病). *Nanking Jour.* 5:149—172.
- [163] ———. 1943. 广西柑桔类之病害. 广西农业, 4:27—61.
- [164] 崔伯棠. 1932. 杭州附近所产菟絲子之形态类属及其寄主之种类. 浙江省立病虫害防治所專門报告, 第 4 号: 1—12.
- [165] ———. 1933. 菟絲子数种生理性質之研究. 浙江省昆虫局民国 21 年年刊: 272—286.
- [166] 章祖純. 1916. 北平附近发生最盛之植物病害調查表. 农商部中央农事試驗場第 3 期成績报告: 1—16.
- [166a] 章正. 1957. 东北出口大豆病害調查的初步报告. 植病知識, 1(2):37—41.
- [167] 张翰文. 1951. 各地病情簡报. 察省經濟作物主要病害的基本情况. 中国植物病理学会会訊, 1—5:14—15.
- [168] 清华大学农业研究所病害組. 1937. 民国24—25年度工作报告.
- [169] 曾广然, 王权, 黃桂潮, 何健三, 刘維, 刘淑靜, 张国淳. 1956. 东北小麦锈病防治研究工作彙报. 东北农业科学通报, 1956, 4:33—38.
- [170] 曾省. 1954. 水稻粒黑穗病調查报告. 农业学报, 4: 309—318.
- [171] 賀俊峯, 王明德. 1934. A preliminary list of fungi in North China. (华北菌类目录預报). *Ann. Res. Counc. Nat. Univ. Peiping*, 1:1—22.

- [172] 賀俊峯, 張耀宗, 范希中. 1939. 河北省白粉菌科之种属. 农学, 1(2,3):1—12.
- [173] ———, ———, ———. 1940. 河北省之露菌病. 华北农业, 1(2):1—10.
- [174] 貴州省农业改进所. 1938. 农艺系病虫害研究室 27 年 4—12 月工作报告: 50—53.
- [175] 棉花枯萎病調查研究組. 1955. 东北棉花黃萎病調查报告. 东北农业科学通报, 2:63—74.
- [176] 楊士华. 1954. 河南芝麻病害調查和鐮刀菌所引致的芝麻萎蔫病的初步研究. (未发表).
- [177] 楊新美. 1941. 湄潭之油茶苞. 病虫害知識, 1:31—35.
- [178] ———, 陈冠球. 1941. 宜山几种重要作物病害之調查. 病虫害知識, 1:19—24.
- [179] 楊寅, 凌立. 1942. 四川省棉作病害調查. 四川省农业改进所专刊, 第 1 号: 1—12.
- [180] 葛广需. 1954. 甘肃白龙江流域森林病害記要. 中国植物病理学会会訊, 9—10:82—89.
- [181] 葛起新. 1941—1942. 湄潭附近竹类病害之調查及鑑定, 病虫害知識, 1:86—89, 2:15—19, 26—33.
- [182] 裘維蕃. 1937. 山东济宁主要作物病害調查报告. 农林新报, 14:604—605.
- [183] ———. 1941. 福建經濟植物病害誌. 新农季刊, 1:70—75; 161—166; 219—229.
- [184] ———. 1948. A note on the occurrence of some serious diseases imported vegetables in Peiping. (北平輸入蔬菜上严重病害之发生). *Acta Agr.*, 1:139.
- [185] ———. 1951. 大豆花叶病的研究初报. 中国植物病理学会会訊, 1—5:24.
- [185a] ———, 王新楷. 1957. 中国白菜的一种病毒病害——“孤丁”. 植物病理学报, 3:31—43.
- [186] 樓春吾, 金光祖. 1935. 本局两月来檢驗进出口植物所发现之重要病害. 国际贸易导报, 7:179—184.
- [187] 欧世璜. 1935. Notes on Dothidiales from China. (中国无壳菌誌略). *Sinensia*, 6:1—8.
- [188] ———. 1936. The soft rot of sweet potato and its control. (甘薯軟腐病之研究). *Sinensia*, 7:50—62.
- [189] ———. 1936. Supplementary notes on Ascomycetes from China, II. (中国蕈菌杂录, 二). *Sinensia*, 7:194—211.
- [190] ———. 1936. Additional fungi from China, IV. (中国眞菌續誌, 四). *Sinensia*, 7:668—685.
- [191] ———. 1940. A study of the *Cercospora* leaf spot of Tung oil tree. (油桐叶斑病之研究). *Sinensia*, 11:175—188.
- [192] ———. 1940. Phycomycetes of China, I. (中国藻菌誌, 其一). *Sinensia*, 11:33—57.
- [193] ———. 1940. Phycomycetes of China, II. (中国藻菌誌, 其二). *Sinensia*, 11:427—449.
- [194] ———. 1941. Diseases of economic plants in China, II. (中国經濟植物之病害, 二). *Sinensia*, 13:23—52.
- [195] 欧阳諤. 1955. 邓家埠紅花草菌核病的观察和防治意見. 江西植物保护通訊, 1955, 1:21—25.
- [196] 蔡淑蓮. 1941. 湄潭主要經濟植物病害之初步調查. 病虫害知識, 1:50—57.

- [196a] 黎健干. 1957. 1957 年粵西海島棉角斑病調查報告. 華南農業科學, 1957, 4:30—35.
- [197] 錢燧孫. 1918. 北京附近植物病原菌調查目錄. 教育公報, 5(1):22—26.
- [198] 關玫玉. 1936. Recherches systematiques, biologiques et cytologiques sur les Ustilaginees de Chine. (中國黑穗菌的分類學、生物學和細胞學的研究). *Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping*, 4:157—299.
- [199] 戴芳瀾. 1922. 廣東省地方農林試驗場第 6 次報告書(民國 10 年度).. 病蟲害課成績報告. 病害部. 269—274.
- [200] ———. 1923. 芋疫病. 農林季刊, 1(3):1—8.
- [201] ———. 1927. 江蘇真菌名錄. 農學雜誌, 3(6):1—13.
- [202] ———. 1927. 江蘇麥類病害. 農學雜誌, 3(6):1—14.
- [203] ———. 1930. A new species of *Uncinula* on *Acer trifidum* Hook Arn. (三角楓上白粉病菌之一新種). *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot.*, 6:1—4.
- [204] ———. 1931. Observations on the development of *Myriangium bambusae* Rick. (竹鞘寄生菌之研究). *Sinensia*, 1:147—164.
- [205] ———. 1932. Notes on Chinese fungi, I. (中國真菌雜錄, 一). *Nanking Jour.*, 2:171—179.
- [206] ———. 1934. Notes on Chinese fungi, IV. (中國真菌雜錄, 四). *Sinensia*, 4:209—214.
- [207] ———. 1934. A species of *Choanephora* with dichotomously branched conidiophore. (具叉狀孢子枝之 *Choanephora* 菌). *Sinensia*, 4:215—224.
- [208] ———. 1935. Notes on Chinese fungi, V. (中國真菌雜錄, 五). *Bull. Chinese Bot. Soc.*, 1:11—35.
- [209] ———. 1936. Notes on Chinese fungi, VI. Additional notes on Erysiphaceae of China. (中國真菌雜錄, 六. 中國白粉菌續志). *Bull. Chinese Bot. Soc.*, 2:16—28.
- [210] ———. 1936. Notes on Chinese fungi, VII. Cercosporae, (1). (中國真菌雜錄, 七. 尾孢菌科). *Bull. Chinese Bot. Soc.*, 2:45—66.
- [211] ———. 1939. Notes on Chinese fungi, IX. (中國真菌雜錄, 九). *Lingnan Sci. Jour.*, 18:457—461.
- [212] ———. 1941. 雲南經濟植物病害之初步調查報告. 國立清華大學農業研究所彙報, 第 6 号: 1—36.
- [213] ———. 1946. Further studies on the Erysiphaceae of China. (中國白粉菌科之研究). *Bull. Torrey Bot. Club*, 73:108—130.
- [214] ———. 1947. Uredinales of Western China. (中國西部銹菌之研究). *Farlowia*, 3:95—139.
- [215] ———. 1948. Cercosporae of China, II. (中國的尾孢菌, 二). *Lloydia*, 2:36—56.
- [216] ———. 1948. A new species of *Coleopuccinia* with remarks on the genus, (*Coleopuccinia* 屬一新種并對於該屬之討論). *Acta Agr.*, 1:97—103.
- [217] ———, 周家熾. 1934. A dry rot of pomegranate fruit caused by *Zythia versoniana* Sacc. (石榴干腐病). *Jour. Hort. Assoc. China*, 1:203—217.
- [218] ———, ———. 1937. Notes on Chinese fungi, VIII. (中國真菌雜錄, 八). *Bull. Chinese Bot. Soc.*, 3:53—74.
- [219] ———, 魏景超. 1932. Notes on Chinese fungi, II. (中國真菌雜錄, 二). *Sinensia*, 3:93—130.

- [220] 戴芳澜, 魏景超. 1933. Notes on Chinese fungi, III. (中国真菌杂录, 三). *Sinensia*, 4:83—128.
- [221] 戴伦焰. 1944. 嘉定作物病害之調查. 武汉大学理科季刊, 8(2):1—15.
- [222] 魏宁生. 1954. 昌黎的果树病害問題. 植物病害丛刊, 1—108.
- [223] 魏景超. 1934. 稻作病害. 金陵大学农学院丛刊, 第16号(新号).
- [224] ———. 1939. Storage diseases of sweet oranges in Szechuan. (四川甜橙果实上之主要病害). *Nanking Jour.*, 9:239—268.
- [225] ———. 1941. Notes on the storage and market diseases of fruits and vegetables, I. Market diseases of stone fruits. (果蔬腐烂菌杂录: 其一, 核果腐烂菌). *Sinensia*, 12:135—152.
- [226] ———. 1942. Notes on Chinese fungi, X. Erysiphaceae of western Szechuan. (中国真菌杂录, 十. 四川白粉菌). *Nanking Jour.*, 11:103—116.
- [227] ———. 1947. Two new fungi from Szechuan. (四川真菌之二新种). *Bot. Bull. Acad. Sinica*, 1:209—212.
- [228] ———. 1951. 蕃茄毒素病研究. 中国植物病理学会会訊, 1—5:31.
- [229] ———, 周本璋. 1942. *Discosporella* fruit rot of tomato. (蕃茄漆腐病). *Chinese Jour. Expt. Biol.* 2:53—68.
- [230] ———, ———. 1944. 成都附近蕃茄病害調查. 科学农业, 1:288—294.
- [231] ———, 袁淑辉. 1940. 金陵大学真菌标本室所藏真菌标本名录(一). 金陵学报, 9:329—372.
- [232] ———, 龔浩, 潘仁瑞. 1955. 江苏省的水稻烂秧問題. 植物病理学报, 1:127—140.
- [233] 傅旅尘. 1927—1928. 广州附近經濟植物病害調查目录. 农事双月刊, 6(1):26—31, (2):27—32, (3)30—35, (6):30—34; 7(1):36—44, (2):30—35, (3):23—28.
- [234] 譚自昌. 1928. 粤桑虫病害的报告. 农事双月刊, 7(1):17.
- [235] 譚松山. 1956. 怎样防治苗木立枯病. 中国林业, 1956, 6:25—26.
- [236] Arcangeli, G. 1896. Sopra varii funghi ed. un'alga raccolti dal P. Giraldis nella China, *Bull. Soc. Bot. Ital.*, 7:183—189.
- [237] Baccarini, P. 1905. Funghi dello Schensi septentrionale raccolti dal Padri Guiseppe Giraldis. App. al. *Nuovo G. bot. ital.*, 22:689—698.
- [238] Bubak, F. 1902. Einige neue oder kritische Uromyces Arten. *Sitz. Königl. Bohm. Ges. Wiss. Prag*. 23 pp.
- [239] Chupp, C. 1953. A monograph of the genus *Cercospora*. 1—667, 222 figs., Ithaca, New York.
- [240] ——— and D. H. Linder. 1937. Notes on Chinese Cercosporae. *Mycologia*, 29:26—33.
- [241] Cifferri, R. 1931. Quinta contribusione allo studio degli Ustilaginales. *Ann. Myc.*, 29:69—71.
- [242] Couch, J. N. 1938. The genus *Septobasidium*. 480 pp. Univ. N. Carolina Press.
- [243] Crowell, I. H. 1936. Two new species of *Gymnosporangium* from Asia. *Jour. Arnold Arbor.*, 18:50—51.
- [244] Cummins, G. B. 1949. New species of *Puccinia* on Lauraceae from China. *Bull. Torrey bot. Club*, 76:31—38.
- [245] ———. 1950. Uredinales of continental China collected by S. Y. Cheo, I. *Mycologia*, 42:779—797.

- [246] Cummins, G. B. 1951. Uredinales of continental China collected by S. Y. Cheo, II. *Mycologia*, **43**:78—98.
- [247] ———. 1953. The species of *Puccinia* parasitic on the Andropogoneae. *Uredineana*, **4**:5—89, 11 pls., 63 figs.
- [248] Dietel, P. 1904. Über die Uredineengattung *Pucciniostele* Tranzschel et Komarov. *Ann. Myc.*, **2**:20—26.
- [249] Dietel, P. 1930. Über einige neue *Puccinia* aus Asien. *Ann. Myc.*, **28**:273—277.
- [250] Dykstra, T. P. 1944. Potato production problems in China. *Amer. Potato Jour.*, **21**:123—131.
- [251] Fitzpatrick, H. M. 1920. Monograph of the Coryneliaceae. *Mycologia*, **12**:241.
- [252] Fujikuro, Y. (藤黒与三郎). 1912. アンバリヘンパ腐烂病=就廣. 台湾农事報, **65**:13.
- [253] Goto, K. (后藤和夫). 1929. だひにすら及たガひも黒斑病=就も廣. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, **1**:301.
- [254] Hansford, C. G. 1948. Chinese fungi collected by S. Y. Cheo. *Farlowia*, **3**:269—283.
- [255] Hara, K. (原振祐). 1928. 东亚菌类誌. 日本静岡県农县報.
- [256] ———. 1940. 支那产害菌の珍种に就つて (1). 植物及动物, **8**(10):1661—1662.
- [257] Hashioka, Y. (桥岡良夫). 1941. 台湾产柑桔果实の貯藏輸送中の腐敗. 台中农事試験場, **10**(1—2).
- [258] Hemmi, T. (逸見武雄). 1942. *Cercospora* 属菌に因る北支那の植物病害に就て. (豫報). 医学と生物学, **1**(10):494—498.
- [259] ———. (逸見武雄). 1942. 満洲国及び北支に于ける公園樹と街路樹の、二、三病害に就て. 教育农艺, **11**(11):1255—1267.
- [260] ———. 1942. 満洲国及び北支に于ける五種の青麻病害に就て. 植物及动物, **10**(10):891—895.
- [261] ———. 1943. 三種の北支农作物病害に就もフ. 病虫害雑誌, **30**(1,2).
- [262] Hirai, T. (平井篤造). 1938. 台湾产甘蔗の輸送中に于ける病害. 日本植物病理学会報, **8**(2) 145—166.
- [263] Hiratsuka, Naohide (平塚直秀). 1935. *Phragmidium* of Japan. *Jour. Jap. Bot.*, **7**:227—299.
- [264] ———. 1935. *Phakopsora* of Japan, I. *Bot. Mag. Tokyo*, **49** (587):781—788.
- [265] ———. 1935. *Phakopsora* of Japan, I. *Bot. Mag. Tokyo*, **49**(588):853—860.
- [266] ———. 1936. *Phakopsora* of Japan, III. *Bot. Mag. Tokyo*, **50**(589):2—8.
- [267] ———. 1936. *Gymnosporangium* of Japan, II. *Bot. Mag. Tokyo*, **50**:549—555.
- [268] ———. 1936. A monograph of the Pucciniastreae: *Mem. Tottori Agr. Coll.*, **4**:1—396.
- [269] Hiratsuka, Naohide (平塚直秀). 1937. Miscellaneous notes on the East Asiatic Uredinales with special reference to the Japanese species, I. *Jour. Jap. Bot.*, **13**:244—251.
- [270] ———. 1939. Miscellaneous notes on the East Asiatic Uredinales with special reference to the Japanese species, V. *Jour. Jap. Bot.*, **15**:433—439.
- [271] ———. 1941. Materials for a rust-flora of Formosa. *Bot. Mag. Tokyo*, **55**(654):267—273.

- [272] Hiratsuka, Naohide (平塚直秀). 1941. Materials for a rust-flora of Manchoukuo, I. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 17:77—81.
- [273] ———. 1942. Notes on Uredinales collected in South China. *Jour. Jap. Bot.*, 18:563—572.
- [274] ———. 1943. Notae Uredinologiae Asiae orientalis, II. *Bot. Mag. Tokyo*, 57:279—283.
- [275] ——— and Y. Hashioka (———, 橋岡良夫). 1933. Uredinales collected from Formosa, I. *Trans. Tottori Soc. Agr. Sci.* 3:156—165.
- [276] ——— and ———. 1934. Uredinales collected from Formosa, II. *Bot. Mag. Tokyo*, 48:233—240.
- [277] ——— and ———. 1935. Uredinales collected from Formosa, IV. *Bot. Mag. Tokyo*, 49:520—524.
- [278] Hiratsuka, Naohide and Y. Hashioka. (平塚直秀, 橋岡良夫). 1935. Uredinales collected from Formosa, V. *Trans. Tottori Soc. Agr. Sci.*, 5:237—244.
- [279] ——— and ———. 1937. Uredinales collected from Formosa, VI. *Bot. Mag. Tokyo*, 51(60):41—47.
- [280] ——— and E. Tobina. (———, 飛永英次). 1935. 日本産ハモ及びセハズサテ兩屬植物に寄生する *Uromyces* 屬菌に就て. *Ann. Phytopath. Soc. Japan*, 4:145—171.
- [281] Homma, Y. (本間セズ). 1930. Notes on the Erysiphaceae of Manchuria. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 11:169—174.
- [282] ———. 1937. Erysiphaceae of Japan. *Jour. Fac. Agr. Hokkaido Univ.*, 38:1—461.
- [283] Hori, S. (堀正太郎). Chinese parasitic fungi collected by Ching Yui Kco. *Ann. Phytopath. Soc. Japan*, 1:66.
- [284] Ito, S. (伊藤誠哉). 1922. *Uromyces* of Japan. *Jour. Coll. Agr. Hokkaido Univ. Sapporo Japan*, 11:211—287.
- [285] ———. 1935. Notae Mycologicae Asiae Orientalis, II. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 14:93.
- [286] ———. 1936. 日本菌類誌. 第一卷. 藻菌類 1—340.
- [287] Ito, S. (伊藤誠哉). 1936. 日本菌類誌. 第二卷. 担子菌類. 第一号. 黑穗菌目. 1—143.
- [288] ———. 1938. 日本菌類誌. 第二卷. 担子菌類. 第二号. 銹菌目——层生銹菌科. 1—249.
- [289] ———. 1950. 日本菌類誌. 第二卷. 担子菌類. 第三号. 銹菌目——柄生銹菌科, 不完全銹菌. 1—435.
- [290] ——— and K. Sawada (———, 澤田兼吉). 1912. A new *Exobasidium* disease of tea-plant. *Bot. Mag. Tokyo*, 26(308):
- [291] ——— and Y. Tokunaga (———, 徳永芳雄). 1935. Notae Mycologicae Asiae Orientalis, I. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 14(1):1—33.
- [292] Iwadare, S. (岩垂悟) 1938. 満洲に発生した棉花の新炭疽病に就て. 札幌农林学会報, 29(143):27—44.
- [293] ———, M. Sasaki and N. Naito (———, 佐佐木三男, 内藤中人). 1943. “満洲国”农作物病害目録. 満洲国内农事試験場報告, 第45号: 1—223.
- [294] Jaczewski, A. L., W. L. Komarov and W. Tranzschel. 1899. *Fungi Rossiae exsiccati*. Fasc. IV, V, VI, VII.
- [295] Jenkins, A. E. 1932. Rose anthracnose caused by *Sphaceloma*. *Jour. Agr. Res.*, 45:325.

- [296] Jenkins, A. E. and C. C. Cheo. 1941. Descriptions of *Elsinoe dolichi* n. sp. and *Sphaceloma ricini* n. sp. *Jour. Wash. Acad. Sci.*, **31**:415—416.
- [297] Jorsted, I. 1954. The rusts on *Gentiana* and *Gentianella*. *Nytt. Mag. Bot.*, **3**:103—115.
- [298] Katsura, K. (桂崎一). 1944. 华北に于ける青麻の数种病害に就て. 华北农报, 第6号:105—112.
- [299] ———. 1945. 华北产未記録の植物病害に就て, (二). 华北农报, 第52号: 1—4.
- [300] ———. 1951. Notes on two new diseases of Chinese jute (*Abutilon avicennae* Gaert.) *Forsch. Pflkr., Kyoto*, **4**:103—106.
- [301] ——— and Nakada (———, 永田利美). 1944. 华北产未記録の植物病害に就て, (一). 华北农报, 第51号: 5—8.
- [302] Keissler, K. 1923. Fungi novi sinenses. *Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math. nat. Kl.*, **60**:73—76.
- [303] ———. 1924. Fungi novi sinenses a Dr. Handel-Mazzetti lecti, II. *Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math. nat. Kl.*, **61**:10—13.
- [304] ———. 1924. Fungi novi sinenses a Dr. Handel-Mazzetti lecti, III. *Oesterreich Bot. Zeitschr.*, **73**:123—128.
- [305] ——— and H. Lohwag. 1937. Fungi in Handel-Mazzetti Symbolae. *Sinicae*, **2**:1—79.
- [306] Kiryu, T. (桐生知友郎). 1939. 南支那の甘蔗病害. 台湾蔗作会报, **17**(4): 244—245.
- [307] Komarov, W. 1900. Diagnosen neuer Arten und Formen, sowie kritische Bemerkungen zu bekannten Arten welche in Jaczewski, Komarov, Tranzschel "Fungi Rossiae exsiccati (Fasc. VI u VII. 1899)" herausgegebenen worden sind. *Hedwigia*, **39**:123—229.
- [308] Matsumoto, T. (松本巖). 1946. Tobacco diseases in Formosa. *Mem. Fac. Agr., Nat. Taiwan Univ.*, **1**:1—26.
- [309] ——— and W. Yamamoto (———, 山本和太郎). 1934. Three important leaf spot diseases of sugar cane in Taiwan. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, **6**:584—598.
- [310] ——— and ———. 1936. 二三の甘蔗病原菌の完全及不完全時代に就て. 病虫害雑誌, **23**:12.
- [311] Miura, M. (三浦道哉). 1921. 満洲主要农作物の病害. 南满鉄道株式会社农事試験場彙报, 第11号.
- [312] ———. 1930. 满蒙植物誌. 第三輯. 隠花植物. 菌类. 南满鉄道株式会社农事試験場彙报.
- [313] Miyake, I. (三宅市郎). 1910. Studien über die Pilze der Reisplanze in Japan. *Jour. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo*, **2**:237—273.
- [314] ———. 1912. Studien über Chinesische Pilze. *Bot. Mag. Tokyo*, **26**:51—66.
- [315] ———. 1913. Studien über Chinesische Pilze. *Bot. Mag. Tokyo*, **27**:37—54.
- [316] ———. 1914. Über Chinesische Pilze. *Bot. Mag. Tokyo*, **28**:37—56.
- [317] Miyake, T. (三宅勉). 1911. 甘蔗露菌病調査. 台湾糖业試験場特別報告, 第1号.
- [318] Nakada (永田利美). 1944. 山西省植物病菌目録(預報). 华北农报, **51**:4.
- [319] Nakamura, T. and H. Tumagari (中村寿夫, 津曲彦寿). 1943. 大东亚烟草病虫害目録.

- [320] Nakata, K. (中田覚五郎). 1941. 北支蒙疆農園藝作物病害調査報告. 華北農事試驗場調査病害, 第1号: 1—72.
- [321] Nishikado, Y. and Oshima (西門义一, 大島俊市). 1944. 棉の黒斑病に就て, 东亚に于ける棉花の病害防除に関する研究 (第二報). 农学研究, 36: 381—396.
- [322] ——— and Miyawaki, Y. (西門义一, 宮脇雪夫). 1944. 棉蒴の腐敗病原 *Fusarium* 菌に関する研究. 东亚に于ける棉花の病害防除に関する研究 (第三報). 农学研究, 36: 417—450.
- [323] Ogawa, M. (小川正行). 1936. 台湾産稻の菌核性病害に就て. 台湾农事報, 33(8): 1—6.
- [324] ———. 1940. 台湾の蓖麻病害に就て. 台湾总督府农业試験所彙報, 172号: 1—18.
- [325] ———. 1943. 黄麻の炭疽病に就て. (豫報). 台湾总督府試験所彙報, 215号: 1—11.
- [326] Okabe, N. (石山信夫). 1933. Bacterial diseases of plants occurring in Formosa, II. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 5: 26—36.
- [327] ———. 1933. Bacterial diseases of plants occurring in Formosa, III. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 5: 157—166.
- [328] ———. 1934. Bacterial diseases of plants occurring in Formosa, IV. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 6: 54—63.
- [329] ———. 1935. Bacterial diseases of plants occurring in Taiwan (Formosa) V: A bacterial disease of chicory. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 7: 57—66.
- [330] ———. 1936. Bacterial diseases of plants occurring in Taiwan (Formosa) VI. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 7: 219—227.
- [331] Patouillard, M. N. 1886. Champignons parasites des Phanerogams exotique. *Rev. Myc.*, 8: 80—84.
- [332] ———. 1886. Quelques champignons de la Chine recolte par l'abbe Delavay dans la province de Yunnan. *Rev. Myc.*, 8: 179—182.
- [333] ———. 1888. Fragments Mycologiques. *Jour. Bot.*, 2: 216—218.
- [334] ———. 1889. Fragments Mycologiques. *Jour. Bot.*, 3: 256—259.
- [335] ———. 1890. Quelques champignons de la Chine recolte par M. l'abbe Delavay. *Rev. Myc.*, 12: 133—136.
- [336] ———. 1902. Descriptions de quelques Champignons extra europeens. *Bull. Soc. Mycol. Fr.*, 18: 299—303.
- [337] ———. 1907. Champignons du Kouy-tscheou. *Monde de Plantes*, 2nd. ser., 9: 31.
- [338] ——— and P. Hariot. 1905. Fungorum novorum. Decas prima. *Bull. Soc. Mycol. Fr.*, 21: 84—86.
- [339] Petrak, F. 1947. Micromycetes, in *Plantae sinenses a Dre. H. Smith annis 1921—1922, 1924 et 1934 lectae. Medd. fran. Goteb. Bot. Tradg.*, 17: 113—164.
- [340] Porter, R. H. 1926. A preliminary report of surveys for plant diseases in East China. *Plant Dis. Repr. Suppl.*, 46: 153—166.
- [341] Reinking, O. A. 1919. Diseases of economic plants in Southern China. *Philippine Agriculturist*, 8: 105—135.
- [342] ———. 1921. Citrus diseases of the Philippines, Southern China, Indo-China and Siam. *Philippine Agriculturist*, 9: 121—179.

- [343] Saccardo, P. A. 1921. Fungi sinensis Aliquot a cl. Prof. Otto A. Reinking collecti et communicati. *Philippine Jour. Sc.*, 18:597—607.
- [344] Sasaki, M. (佐佐木三男). 1942. 热河省农作物病虫害の解説(其一, 病害篇). 1—88.
- [345] ———. 1942. 向日葵の新病害褐斑病に就て. 国立公主岭农事試験場研究时报, 第39号:65—73.
- [346] Sawada, K. (泽田兼吉). 1912. 樟白絹病, 甘蓝菌核病. 台湾农事試験場特別报告, 第4号.
- [347] ———. 1915. 馬鈴薯疫病菌屬ニ屬スルニ新病菌ニヨリ广起ル葱及茄ノ病害. 台湾产茶树ノ菌类ニヨリ广起ル病害. 台湾农事試験場特別报告, 第11号:1—139.
- [348] ———. 1916. 黄麻立枯病(豫报). 台湾总督府农事試験場出版, 107号.
- [349] Sawada, K. (泽田兼吉). 1919. 台湾产菌类調査报告. 第一篇. 台湾总督府农事試験場特別报告, 第19号:1—695.
- [350] ———. 1922. 台湾产菌类調査报告. 第二篇. 台湾中央研究所农业部报告, 第2号:1—173.
- [351] ———. 1922. 广东产菌类. 台湾博物学会会报, 12:76.
- [352] ———. 1927. 台湾产菌类調査报告. 第三篇. 台湾中央研究所农业部报告, 第27号:1—62.
- [353] ———. 1928. 台湾产菌类調査报告. 第四篇. 台湾中央研究所农业部报告, 第35号:1—123.
- [354] ———. 1931. 台湾产菌类調査报告. 第五篇. 台湾中央研究所农业部报告, 第51号:1—131.
- [355] ———. 1933. 台湾产菌类調査报告. 第六篇. 台湾中央研究所农业部报告, 第61号:1—99.
- [356] ———. 1942. 台湾产菌类調査报告. 第七篇. 台湾农业試験所报告, 第83号:1—159.
- [357] ———. 1943. 台湾产菌类調査报告. 第八篇. 台湾农业試験所报告, 第85号:1—131.
- [358] ———. 1943. 台湾产菌类調査报告. 第九篇. 台湾农业試験所报告, 第86号:1—177.
- [359] Sawada, K. (泽田兼吉). 1944. 台湾产菌类調査报告. 第十篇. 台湾农业試験所报告, 第87号:1—93.
- [360] Shear, C. L. and N. E. Stevens. 1917. *Endothia parasitica* and related species. *U. S. Dept. Agr. Bull.* No. 380:1—82.
- [361] Sydow, H. 1922. Über einige weitere im südlichen China (Kwangtung provinz) gesammelte Pilze. *Ann. Myc.*, 20:61—65.
- [362] ———. 1923. Novae fungorum species, XVIII. *Ann. Myc.*, 21:342.
- [363] ———. 1929. Fungi chinenses Series prima. *Ann. Myc.*, 26:418—434.
- [364] ———. 1932. Novae fungorum species, XXI. *Ann. Myc.*, 30:91—117.
- [365] ———. 1936. Novae fungorum species, XXIV. *Ann. Myc.*, 34:411—422.
- [366] ——— and P. Sydow. 1913. Novae fungorum species, IX. *Ann. Myc.*, 11:54.
- [367] ——— and ———. 1914. Beitrag zur kenntnis der parasitischen Pilze der Insel Formosa. *Ann. Myc.*, 12:105—112.
- [368] Sydow, P. and H. Sydow. 1904—1925. Monographia Uredinearum, 1—4.
- [369] ——— and ———. 1919. Aufzählung einiger in den Provinzen Kwang-

- tung und Kwangsi (Sud-China) gesammelter Pilze. *Ann. Myc.*, 17:140—143.
- [370] Takasugi, H. (高杉英男). 1934. Additional list of the fungi of "Manchukuo" (First note). *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 13:185—190.
- [371] Tochinai, Y. (栃内吉彦). 1943. 蒙疆の农业と病虫害 (1, 2, 3). 农业及园艺, 18:947—950, 1050—1052, 1146—1238.
- [372] ——— and I. Hara (——, 原一郎). 1944. 蒙疆产寄生菌类目录. 札幌农林学会报, 36:91—97.
- [373] Togashi, K. and T. Mizokami (富樫浩吾, 沟上). 1943. A list of parasitic fungi collected in North China in the summer of 1943.
- [374] Tranzschel, W. 1907. Diagnosen einiger Uredineen. *Ann. Myc.*, 5:547—551.
- [375] Yamamoto, W. (山本和太郎). 1934. *Cercospora* from Formosa, I. *Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.*, 13:139—143.
- [376] ———. 1934. *Cercospora* Arten aus Taiwan (Formosa), II. *Jour. Soc. Trop. Agr.*, 6:599—608.
- [377] ———. 1936. *Cercospora* Arten aus Taiwan (Formosa), III. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 26:279—286.
- [378] ———. 1938. 甘蔗の数种煤病菌. *Ann. Phytopath. Soc. Japan*, 8:98—99.
- [379] ———. 1940. Formosan Meliolineae, I. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 30:148—158.
- [380] ———. 1940. Formosan Meliolineae, II. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 30:414—425.
- [381] ———. 1941. Formosan Meliolineae, III. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31:14—30.
- [382] ———. 1941. Formosan Meliolineae, IV. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31:216—230.
- [383] ———. 1941. Formosan Meliolineae, V. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31:125—137.
- [384] ———. 1941. Formosan Meliolineae, VI. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 31:216—230.
- [385] ———. 1954. Capnodiaceae の分类学的研究. 第2报. Eucapnodiaceae の种类に就いて. 日本植物病理学会报, 19:1—5.
- [386] ———. 1954. 煤病菌の所謂寄主範囲に就つて. 日本植物病理学会报, 19:97—103.
- [387] ——— and T. Ito (——, 伊藤武夫). 1932. 紅檜ノ白色穴腐一名蓮根腐ニ关スル研究. 台湾博物学会会报, 22:433.
- [388] Yates, H. S. 1917. Fungi collected by E. D. Merrill in South China. *Philippine Jour. Sc.*, 12:313—316.
- [389] Zundel, G. L. 1939. Studies on the Ustilaginales of the world. *Mycologia*, 31:572—589.
- [390] ———. 1942. Studies on the Ustilaginales of the world, II. *Mycologia*, 34:123—127.
- [391] ———. 1943. Notes on Ustilaginales of the world, III. *Mycologia*, 35:164—184.
- [392] ———. 1944. Notes on the Ustilaginales of the world, IV. *Mycologia*, 36:400—412.

中科院植物所图书馆



S0018314

中國經濟植物病蟲目錄

58.8438

144

00254

李延平

82.7.21

58.8438

144

50.7
82.2

書 号

登記号 00254

頁	行	誤	正
258	8	三眞	瀝
265	倒 1	Yelloosing	Yellowing
273	11	Clomerella	Glomerella
278	24	泡銹病	銹病
292	14	Hirat. 台灣	Hirat. (銹病)台灣
294	7	茜草	銹病
296	26	藤田藤	藤田藤
298	12	藤田藤	藤田藤
304	23	清銅柳	清銅柳
304	倒 7	slaicium	salicium
307	24	鴨母樹	鴨母樹
320	倒 6	Y 花叶病	Y 花叶病
333	倒 9	gnuinum	genuinum
334	15	杭仁樹	杭仁樹
335	7	Tranzschelis	Tranzschelia
339	5	tricytii	tricyrtii
353	25	Lindrmuthianum	Lindemuthianum
367	左 16	adenophræ	adenophoræ
367	右 8	elaegni-nmbellatae	elaegni-umbellatae
367	右 15	Geml	Gmel
368	右 9	Elaeagus	Elaeagnus
368	右倒 14	Thallectrum	Thallictrum
369	右倒 13	tat	tata
370	左倒 20	aurea	aureus
371	右 25	Heliantus	Helianthus
373	左 16	lawsoniac	lawsoniae
373	右 1	Narasi	Naras.
373	右 25	Botryospheria	Botryosphaeria
375	左 23	Theclaviopsis	Thielaviopsis
376	左倒 10	catalpac	catalpac
378	左 28	hirsuium	hirsutum
380	右 13	Puerfaia	Pueraria
381	右倒 9	Twen	Tsen
382	右 30	ischemicola	ischaemicola
383	左倒 19	aurea	aureus
384	左 21	Sacharum	Saccharum
384	左 26	turgidum	turgidum L.
384	左倒 3	Nicikado	Nishikado
384	右倒 2	Schltr.	Schltr.
385	左倒 3	trata	grata
385	右 24	eupetorii	eupatorii

頁	行	誤	正
386	右 12	americana	americana
386	右 20	beehmeriae	boehmeriae
386	右 26	carica	caricae
387	右 10	higginsianum	higginsianum
390	左倒 8	Clerodendrin	Clerodendron
391	右 26	Cucuis	Cucumis
392	右 22	Pyranidalis	Pyramidalis
392	右倒 1	Eragaria	Fragaria
393	左倒 7	Goidge	Doidge
393	右 17	Physalosporis	Physalospora
394	左 1	Diplodea	Diplodia
394	左倒 16	orientale	indicum
396	左 29	labatum	Lobatum
396	右 7	Glycines	Glycine
396	右倒 6	pseud-	pseudo-
398	左倒 12	Leodian	Leonian
398	左倒 10	Radik.	Radlk.
398	右 12	massoniana	massoniana
398	右 14	Staria	Setaria
399	左 20	betate	betae
399	左倒 12	staria	setaria
399	右 23	herba-ceum	herbaceum
399	右倒 1	Glycines	Glycine
400	左倒 5	Iachryma	lachryma
400	右 33	Aspargus	Asparagus
401	左倒 19	Setaris	Setaria
401	左倒 15	Hordum	Hordeum
401	右倒 16	Ipomica	Ipomoea
401	右倒 8	Glycines	Glycine
402	左 17	orientale	indicum
402	左 18	Vivia	Vicia
402	右 25	ampliolius	amplifolius
402	右 30	reflezus	reflexus
405	左 27	Koikz	Koidz
406	左 14	Zizyphue	Zizyphus
406	左倒 7	formosalia	formosana
406	右 1	Bruophllum	Bryophllum
406	右 29	Nisikado	Nishikado
407	左倒 5	Nisikado	Nishikado
408	左 8	Trecul	Thecul
408	左倒 15	sifolia	folia

中科院植物所图书馆



S0018314

中国經濟植物病原目录勘誤表

頁	行	誤	正
23	29	蓝鴨儿菜	兰鴨儿菜
24	16	水蔗草	水蔗草
26	26	artabotrydis	artabotrydis
29	倒 2	茅叶	茅叶
30	18	Szechuensis	Szechuanensis
35	倒 3	并锈病	稈锈病
36	12	153	135
36	倒 8	軸藜	軸藜
37	23	湖南 () 不要	
42	20	Gleosporium	Gloeosporium
42	倒 9	Euryachora	Euryachora
43	4	Gleosporium	Gloeosporium
43	倒 8	nivera	nivea
47	倒 2	Roger	Rogers
48	倒 9	Twen	Tsen
56	18	budleiae	buddleiae
57	11	Narss	Naras
59	12	yadoridi	yadoriki
59	倒 1	urgulosus	rugulosus
66	26	金挖耳属	金挖耳属
79	13	fewcetti	fawcetti
80	12	citriarpa	citricarpa
93	12	紋斑	紋斑病
98	14	Spingera	Spinigera
104	6	cotini-coggyriae	cotini-coggygeriae
107	6	(Mosaic)	花叶病 (Mosaic)
107	17	衰叶病	花叶病
109	17	Sseudoperonospora	Pseudoperonospora
111	17	(Mosaic)	花叶病 (Mosaic)
112	17	biracteolata	bibracteolata
124	18	一拉香	一柱香
175	23	木焦	樵
187	31	潺槁树	潺槁树
208	5	misonathi	miscanthi
218	20	Y 花叶病	Y 花叶病
244	24	褐色腐朽	紅色腐朽
244	25	紅色腐朽	褐色腐朽
249	8	少果	小果

頁	行	誤	正
414	右 12	caragane	caraganae
419	右 22	Roeusch	Raeusch
421	右 11	lescn	lesch
421	右 13	Uncinala	Uncinula
424	左 25	lepidil	lepidii
432	右倒 6	batatos	batatas
434	右 23	papyicola	papayicola
436	左 3	Tagaashi	Tagashi
436	左 32	boebmeriae	boehmeriae
436	左 40	Hay. f.	Hay.
436	右倒 13	Coggyriae	coggygeriae
437	左倒 11	Nisikado	Nishikado
437	左倒 8	viricis	viridis
437	右 29	altaica	althaica
446	左 25	muehlenveckiae	muehlenbeckiae
451	左 17	crospus	crispus
451	右倒 14	Eragaria	Fragaria
452	左倒 3	Narss	Naras
452	右 16	Tpr.	Torr.
457	左 24	Lenicera	Lonicera
457	右 5	miscanthing	miscanthina
457	右倒 16	aurea	aureus
458	右 3	Mura	Miura
459	右 11	mlcrocarpa	microcarpa
461	左 7	nigea	nivea
461	右倒 4	jasminu	jasminum
462	右倒 11	Nishila	Nishida
463	左 29	Nisikado	Nishikado
466	左倒 13	vafiabilis	variabilis
467	右 21	turgidum	turgidum L.
472	左 8	ianatum	Lanatum
472	右 16	communi	communis
474	左 9	tumetaciens	tumefaciens
475	右 23	hapus	napus
481	左 23	bibracteolata	bibracteolata
488	11	onrhe	on the
489	32	resette	rosette
490	1	viroses	viruses

参考文献 273 后,加[273]——,1942. Materials for a rust-flora of Manchoukuo, II. Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., 17: 77—81.

原参考文献 273 起至最后,均增加一个号码。

中國經濟植物綱要目錄

58.8438

144

00254

李振年 82.7.21

58.8438

144

50.7
822

書 号

登記号 00254

统一书号： 13031·884

定 价： 3.30 元